

Curvas y Superficies

Antonio Gámiz Delgado
Universidad de Granada

19 de marzo de 2020

Ejercicio 1.

Para cada función diferenciable $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se considera la curva $\alpha_f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $\alpha_f(t) = (\cos t, \sin t, f(t))$.

- (a) Comprueba que α_f es regular. Tenemos que comprobar $|\alpha'_f(t)| \neq 0 \forall t \in \mathbb{R}$:

$$|\alpha'_f(t)| = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (f'(t))^2} = \sqrt{1 + (f'(t))^2}$$

Que nunca puede dar 0 ya que es la suma de dos números positivos.

- (b) Prueba que para cada $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$, con $t_1 < t_2$, se cumple $\int_{t_1}^{t_2} |\alpha'_f(t)| dt \geq t_2 - t_1$.

$$\int_{t_1}^{t_2} |\alpha'_f(t)| dt = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 + (f'(t))^2} dt \geq \int_{t_1}^{t_2} dt = t_2 - t_1$$

- (c) Construye el triedro de Frenet.

Como $|\alpha_f(t)| \neq 1$, tenemos que el triedro viene dado por:

$$e_1(t) = \frac{\alpha'_f(t)}{|\alpha'_f(t)|} = \frac{1}{\sqrt{1 + (f'(t))^2}} \alpha'_f(t)$$

$$\begin{aligned} \alpha''_f(t) &= (-\cos t, -\sin t, f''(t)) \Rightarrow e_2(t) = \alpha''_f(t) - \langle \alpha''_f(t), e_1(t) \rangle e_1(t) = \\ &= \alpha''_f(t) - \frac{f'(t)f''(t)}{1 + (f'(t))^2} \alpha'_f(t) = (-\cos t, -\sin t, f''(t)) - \frac{f'(t)f''(t)}{1 + (f'(t))^2} (-\sin t, \cos t, f'(t)) \end{aligned}$$

Calculemos $|\tilde{e}_2(t)|^2$, saltándonos las cuentas debido a su gran longitud:

$$|\tilde{e}_2(t)|^2 = \frac{1 + f'(t)^2 + f''(t)^2}{1 + f'(t)^2} \Rightarrow e_2(t) = \sqrt{\frac{1 + f'(t)^2 + f''(t)^2}{1 + f'(t)^2}} \tilde{e}_2(t)$$

$$\begin{aligned} e_3(t) &= e_1(t) \times e_2(t) = (\dots \text{cuentas} \dots) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + f'(t)^2 + f''(t)^2}} (f''(t) \cos t + f'(t) \sin t, f''(t) \sin t - f'(t) \cos t, 1) \end{aligned}$$

(d) Calcula sus funciones curvatura y torsión.

Usando el ejercicio 3:

$$K(t) = \frac{|\alpha'(t) \times \alpha''(t)|}{|\alpha'(t)|^3} \quad \tau(t) = \frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t), \alpha'''(t))}{|\alpha'(t) \times \alpha''(t)|^2}$$

$$\alpha'(t) \times \alpha''(t) = (\cos t f''(t) + \sin t f'(t), \sin t f''(t) - \cos t f'(t), 1) \Rightarrow$$

$$|\alpha'(t) \times \alpha''(t)|^2 = 1 + f'(t)^2 + f''(t)^2 \Rightarrow$$

$$K(t) = \frac{\sqrt{1 + f'(t)^2 + f''(t)^2}}{(1 + f'(t)^2)^{3/2}}$$

$$\alpha'''(t) = (\sin t, -\cos t, f'''(t)) \Rightarrow$$

$$\det(\alpha'(t), \alpha''(t), \alpha'''(t)) = \begin{vmatrix} -\sin t & \cos t & f'(t) \\ -\cos t & -\sin t & f''(t) \\ \sin t & -\cos t & f'''(t) \end{vmatrix} = f'''(t) + f'(t)$$

(e) Determina las funciones f para las cuales α_f es una curva plana.

Para que sea una curva plana, su torsión tiene que ser 0, es decir, $\tau(t) = 0$. La expresión solo será 0 si el numerador lo es, es decir, $f'''(t) + f'(t) = 0$. Cuya solución son las funciones $f(x) = c_1 \cos x + c_2 \sin x$, con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.