

Calcular  $I = \int x^2 e^x \cos x \, dx$ .

Resolução:

Calculemos inicialmente  $J = \int e^x \cos x \, dx$ .

Aplicando "por partes":

$$J = e^x \cos x + \int e^x \sin x \, dx = e^x \cos x + e^x \sin x - \underbrace{\int e^x \cos x \, dx}_J$$

$$2J = e^x(\cos x + \sin x) \Rightarrow J = \frac{e^x(\cos x + \sin x)}{2} + c_1$$

Calculemos também inicialmente  $K = \int e^x \sin x \, dx$ .

Aplicando "por partes":

$$K = e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - e^x \cos x - \underbrace{\int e^x \sin x \, dx}_K$$

$$2K = e^x(\sin x - \cos x) \Rightarrow K = \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2} + c_2$$

Também é útil saber  $L = \int J \, dx$ :

$$L = \frac{J + K}{2} + c_1 x$$

Também é útil saber  $M = \int K \, dx$ :

$$M = \frac{K - J}{2} + c_2 x$$

Continuando, aplicando "por partes" em  $I$ :

$$I = x^2 \frac{e^x(\cos x + \sin x)}{2} - \int x e^x(\cos x + \sin x) \, dx = x^2 \frac{e^x(\cos x + \sin x)}{2} - xJ - xK + \underbrace{\int J + K \, dx}_{L+M}$$

$$\text{Logo } \boxed{\int x^2 e^x \cos x \, dx = x^2 \frac{e^x(\cos x + \sin x)}{2} - x e^x \sin x + \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2} + c}.$$

---

Documento compilado em Wednesday 12<sup>th</sup> March, 2025, 22:37, tempo no servidor.

Comunicar erro: "a.vandre.g@gmail.com".