

# Projeto Mathematical Ramblings

mathematicalramblings.blogspot.com

Quais os valores de  $m$  para que a reta  $y = mx + 1$  seja tangente à circunferência  $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 1$ ?

Resolução:

Chamemos de  $r$  a reta considerada, sua forma normal é  $r : mx - y + 1 = 0$ .

A distância de  $r$  ao centro da circunferência,  $C(2, 2)$ , deve ser igual ao raio, ou seja  $d_{rC} = 1$ .

$$\frac{|2m - 2 + 1|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = 1 \quad (\text{I})$$

$$|2m - 1| = \sqrt{m^2 + 1} \Rightarrow (2m - 1)^2 = m^2 + 1 \Rightarrow 4m^2 - 4m + 1 = m^2 + 1 \Rightarrow 3m^2 - 4m = 0 \Rightarrow m = 0 \vee m = \frac{4}{3}$$

Como houve uma quadração, deve-se fazer uma verificação para cada valor encontrado na sentença original (I):

$$\frac{|2 \cdot 0 - 2 + 1|}{\sqrt{0^2 + (-1)^2}} = \frac{|-1|}{1} = 1, 0 \text{ satisfaz.}$$

$$\frac{|2 \cdot \frac{4}{3} - 2 + 1|}{\sqrt{(\frac{4}{3})^2 + (-1)^2}} = \frac{|\frac{8}{3} - 1|}{\frac{16}{9} + 1} = \frac{|\frac{5}{3}|}{\frac{25}{9}} = \frac{\frac{5}{3}}{\frac{25}{9}} = 1, \frac{4}{3} \text{ satisfaz.}$$

$$m \in \{0, \frac{4}{3}\}$$

---

Documento compilado em Friday 9<sup>th</sup> August, 2019, 12:00, UTC +0.

Comunicar erro: "a.vandre.g@gmail.com".