


$$\cos(a + b) = (\cos a)(\cos b) - (\sin a)(\sin b)$$



No primeiro quadrante, tomemos $a = m(\widehat{DAB})$ e $b = m(\widehat{BAC})$.

$$m(\overline{AH}) = \frac{\cos(a + b)}{\cos a}$$

$$m(\overline{HG}) = (\cos b) - m(\overline{AH}) = (\cos b) - \frac{\cos(a + b)}{\cos a}$$

$$(\sin a)(\sin b) = (\cos a)(\cos b) - \cos(a + b)$$

Se, como um caso particular, a está no segundo quadrante, podemos fazer a redução ao primeiro quadrante:

$$\cos(a + b) = \cos(\pi - a' + b) = [(\cos(\pi - a'))](\cos b) - [(\sin(\pi - a'))](\sin b) =$$

$$= -(\cos a')(\cos b) - (\sin a')(\sin b) = (\cos a)(\cos b) - (\sin a)(\sin b).$$

Analogamente, para a ou b em quaisquer dos quadrantes, verificando também quando a ou b pertencem aos eixos, teremos que a fórmula é válida para todos os valores.

Quod Erat Demonstrandum.

Documento compilado em Thursday 13th March, 2025, 20:55, tempo no servidor.

Sugestões, comunicar erros: "a.vandre.g@gmail.com".

Licença de uso:  Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual (CC BY-NC-SA).