

Projeto Mathematical Ramblings

mathematicalramblings.blogspot.com

Ângulo de Antonio Vandr .

Sejam $P(a, b)$, $Q(c, d)$, o eixo \overrightarrow{PQ} , e uma fun  o $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. O  ngulo θ de um ponto de f com o eixo \overrightarrow{PQ}   tal que



$$\cos \theta = \frac{(c-a)(x-a) + (d-b)[f(x)-b]}{\sqrt{[(c-a)^2 + (d-b)^2]\{(x-a)^2 + [f(x)-b]^2\}}}.$$

Chamando tal  ngulo de  ngulo de Antonio Vandr ,

$$\alpha_{\mathcal{A}f(x)}^{[(a,b),(c,d)]} = \arccos \frac{(c-a)(x-a) + (d-b)[f(x)-b]}{\sqrt{[(c-a)^2 + (d-b)^2]\{(x-a)^2 + [f(x)-b]^2\}}}.$$

Exemplo: $f(x) = 0$, $P(0, 1)$, $Q(0, 2)$:

$$\alpha_{\mathcal{A}_0}^{[(0,1),(0,2)]} = \arccos \frac{-1}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$



Documento compilado em Sunday 6th June, 2021, 20:07, tempo no servidor.

 ltima vers o do documento (podem haver corre  es e/ou aprimoramentos):
"bit.ly/mathematicalramblings_public".

Sugest es, comunicar erros: "a.vandre.g@gmail.com".

Licen a de uso:  Atribui  o-N oComercial-CompartilhaIgual (CC BY-NC-SA).