

Projeto Mathematical Ramblings

mathematicalramblings.blogspot.com

Determine os extremos absolutos, caso existam, da função $f(t) = t + \cot\left(\frac{t}{2}\right)$ no intervalo $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right]$.

Resolução:

$$1 = \frac{2 \tan\left(\frac{\pi}{8}\right)}{1 - \tan^2\left(\frac{\pi}{8}\right)} \Rightarrow \tan\left(\frac{\pi}{8}\right) = \sqrt{2} - 1 \wedge \tan\left(\frac{7\pi}{8}\right) = 1 - \sqrt{2}$$

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{\sqrt{2} - 1}$$

$$f\left(\frac{7\pi}{4}\right) = \frac{7\pi}{4} + \frac{1}{1 - \sqrt{2}}$$

$$f'(t) = 1 - \frac{1}{2} \cdot \csc^2\left(\frac{t}{2}\right)$$

$$\mathbb{U} = \left[\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right] \wedge f'(t) = 0 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\pi}{4} + \frac{1}{\sqrt{2} - 1} > \frac{7\pi}{4} + \frac{1}{1 - \sqrt{2}} > \frac{\pi}{2}$$

Logo os pontos de extremos absolutos são $t = \frac{\pi}{4}$ e $t = \frac{7\pi}{4}$.

Documento compilado em Sunday 11th December, 2022, 13:06, tempo no servidor.

Última versão do documento (podem haver correções e/ou aprimoramentos):
"bit.ly/mathematicalramblings_public".

Sugestões, comunicar erros: "a.vandre.g@gmail.com".

Licença de uso:



Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual (CC BY-NC-SA).