

Ângulo de Antonio Vandré.

Sejam $P(a, b)$, $Q(c, d)$, o eixo $\overrightarrow{PQ}$, e uma função $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. O ângulo θ de um ponto de f com o eixo $\overrightarrow{PQ}$ é tal que

$$\cos \theta = \frac{(c-a)(x-a) + (d-b)[f(x)-b]}{\sqrt{[(c-a)^2 + (d-b)^2]\{(x-a)^2 + [f(x)-b]^2\}}}.$$

Chamando tal ângulo de Ângulo de Antonio Vandré,

$$\alpha_{\mathcal{A}_{f(x)}}^{[(a,b),(c,d)]} = \arccos \frac{(c-a)(x-a) + (d-b)[f(x)-b]}{\sqrt{[(c-a)^2 + (d-b)^2]\{(x-a)^2 + [f(x)-b]^2\}}}.$$

Exemplo: $f(x) = 0$, $P(0, 1)$, $Q(0, 2)$:

$$\alpha_{\mathcal{A}_0}^{[(0,1),(0,2)]} = \arccos \frac{-1}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$





Gráfico cartesiano.
Função: arccos(-1/(x^2+1))^0.5);
Borçao: 0.0000000000000000;
Translação x: 0.0000000000000000;
Translação y: 0.0000000000000000.



Documento compilado em Tuesday 23rd December, 2025, 20:28, tempo no servidor.

Sugestões, comunicar erros: "a.vandre.g@gmail.com".

Licença de uso:    Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual (CC BY-NC-SA).