Pluviométrie et niveau de la nappe à Spézet (29)

Piézomètre du Fell et poste Météo-France de Spézet / Saint-Goazec · données au 7 novembre 2026 · version du 9 novembre 2026

Pluie cumulée 1/1 → 7/11	Niveau au 7/11	Jours sous le plus bas connu	Corrélation pluie 90 j / niveau
875 mm	**126,04 m NGF**	**95**	**r = 0,78**
−6 % / moyenne	−4,14 m / moyenne	depuis le 5 août	décalage ≈ 1 jour

En bref

La nappe de Spézet réagit vite à la pluie, en un à deux jours, mais c'est le cumul des pluies sur deux à trois mois qui explique le mieux son niveau, surtout en hiver. 2026 est une année de contrastes extrêmes. Un hiver très arrosé a porté la nappe à son plus haut niveau depuis 2004 le 11 février (134,64 m). Sept mois secs ont suivi. Elle est passée sous le plus bas niveau connu pour la saison le 5 août, et y reste. Le 7 novembre, elle est à son plus bas niveau depuis le début des mesures (126,04 m). Les 144 mm d'octobre n'ont pas encore enclenché la recharge.




Figure 1 – En haut : niveau du piézomètre du Fell à Spézet en 2026 (bleu), moyenne et enveloppe min–max 2005-2025 pour le même jour de l'année. En bas : pluie journalière au poste Météo-France de Saint-Goazec (relais du poste de Spézet).

Données utilisées

- Nappe : piézomètre du Fell à Spézet (BSS000XDRF / 03113X0031/F), forage de 31 m dans les formations du bassin versant de l'Aulne. Altitude du sol : 135 m. Mesures journalières Hub'Eau / ADES depuis novembre 2004 (données récentes brutes, non encore validées). Historique de comparaison : 2005-2025, 21 années.
- Pluie : poste Météo-France de SPEZET (29278001, 138 m), installé au même endroit que le piézomètre, jusqu'au 21 juin 2017, puis poste de SAINT-GOAZEC (29249002, 260 m), à 3 km au sud, qui l'a relayé. Les deux séries se raccordent bien : rapportée à la station de

Coray, la pluie annuelle vaut 0,84 avant 2017 à Spézet et 0,84 après à Saint-Goazec. Pluie relevée de 6 h à 6 h, rattachée au premier jour ; aucun jour manquant depuis 2004.

- Contrôle : piézomètre de Saint-Hernin (03114X0023/F), à 8 km. Ses variations suivent celles de Spézet (r = 0,97). Le 8 novembre, il est lui aussi à son plus bas niveau depuis 2004 (196,80 m, contre 197,15 m en 2011).

Résultats de la corrélation

- Pluie du jour : la corrélation avec la variation journalière du niveau est modeste le jour même (r = 0,34), meilleure le lendemain (r = 0,49), puis décroît (r = 0,30 à J+2). La nappe réagit en un à deux jours, comme les aquifères de socle fissuré peu profonds.
- Pluie cumulée : le niveau suit le cumul des pluies sur 30 jours (r = 0,63), 60 jours (r = 0,75) et surtout 90 jours (r = 0,78, décalage d'environ 1 jour). Au-delà, le lien s'affaiblit : r = 0,64 sur 6 mois, 0,20 sur un an. La nappe se vide en quelques mois et ne garde pas la mémoire de l'année précédente.
- Effet saisonnier : de janvier à mars, r = 0,65 entre la pluie d'un jour et la variation du niveau le lendemain ; en novembre-décembre, r = 0,56 ; d'avril à octobre, r = 0,24 seulement. Au printemps et en été, la végétation et le sol consomment l'essentiel de la pluie.




Figure 2 – Niveau du piézomètre du Fell (bleu) et pluie cumulée sur 90 jours à Spézet / Saint-Goazec (vert), 2005-2026.

Bilan mensuel 2026

Mois	Pluie (mm)	Normale 2005-2025	Niveau moyen (m NGF)	Variation du mois (m)	Écart à la moyenne (m)
Janvier	281	147	134,05	+1,07	+0,79
Février	199	113	134,31	−0,88	+1,24
Mars	30	89	132,79	−1,53	+0,28
Avril	24	75	131,25	−1,28	−0,41
Mai	62	75	130,19	−0,78	−0,71
Juin	57	66	129,51	−0,60	−0,79
Juillet	10	69	128,77	−0,88	−0,97
Août	37	71	127,81	−0,91	−1,34
Septembre	27	64	127,01	−0,64	−1,65
Octobre	144	123	126,39	−0,54	−2,31
Novembre (1-7)	4	148	126,08	−0,08	−3,77
Total / dernier	**875**		**126,04 (7/11)**		

Pluie en rouge : moins de la moitié de la normale du mois. Écart à la moyenne : différence entre le niveau 2026 et la moyenne 2005-2025 du même jour, moyennée sur le mois.

Chronologie de l'année

- Hiver très arrosé (janvier-février) : 480 mm en deux mois, contre 260 mm en moyenne. La nappe monte jusqu'à 134,64 m le 11 février, son plus haut niveau depuis le début des mesures en 2004, et reste au-dessus de la moyenne jusqu'à fin mars.
- Sept mois secs (mars-septembre) : 247 mm, contre 507 mm en moyenne, avec un mois de juillet presque sans pluie (10 mm). La vidange est continue, environ 2,4 cm par jour de juin à octobre. La nappe passe sous la moyenne en avril, puis sous le plus bas niveau connu pour la saison le 5 août.
- Octobre sans effet : 144 mm, un peu plus que la normale, dont 67 mm du 22 au 24 octobre. La nappe n'a pas réagi : elle baisse encore d'environ 1,6 cm par jour. Après un été aussi sec, les premières pluies d'automne servent d'abord à réhumidifier les sols.
- Situation au 7 novembre : 126,04 m NGF, soit −4,14 m sous la moyenne du jour et 1,28 m sous le plus bas niveau connu pour cette date. C'est le niveau le plus bas mesuré depuis 2004 (précédent minimum : 127,15 m le 21 octobre 2022). Il a baissé de 8,6 m depuis le record haut de février. La recharge 2026-2027 n'a pas commencé.

Limites et pistes

- Les mesures piézométriques récentes sont des données brutes, pas encore validées. Le poste de pluie a changé en 2017 (Saint-Goazec est 120 m plus haut que Spézet) : le raccord est cohérent, mais les comparaisons fines avant et après 2017 restent à prendre avec prudence. Une pluie efficace (pluie moins évapotranspiration) expliquerait mieux la période d'avril à octobre.
- La remontée dépendra des pluies de novembre et décembre : la recharge démarre une fois les sols saturés, et il faudra probablement plusieurs semaines bien arrosées pour revenir dans les normales de saison.

Sources

Hub'Eau – API Piézométrie (BRGM / OFB) et ADES, fiches 03113X0031/F (piézomètre du Fell, Spézet) et 03114X0023/F (Saint-Hernin) : ades.eaufrance.fr
Météo-France, données climatologiques de base quotidiennes, postes SPEZET (29278001), SAINT-GOAZEC (29249002) et CORAY CHAT EAU (29041002) : data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-climatologiques-de-base-quotidiennes
© antreizh.fr