

# Lymphogranuloma venereum

Lääkärikirja Duodecim

10.1.2023

Iho- ja sukupuolitautilien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back



- Yleistä
- LGV:n oireet
- LGV:n toteaminen
- LGV:n itsehoito
- Milloin hoitoon?
- Ehkäisy
- Kirjallisuutta

## Keskeistä

- LGV on Suomessa harvinainen seksiteitse tarttuva tauti, jonka aiheuttajana on *Chlamydia trachomatis* bakteerin eräs serotyyppi.
- Euroopassa tartunnat on saatu pääosin miesten välisessä seksissä.
- Aiheuttaa peräsuolitulehduksen, jonka oireena usein limainen tai verinen vuoto peräaukosta ja kipua.
- Voidaan todeta positiivisesta klamydianäytteestä jatkotutkimuksella.

## Yleistä

Lymphogranuloma venereum (LGV), joka kuuluu sankkereiden ryhmään, on Suomessa harvinainen seksitauti. Tautia tavataan Euroopassa lähinnä miehillä, joilla on seksiä miesten kanssa. Tropiikissa sitä tavataan enemmän.

Taudin aiheuttavat tavallisen klamydiabakteerin *Chlamydia trachomatis* harvinaisemmat serotyypit L1–3. Bakteeri leviää ja lisääntyy imukudoksessa. Tauti tarttuu pienten limakalvorikkoumien kautta.

## LGV:n oireet

Ensimmäisenä merkinä tartunnasta on pieni haavauma, joka paranee itsestään ja jää helposti havaitsematta. Myöhemmin ilmaantuu suurentuneita imusolmukkeita tartunta-alueelle. Nykyisin LGV:n oireena on tavallisimmin peräsuolitulehdus, joka voi aiheuttaa kipua sekä limaista tai veristä vuotoa peräaukosta. Joskus potilaan oireita pidetään aluksi suolistosairautena. Tauti voi olla myös oireeton.

## LGV:n toteaminen

Jos oireet herättävät epäilyn LGV:stä, otetaan peräaukon limakalvolta klamydianukleiinihapon osoitusnäyte. Klamydiapositiivisesta näytteestä pyydetään laboratoriosta lisätutkimuksena lymphogranuloma venereumia aiheuttavien *Chlamydia trachomatis*-serotyyppien määrittäminen.

## LGV:n itsehoito

Seksitautia epäiltäessä oireita ei pidä koskaan alkaa hoitaa omin päin.

## Milloin hoitoon?

Tartuntaa epäiltäessä tutkimuksiin voi hakeutua omalle terveysasemalle, sukupuolitautilien poliklinikalle tai opiskelijaterveydenhuoltoon. Tutkimuksia tehdään myös yksityisillä lääkäriasemilla. LGV hoidetaan yleensä 3 viikon pituisella doksisykliinikuurilla. Lääkityksen ajan tulee pidättäytyä seksistä ja sitten käyttää kondomia, kunnes on saatu puhdas kontrollinäyte. Hoidon onnistuminen varmistetaan uudella näytteellä 4 viikon kuluttua hoidon päättymisestä. Seksikumppanit puolen vuoden ajalta informoidaan ja ohjataan tutkimuksiin. Vakituinen seksikumppani tulisi hoitaa samanaikaisesti.

## Ehkäisy

Kondomin käyttö kaikissa seksimuodoissa suojaa tartunnalta.

---

*Aiemmat kirjoittajat: Ihotautilien erikoislääkäri Matti Hannuksela ja iho- ja sukupuolitautilien erikoislääkäri Anna Hannuksela-Svahn*

Artikkelin tunnus: dlk01096 (011.010)

© 2023 Kustannus Oy Duodecim