

Mycoplasma genitalium -infektio

Lääkärikirja Duodecim

10.1.2023

Iho- ja sukupuolitautilien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back



- Mycoplasma genitalium-tulehduksen oireet
- Mykoplasmatartunnan toteaminen
- Hoito
- Ehkäisy
- Kirjallisuutta

Keskeistä

- Mykoplasma voi aiheuttaa virtsaputken tulehdusta etenkin miehillä.
- Mykoplasmaa ei seulota oireettomilta. Sitä tutkitaan oireiselta potilaalta, kun klamydia, tippuri ja virtsatieinfektio on poissuljettu.
- Mykoplasman hoito on haasteellista, koska bakteeri on muuttunut vastustuskykyiseksi monille antibiooteille.

Mycoplasma genitalium on seksikontaktissa limakalvosketuksessa tarttuva bakteeri, joka voi aiheuttaa virtsaputken ja kohdunkaulan tulehdusta.

Mycoplasma genitalium-tulehduksen oireet

Mycoplasma genitalium -bakteeri voi aiheuttaa klamydian kaltaisia oireita, kuten kirvelyä virtsatessa, tihentynyttä virtsaamistarvetta, poikkeavaa valkovuotoa tai veristä tiputteluvuotoa emättimestä ja limavuotoa peniksen virtsaputken suulta. Sen on epäilty aiheuttavan myös sisäsynnytintulehduksia.

Mykoplasmatartunnan toteaminen

Mykoplasmatartuntaa voidaan epäillä oireilevalla potilaalla, jolla on epäselvä virtsaputken tai kohdunkaulan tulehdus ja jolla klamydia-, tippuri- ja virtsanäytteet ovat puhtaat. *Mycoplasma genitalium* osoitetaan nukleiinihapon osoitustestillä, joka otetaan virtsasta tai kohdunkaulan kanavasta.

Hoito

Mycoplasma genitalium -tulehdusta hoidetaan antibioottikurilla. Yhä suurempi osa mykoplasma bakteereista on nykyisinkäytössä oleville antibiooteille vastustuskykyisiä. *Mycoplasma genitalium* ei kuulu valvottaviin seksitauteihin, ja potilas maksaa sen tutkimukset ja hoidon itse. Vakituinen kumppani ohjataan testeihin.

Ehkäisy

Tartunnan voi ehkäistä käyttämällä kondomia kaikissa seksimuodoissa.

Aiemmat kirjoittajat: Iho- ja sukupuolitautilien erikoislääkäri Anna Hannuksela-Svahn

Artikkelin tunnus: dlk01148 (011.009)

© 2023 Kustannus Oy Duodecim