Preguntas de atención preventiva

Nombre: _____

Fecha de nacimiento: _____

Fecha: _____

Estas preguntas nos ayudan a saber qué pruebas y qué atención pueden ayudarle a mantener su salud. Puede saltarse cualquier pregunta que prefiera no contestar.

Tabaco

Por favor, marque una respuesta para cada una.

	Sí	No
1. ¿Ha fumado al menos 100 cigarrillos en toda su vida?	☐	☐
2. ¿Fuma cigarrillos actualmente?	☐	☐

Si alguna vez ha fumado: paquetes al día, en promedio: _____

Durante cuántos años: _____

Si dejó de fumar, el año en que lo dejó: _____

Sus antecedentes de salud

Por favor, marque una respuesta para cada una.

	Sí	No	No sé
1. ¿Ha tenido cáncer de mama, de ovario, de trompas de Falopio o de peritoneo?	☐	☐	☐
2. ¿Ha tenido pólipos en el colon, cáncer de colon, enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa?	☐	☐	☐
3. ¿Le han hecho una histerectomía en la que le quitaron el cuello del útero?	☐	☐	☐

Su familia

¿Su madre, padre, hermana, hermano, hija o hijo ha tenido alguna de estas enfermedades?

	Sí	No	No sé
1. Cáncer de mama	☐	☐	☐
2. Cáncer de ovario, de trompas de Falopio o de peritoneo	☐	☐	☐
3. Cáncer de colon o de recto	☐	☐	☐
4. Un aneurisma aórtico (un abultamiento en el vaso sanguíneo principal)	☐	☐	☐
5. Una fractura de cadera (su padre o su madre)	☐	☐	☐
6. ¿Su familia es de origen judío asquenazí?	☐	☐	☐

Por cada sí: quién, y su edad cuando se encontró

_____

_____

_____

Salud sexual

En el último año, he tenido relaciones sexuales con (marque una opción)

☐ Hombres
☐ Mujeres
☐ Hombres y mujeres
☐ No he tenido relaciones sexuales

En los últimos 6 meses:

	Sí	No
1. ¿Ha tenido relaciones sexuales con una pareja nueva o con más de una pareja?	☐	☐
2. ¿Alguna de sus parejas ha tenido VIH, una ITS u otras parejas al mismo tiempo?	☐	☐
3. ¿Ha tenido una infección de transmisión sexual (ITS), como sífilis, gonorrea o clamidia?	☐	☐
4. ¿Ha tenido relaciones sexuales sin condón con alguien cuyo estado de VIH no conocía?	☐	☐
5. ¿Ha tenido relaciones sexuales a cambio de dinero, drogas o un lugar donde quedarse?	☐	☐

Por favor, marque una respuesta para cada una.

	Sí	No
1. ¿Le gustaría hacerse una prueba de VIH o de otras ITS?	☐	☐
2. ¿Le gustaría hablar sobre el medicamento que previene el VIH (PrEP)?	☐	☐

Dónde ha vivido

Por favor, marque una respuesta para cada una.

	Sí	No
1. ¿Nació fuera de los Estados Unidos?	☐	☐
2. ¿Alguno de sus padres nació fuera de los Estados Unidos?	☐	☐
3. ¿Ha vivido fuera de los Estados Unidos durante un año o más?	☐	☐

4. ¿Alguna vez ha vivido en un albergue para personas sin hogar, una cárcel o una prisión?	☐	☐
5. ¿Alguna vez se ha inyectado drogas, aunque sea una vez?	☐	☐
6. ¿Alguna persona con quien vive o con quien tiene relaciones sexuales ha tenido hepatitis B?	☐	☐

Países donde nació o ha vivido: _____

Embarazo

¿Cuál es su caso? (marque una opción)

☐ Podría quedar embarazada
☐ Estoy embarazada ahora
☐ Estoy planeando un embarazo en el próximo año
☐ Esto no se aplica a mi caso

Para uso de la oficina: a qué pueden apuntar las respuestas

Compare cada una con las recomendaciones actuales del USPSTF y con la edad y los antecedentes del paciente. El profesional clínico decide.

☐ Tomografía para cáncer de pulmón: de 50 a 80 años, 20 o más paquetes-año, fuma actualmente o lo dejó en los últimos 15 años (Medicare: de 50 a 77)
☐ Ecografía para aneurisma aórtico, una vez: hombre de 65 a 75 años que alguna vez ha fumado; Medicare también la cubre por antecedentes familiares
☐ Herramienta de riesgo BRCA: mujer con cáncer de mama, de ovario, de trompas o de peritoneo, propio o en su familia, o de ascendencia judía asquenazí
☐ PrEP contra el VIH: pareja con VIH, ITS reciente, relaciones sexuales sin condón, agujas compartidas, o la pide
☐ Pruebas de VIH, sífilis, clamidia y gonorrea: riesgo más alto, o pide una prueba
☐ Prueba de hepatitis B: nació donde es común, padres de allí, agujas, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, o contacto con alguien que la tiene
☐ Prueba de hepatitis C fuera de las edades de 18 a 79: alguna vez se inyectó drogas
☐ Prueba de tuberculosis: nació o vivió donde la tuberculosis es común, o vivió en un albergue, una cárcel o una prisión
☐ Riesgo para densidad ósea antes de los 65, después de la menopausia: padre o madre con fractura de cadera, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol o peso bajo
☐ La detección de cáncer de colon a partir de los 45 es para riesgo promedio; pólipos o cáncer previos, enfermedad de Crohn o colitis necesitan otro plan
☐ La detección de cáncer de cuello uterino se suspende después de una histerectomía que quitó el cuello del útero, sin cambios de alto grado previos
☐ Ácido fólico de 0.4 a 0.8 mg al día: podría quedar embarazada o planea estarlo

Revisado por: _____

Fecha: _____

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística y ayudas y servicios auxiliares gratuitos. Llame al _____ (TTY: 711).

ATTENTION: If you speak English, free language assistance services and free auxiliary aids and services are available to you. Call _____ (TTY: 711).