

# Оглавление

0.1	Расширенное множество вещественных чисел . . . . .	2
0.2	Бесконечные пределы . . . . .	2
0.3	Единообразная запись определения пределов . . . . .	3
0.4	Асимптотика . . . . .	4
0.5	Монотонные последовательности . . . . .	4
0.6	Число $e$ . . . . .	6

## Лекция 4: Продолжение

27.09.2023

### Свойства. (Продолжение)

$$5 \quad x_n \neq c \quad \forall n, x_n \rightarrow a, a \neq 0 \Rightarrow \frac{1}{x_n} \rightarrow \frac{1}{a}$$

$$6 \quad \begin{cases} x_n \rightarrow a \text{ из п. 5} \\ y_n \rightarrow b \end{cases} \Rightarrow \frac{y_n}{x_n} \rightarrow \frac{a}{b}$$

$$7 \quad x_n \leq y_n \quad \forall n, x_n \rightarrow a, y_n \rightarrow b \Rightarrow a \leq b$$

### Доказательство. (5, 6, 7)

5    I. Возьмем  $\varepsilon_0 = \frac{|a|}{2} > 0$ , тогда:

$$\exists N : \forall n > N : |x_n - a| < \varepsilon_0 \Rightarrow |x_n| \geq |a| - |x_n - a| > |a| - \frac{|a|}{2} = \frac{|a|}{2}$$

II.  $\forall \varepsilon > 0 : \exists N_1 : \forall n > N_1 : |x_n - a| < \varepsilon$

$N_0 = \max(N_1, N)$ . При  $n > N_0$  получаем:

$$\left| \frac{1}{x_n} - \frac{1}{a} \right| = \left| \frac{a - x_n}{x_n \cdot a} \right| = \frac{1}{|a|} \cdot \frac{1}{|x_n|} \cdot |x_n - a| \underset{(I), (II)}{<} \frac{1}{|a|} \cdot \frac{2}{|a|} \cdot \varepsilon$$

6     $\frac{y_n}{x_n} = y_n \cdot \frac{1}{x_n}$  — далее по п. (4), (5).

7    Предположим, что  $a > b$ . Тогда  $\varepsilon_0 = \frac{a-b}{2} > 0 \Rightarrow \begin{cases} \exists N_1 : \forall n > N_1 : |x_n - a| < \varepsilon_0 \\ \exists N_2 : \forall n > N_2 : |y_n - b| < \varepsilon_0 \end{cases} \Rightarrow$

$$\forall n > N_1 + N_2 + 1 : y_n < \varepsilon_0 + b = b + \frac{a-b}{2} = a - \frac{a-b}{2} = a - \varepsilon_0 < x_n \Rightarrow y_n < x_n \text{ — противоречие с условием.}$$

□

**Замечание.** (Различные промежутки)

1.  $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$  — интервал (открытый промежуток)
2.  $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$  — замкнутый промежуток
3.  $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$  — полуоткрытый промежуток
4.  $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$  — полуоткрытый промежуток

## 0.1 Расширенное множество вещественных чисел

**Определение 1.**  $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$  — расширенное множество вещественных чисел. При этом:

$$\forall x \in \mathbb{R} : x < +\infty, x > -\infty$$

**Замечание.** (Еще промежутки)

1.  $(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$
2.  $[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$
3.  $(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}$
4.  $(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} : x < a\}$

**Свойства.** (Продолжение свойств пределов)

$$8 \quad \begin{cases} \forall n : x_n \leq y_n \leq z_n \\ x_n \rightarrow a \\ z_n \rightarrow a \end{cases} \Rightarrow y_n \rightarrow a \text{ — теорема о двух милиционерах}$$

**Доказательство.**  $\begin{cases} \forall \varepsilon > 0 : \exists N_1 : \forall n > N_1 : |x_n - a| < \varepsilon \Leftrightarrow x \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \\ \forall \varepsilon > 0 : \exists N_2 : \forall n > N_2 : |z_n - a| < \varepsilon \Leftrightarrow z \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \end{cases} \Rightarrow$   
 $\forall n > \max(N_1, N_2) :$   
 $a - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \varepsilon \Rightarrow |y_n - a| < \varepsilon$

□

## 0.2 Бесконечные пределы

**Определение 2.** (Бесконечные пределы)

- $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}, x_n \rightarrow \infty, n \rightarrow \infty$   
 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ , если:

$$\forall L \in \mathbb{R} \exists N : \forall n > N : x_n > L$$

- $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}, y_n \rightarrow -\infty, n \rightarrow \infty$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = -\infty, \text{ если:}$$

$$\forall L \in \mathbb{R} : \exists N : \forall n > N : y_n < L$$

(возможно сокращение записи  $n \rightarrow$  далее.)

### 0.3 Единообразная запись определения пределов

**Определение 3.** Окрестностью вещественного числа  $a$  называется любой интервал  $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ , где  $\varepsilon > 0$  (обозначается как  $\omega(a)$ ).

**Определение 4.** Окрестность  $+\infty : (L, +\infty), L \in \mathbb{R}$   
Окрестность  $-\infty : (-\infty, L), L \in \mathbb{R}$

**Определение 5.** Пусть  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ , тогда  $x_n \rightarrow a$ , если:  
 $\forall \omega(\alpha) : \exists N : \forall n > N : x_n \in \omega(\alpha)$

**Свойства.** (Доказать самостоятельно)

Пусть  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, a \rightarrow +\infty, \{b_n\}_{n=1}^{\infty}, b \rightarrow -\infty$ , тогда:

1.  $c > 0 : ca_n \rightarrow +\infty, cb_n \rightarrow -\infty$   
 $c < 0 : ca_n \rightarrow -\infty, cb_n \rightarrow +\infty$
2.  $x_n \rightarrow x, x \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \Rightarrow a_n + x_n \rightarrow +\infty$   
 $y_n \rightarrow y, y \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \Rightarrow b_n + y_n \rightarrow -\infty$
3. Возьмем  $x_n, y_n$  из п. (2), тогда:  
 $x > 0 \Rightarrow a_n x_n \rightarrow +\infty, b_n x_n \rightarrow -\infty$   
 $y < 0 \Rightarrow a_n y_n \rightarrow -\infty, b_n y_n \rightarrow +\infty$
4. Если  $\forall n : a_n \neq 0, b_n \neq 0$ , тогда:  
 $\frac{1}{a_n} \rightarrow 0$   
 $\frac{1}{b_n} \rightarrow 0$   
Если  $x_n > 0, x_n \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{1}{x_n} \rightarrow +\infty$   
Если  $x_n < 0, x_n \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{1}{x_n} \rightarrow -\infty$
5.  $\forall n : x_n \leq y_n, x \rightarrow \alpha, y_n \rightarrow \beta; \alpha, \beta \in \overline{\mathbb{R}} \Rightarrow \alpha \leq \beta$

$$6. \begin{cases} \forall n : x_n \leq y_n \leq z_n \\ x_n \rightarrow \alpha, \alpha \in \overline{\mathbb{R}} \\ z_n \rightarrow \alpha \end{cases} \Rightarrow y_n \rightarrow \alpha$$

**Замечание.**  $+\infty = +\infty$

$$-\infty = -\infty$$

$$-\infty < +\infty$$

**Доказательство.** (2, 6)

$$2 \begin{cases} x \in \overline{\mathbb{R}} \Rightarrow \exists M : \forall n : |x_n - x| < M \Rightarrow x_n > x - M \\ \forall L \in \overline{\mathbb{R}} : \exists N : \forall n > N : a_n > L \end{cases} \Rightarrow$$

$\Rightarrow a_n + x_n > L + x - M$ , где правая часть — любое число.

$$6 \quad \forall \varepsilon > 0 : \exists N_1 : \forall n > N_1 : x_n \in (\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon)$$

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N_2 : \forall n > N_2 : z_n \in (\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon)$$

$$N_0 = \max(N_1, N_2)$$

$$\forall n > N_0 : x_n \leq y_n \leq z_n \Rightarrow y_n \in (\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon)$$

□

## 0.4 Асимптотика

**Определение 6.** (О-большая и о-малая)

1.  $x_n = o(1)$ , если  $x_n \rightarrow 0$
2.  $y_n = O(1)$ , если  $\exists C : \forall n : |y_n| \leq C$
3. Пусть  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty}, \forall n : b_n \neq 0$ , тогда:  
 $a_n = o(b_n)$ , если  $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 0$
4. Пусть есть  $\{c_n\}, \{d_n\}$ , тогда:  
 $c_n = O(d_n)$ , если  $\exists C : |c_n| \leq C|d_n|$

**Замечание.** Это не равенство в привычном смысле, следует читать его только слева направо.

## 0.5 Монотонные последовательности

**Определение 7.** (монотонные последовательности)

- $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  монотонно возрастает, если  $\forall n : a_n \leq a_{n+1}$  (возрастает строго если  $a_n < a_{n+1}$ )

- $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$  монотонно убывает, если  $\forall n : b_n \leq b_{n+1}$

**Замечание.** Говорят, что последовательность  $c_n$  монотонна, если она либо монотонно возрастает, либо монотонно убывает.

**Теорема 1.** (Теорема о пределе монотонной последовательности)

- Пусть есть последовательность  $\{c_n\}_{n=1}^{\infty}$ , тогда  $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} c_n \in \overline{\mathbb{R}}$ .
- Для того, чтобы монотонно возрастающая последовательность имела конечный предел, необходимо и достаточно, чтобы последовательность была ограничена сверху.
- Для того, чтобы монотонно убывающая последовательность имела конечный предел необходимо и достаточно, чтобы последовательность была ограничена снизу.

При этом справедливы неравенства:

- $\forall m : c_m \leq \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$  — если последовательность возрастает. (или  $<$  если строго возрастает)
- $\forall m : c_m \geq \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$  — если последовательность убывает.

**Доказательство.** 1. Предположим, что последовательность  $c_n$  не ограничена сверху, тогда:

$$\forall L \in \mathbb{R} : \exists N : c_N > L$$

$$\forall n > N : c_n \geq c_{n-1} \geq c_{n-2} \geq \dots \geq c_N + 1 \geq c_N > L, \text{ значит } c_n > L$$

Значит по определению предела:  $\lim c_n = +\infty$

2. Предположим теперь, что последовательность  $c_n$  возрастает и ограничена сверху, тогда:

$$\begin{cases} c_n \leq c_{n+1} \\ \exists M : \forall n : c_n \leq M \end{cases}$$

Пусть  $E = \{c_n : n \in \mathbb{N}\}$  — множество из всех элементов последовательности  $c_n$ .

Значит  $E$  — ограничено сверху. Положим  $C = \sup E$ , тогда имеем  $\forall n : c_n \leq C$

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 : C - \varepsilon &\text{ — не верхняя граница, значит } \exists N : c_N > C - \varepsilon \Rightarrow \\ \forall n > N : c_n &\geq c_{n-1} \geq \dots \geq c_N > C - \varepsilon \Rightarrow C - \varepsilon < c_n \leq C < \\ C + \varepsilon &\Rightarrow |c_n - C| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = C \end{aligned}$$

В обратную сторону: если  $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = C \in \mathbb{R} \Rightarrow \exists M : \forall n : |c_n - C| < M \Rightarrow \forall n : c_n \leq C + M$

3. Доказательство для убывающей последовательности аналогично.  $\square$

**Теорема 2.** (Теорема о вложенных промежутках)

Пусть  $\forall n : [a_n, b_n] \supset [a_{n+1}, b_{n+1}]$  и  $b_n - a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ .

Тогда  $\exists! c : \forall n : c \in [a_n, b_n]$

**Доказательство.** 1. существование

имеем неравенства:

$$\forall n : \begin{cases} a_n \leq a_{n+1} \\ b_n \geq b_{n+1} \\ a_n < b_n \end{cases} \Rightarrow a_n < b_1, b_n > a_1$$

Тогда в силу возрастания  $a_n$  и убывания  $b_n$  по предыдущей теореме  $\exists a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  и  $\exists b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$

По свойству перехода к пределу в неравенствах:  $a_n < b_n \Rightarrow a \leq b$

$$\text{Имеем } \begin{cases} \forall n : a_n \geq a \\ \forall n : b \leq b_n \end{cases} \Rightarrow \forall n : b - a \leq b_n - a_n \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (b - a) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0 \text{ — в силу условия.}$$

$$\text{Значит } b - a = 0 \Rightarrow a = b \stackrel{\text{def}}{=} c$$

Имеем  $a_n \leq c \leq b_n$ , т.е.  $c \in [a_n, b_n]$

2. Единственность

Если бы  $\exists c_0 \in [a_n, b_n]$ , то  $|c_0 - c| \leq b_n - a_n \Rightarrow |c_0 - c| < \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0 \Rightarrow c_0 = c$

$\square$

**Замечание.** Условие замкнутости промежутков существенно:

Имеем  $(0, \frac{1}{n+1}] \supset (0, \frac{1}{n}]$ ,  $\frac{1}{n} - 0 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

Но  $\bigcap_{n=1}^{\infty} (0, \frac{1}{n}] = \emptyset$

## 0.6 Число $e$

**Теорема 3.** Пусть  $x_n = (1 + \frac{1}{n})^n$  и  $y_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$

Тогда  $\forall n : x_n < y_n$  и  $x_n \rightarrow e, y_n \rightarrow e, 2 < e < 3$

**Доказательство.** Рассмотрим:

$$\frac{y_{n-1}}{y_n} = \frac{(\frac{n}{n-1})^n}{(\frac{n+1}{n})^{n+1}} = (\frac{n}{n+1})^{n+1} \cdot (\frac{n}{n-1})^n = (\frac{n}{n+1})^n \cdot (\frac{n}{n+1})^n \cdot (\frac{n}{n-1})^n =$$

$$= \frac{n}{n+1} \cdot \left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^n = \frac{n}{n+1} \cdot \left(\frac{n^2-1+1}{n^2-1}\right)^n = \frac{n}{n+1} \cdot \left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^n$$

Возьмем за  $x = \frac{1}{n^2-1}$ , тогда по неравенству Бернулли:

$$\frac{n}{n+1} \cdot \left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^n > \frac{1}{n+1} \cdot \left(1 + \frac{n}{n^2-1}\right) = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{n^2-1+n}{n^2-1} =$$

$$\frac{n^3+n^2-n}{n^3+n^2-n-1} > 1$$

$\Rightarrow y_n < y_{n-1} \Rightarrow y_n$  — строго монотонно убывающая.

Теперь рассмотрим  $x_n$  : (считаем, что  $n \geq 3$ )

$$\begin{aligned} x_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k \left(\frac{1}{n}\right)^k = 1 + n \cdot \frac{1}{n} + \sum_{k=2}^n C_n^k \frac{1}{n^k} = \\ &= 2 + \sum_{k=2}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{1}{n^k} = 2 + \sum_{k=2}^n \frac{(n-k+1) \cdot \dots \cdot n}{k! \cdot n^k} = \\ &= 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} \cdot \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{k-2}{n}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

(Продолжение на следующей лекции)

□