File name: TAPBdmpdaStandardLowQ_eiger2_18290_sub_rebin_ang.dat

SasView version: 5.0.6

SasModels version: 1.0.7

Fit optimizer used: Levenberg-Marquardt

Model name: sphere+cylinder

Q Range: min = 0.00010925045900000001, max = 0.025671497

Chi2/Npts: 0.17466

scale = 9.3158e-06 ± 4.6923e-05

background = 0.08 (fixed) cm^{-1}

spherecyl = (fixed)

A_scale = 2.0278 ± 16.595

A_sld = 12.26 ± 15.081 10^{-6}/Å^2

A_sld_solvent = 8.9 (fixed) 10^{-6}/Å^2

A_radius = 252.73 ± 252.53 Å

B_scale = 2.8844 ± 14.428

B_sld = 13.362 ± 4.0544 10^{-6}/Å^2

B_sld_solvent = 8.9 (fixed) 10^{-6}/Å^2

B_radius = 2605.6 ± 458.29 Å

B_length = 2699.3 ± 422.19 Å

Distribution of A_radius = 0.61828 ± 0.33917 Function: lognormal

Distribution of B_radius = 0.58885 ± 0.074467 Function: lognormal

Distribution of B_length = 0.3049 ± 0.09901 Function: lognormal

Graph

Model Computation

Data: "TAPBdmpdaStandardLowQ_eiger2_18290_sub_rebin_ang.dat"

M1 A_radius polydispersity [TAPBdmpdaStandardLowQ_eiger2_18290_sub_rebin_ang.dat]

M1 B_radius polydispersity [TAPBdmpdaStandardLowQ_eiger2_18290_sub_rebin_ang.dat]

M1 B_length polydispersity [TAPBdmpdaStandardLowQ_eiger2_18290_sub_rebin_ang.dat]