File name: TAPBdmpdaStandardLowQ_eiger2_18270_sub_rebin_ang.dat

SasView version: 5.0.6

SasModels version: 1.0.7

Fit optimizer used: Levenberg-Marquardt

Model name: sphere+cylinder

Q Range: min = 0.00010925045900000001, max = 0.025671497

Chi2/Npts: 0.90052

scale = 8.7465e-06 ± 1.6435e-05

background = 0.08 (fixed) cm^{-1}

spherecyl = (fixed)

A_scale = 1.6001 ± 3.0167

A_sld = 12.202 ± 4.1662 10^{-6}/Å^2

A_sld_solvent = 8.9 (fixed) 10^{-6}/Å^2

A_radius = 283.66 ± 35.068 Å

B_scale = 2.6964 ± 4.6137

B_sld = 13.203 ± 1.5037 10^{-6}/Å^2

B_sld_solvent = 8.9 (fixed) 10^{-6}/Å^2

B_radius = 1909.8 ± 244.84 Å

B_length = 2711.5 ± 133.04 Å

Distribution of A_radius = 0.52348 ± 0.043705 Function: lognormal

Distribution of B_radius = 0.4927 ± 0.046187 Function: lognormal

Distribution of B_length = 0.36664 ± 0.016617 Function: lognormal

Graph

Model Computation
Data: "TAPBdmpdaStandardLowQ_eiger2_18270_sub_rebin_ang.dat"

M2 A_radius polydispersity [TAPBdmpdaStandardLowQ_eiger2_18270_sub_rebin_ang.dat]

M2 B_radius polydispersity [TAPBdmpdaStandardLowQ_eiger2_18270_sub_rebin_ang.dat]

M2 B_length polydispersity [TAPBdmpdaStandardLowQ_eiger2_18270_sub_rebin_ang.dat]