File name: TAPBdmpdaStandardLowQ_eiger2_18540_sub_rebin_ang.dat
SasView version: 5.0.6
SasModels version: 1.0.7
Fit optimizer used: Levenberg-Marquardt
Model name: fractal+cylinder
Q Range: min = 0.00010925045900000001, max = 0.025671497
Chi2/Npts: 0.35157
scale = 0.00021602 ± 0.0010087
background = 0.05 (fixed) cm^{-1}
fractalcylinder = (fixed)
A_scale = 0.20063 ± 1.7513
A_volfraction = 0.090738 ± 0.78242
A_radius = 2449.1 ± 245.29 Å
A_fractal_dim = 3 ± 1e+08
A_cor_length = 0 ± 1e+08 Å
A_sld_block = 13.643 ± 16.743 10^{-6}/Å^2
A_sld_solvent = 8.9 (fixed) 10^{-6}/Å^2
B_scale = 0.42967 ± 1.9242
B_sld = 11.962 ± 3.678 10^{-6}/Å^2
B_sld_solvent = 8.9 (fixed) 10^{-6}/Å^2
B_radius = 8157 ± 99.828 Å
B_length = 930.75 ± 146.57 Å
Distribution of A_radius = 0.20157 ± 0.059255 Function: lognormal
Distribution of B_radius = 0.21449 ± 0.013282 Function: lognormal
Distribution of B_length = 1 ± 0.11823 Function: lognormal

Graph

Model Computation
Data: "TAPBdmpdaStandardLowQ_eiger2_18540_sub_rebin_ang.dat"

M1 A_radius polydispersity [TAPBdmpdaStandardLowQ_eiger2_18540_sub_rebin_ang.dat]

M1 B_radius polydispersity [TAPBdmpdaStandardLowQ_eiger2_18540_sub_rebin_ang.dat]

M1 B_length polydispersity [TAPBdmpdaStandardLowQ_eiger2_18540_sub_rebin_ang.dat]