

تعليمات ما بعد العلاج – عيادة ابتسامة الأطلس

بيانات وهمية لأغراض التدريب والبوليتفوليو فقط. تعليمات عامة،
وتبقى تعليمات الطبيب المعالج هي المرجع الأول.

بعد / (Après extraction / بعد خلع الضرس (تقلاع الضرس)

- عَضْ على الشاش الطبي لمدة 30 إلى 45 دقيقة دون تحريكه.
 - لا تتمضمض بقوة، ولا تستعمل القشة، ولا تدخن لمدة 24 ساعة على الأقل.
 - تجنب الأكل والشرب الساخين في أول 24 ساعة، وتناول طعاماً ليناً وبارداً.
 - ضع كمادات باردة على الخد من الخارج، 15 دقيقة ثم راحة 15 دقيقة، خلال أول يوم.
 - ارفع رأسك بوسادة إضافية عند النوم.
 - نظّف بقية الأسنان بشكل عادي وتجنب مكان الخلع في اليوم الأول.
- اتصل بالعيادة إذا استمر النزيف أكثر من ساعتين، أو ازداد الألم بعد اليوم الثالث، أو ظهر تورم متزايد أو حمى.

بعد الخلع الجراحي وضرس العقل

تنطبق تعليمات الخلع أعلاه. يبلغ التورم ذروته في اليوم الثاني أو الثالث ثم يتحسن تدريجياً. تُزال الخيوط في موعد بعد 7 إلى 10 أيام يحدده الطبيب. تجنب الطعام الصلب لمدة أسبوع.

بعد حشو / (Après plombage) بعد الحشو (الضرس)

- يستمر أثر التخدير من ساعتين إلى ثلاث ساعات. لا تأكل حتى يزول تماماً حتى لا تعضّ خدك أو لسانك دون أن تشعر.
- قد تشعر بحساسية خفيفة للبارد والساخن لبضعة أيام، وهذا طبيعي.
- إذا شعرت أن الأسنان لا تنطبق جيداً عند العض، اتصل بالعيادة لضبط الحشو.

بعد علاج العصب (Après dévitalisation)

- ألم أو انزعاج خفيف لمدة 2 إلى 3 أيام أمر طبيعي.
- تجنب المضغ على السن المعالجة حتى يُركَّب الترميم النهائي.
- قد يتفتت الحشو المؤقت قليلاً، وهذا لا يستدعي القلق. يُنصح بإتمام الترميم النهائي (حشو كبير أو تاج) خلال 2 إلى 4 أسابيع. اتصل بالعيادة إذا ظهر تورم أو ألم شديد لا يخف.

بعد تنظيف الجير (Après détartrage)

قد تنزف اللثة قليلاً في اليوم الأول وقد تظهر حساسية خفيفة. استعمل فرشاة ناعمة ومعجوناً للأسنان الحساسة إن لزم.

بعد التبييض (Après blanchiment)

- تجنب القهوة والشاي والمشروبات الغازية الملونة والصلصات الملونة والتدخين لمدة 48 ساعة.
- قد تشعر بحساسية من يوم إلى ثلاثة أيام، ويخففها معجون الأسنان الحساسة.

بعد زراعة الأسنان

تنطبق تعليمات الخلع الجراحي. لا تضغط على مكان الزرعة بلسانك أو أصابعك، وتناول طعاماً ليناً لمدة أسبوعين. احضر مواعيد المتابعة بدقة.

أثناء التقويم (Appareil dentaire)

- ألم خفيف في أول 3 إلى 5 أيام بعد التركيب وبعد كل تعديل، وهذا طبيعي. تناول طعاماً ليناً خلال هذه الفترة.
- استعمل شمع التقويم على الأجزاء المعدنية إذا تهيج الخد.
- نظّف الأسنان بعد كل وجبة، واستعمل الفرشاة البينية.
- تجنب الأطعمة الصلبة واللزجة.
- اتصل بالعيادة (brackets) إذا انكسر سلك أو انفك أحد الأزرار لتحديد موعد.

الأدوية والمسكنات

لا يصف المساعد الآلي أدوية ولا جرعات. يحدد الطبيب المسكن المناسب لكل مريض بعد العلاج، وعلى المريض التواصل مع العيادة للاستفسار.

متى أتصل بالعيادة فوراً

- نزيف مستمر لأكثر من ساعتين.
 - ألم شديد لا يخف.
 - تورم يزداد في الوجه أو الفك، خاصة مع الحمى.
 - كسر سن أو ضربة على الفم.
- في حالة صعوبة البلع أو التنفس، أو خارج ساعات العمل مع نزيف شديد أو تورم الوجه والحمى، توجه فوراً إلى مستعجلات أقرب مستشفى.