
$f_{\rm cocoon}$
$R_{\rm vir,\,0}$ [pc]
0.75
1.50
3.00
6.00
cocoon
$\sigma_{v_{\rm GSR},\,\rm cocoon}$ [km s^{-1}]
$\sigma_{\phi_2,\,\rm cocoon}$ [°]
thin stream
$\sigma_{v_{\rm GSR},\,\rm thin}$ [km s^{-1}]
$\sigma_{\phi_2,\,\rm thin}$ [°]
Single-component fits
from noised data,
with binaries
Values from Jarvis+26
This model fit to Jarvis+26 data
Pal 5; $r_{\rm peri} = 7.8$ kpc
AAU; $r_{\rm peri} = 12.2$ kpc
C-19; $r_{\rm peri} = 12.4$ kpc
GD-1; $r_{\rm peri} = 13.9$ kpc
Jet; $r_{\rm peri} = 15.4$ kpc
DESI/binaries
DESI/CM
Via/binaries
Via/CM
$2 \times f_{\rm bin}$/CM
$R_{\rm vir,\,0} = 0.75$ pc
$R_{\rm vir,\,0} = 1.5$ pc
$R_{\rm vir,\,0} = 3$ pc
$R_{\rm vir,\,0} = 6$ pc