Unité de mesure et grandeurs physique

1.1 Généralités

1.1.1 Différences

Cette annexe énumère les unités de mesures et de leur grandeurs physiques associées à connaître pour la maitrise des formules mathématiques en électrotechnique. Il convient de bien identifier ce qu'est une grandeur physique et une unité de mesure :

Unité de mesure Étalon de mesure nécessaire pour la mesure d'une grandeur physique dont le fondement est l'exacte reproductibilité expérimentale de l'étalon;

Grandeur physique Toute propriété des sciences de la nature qui peut être mesurée ou calculées et dont les différentes valeurs s'expriment à l'aide d'une nombre réel ou complexe. Une grandeur physique peut s'exprimer sans unité de mesure, ce sont des grandeurs sans dimension. Mais l'inverse n'est pas vraie, toute unité de mesure est associée une grandeur physique.

La notion générale de grandeur physique peut être divisées en des notions plus précises, indiquée au moyen d'indices ou d'un symbole usuel différent.

Dimension Expression de la dépendance d'une grandeur par rapport aux grandeurs de base d'un système de grandeurs sous la forme d'un produit de puissance de facteurs correspondant aux grandeurs de base, en omettant tout facteur numérique.

Les tableaux situés en sous-section 1.1.5 page 2 sont issus des normes ISO 80000-xx^{ISO:80000-2013}, les normes internationales régissant le Système International de grandeurs (*International System of Quantities*, ISQ), qui font également le lien avec le Système International d'unités (SI).

1.1.2 Quelques règles de rédaction

Symboles des grandeurs Les symboles usuels des grandeurs prennent généralement la forme d'une seule lettre (alphabet grec ou latin), toujours en italique, et peuvent être précisés par des indices.

Indice Un indice permet de différencier des grandeurs présentant le même symbole usuel ou, pour une même grandeur, différentes applications de celle-ci.

- Symbole d'une grandeur physique ou d'une variable mathématique ;
- Mots ou nombres fixes.

Symboles des unités Les symboles des unités prennent généralement la forme d'une seule lettre (alphabet grec ou latin), toujours en caractère droit, ce qui permet de les différencier des symboles des grandeurs.

Une unité composée d'une multiplication de deux unités ou plus peut être indiquée de deux manières :

 $N \cdot m$

Nm

Il convient de faire attention lorsque le symbole d'une unité est le même que celui d'un préfixe.



1.1.3 Terminologie

Coefficient Dans une équation type $A = k \cdot B$, k est le coefficient/facteur et A est une grandeur proportionnelle à B. Usage du terme coefficient (ou module) lorsque les grandeurs A et B présentent des dimensions différentes.

Facteur Dans une équation type $A = k \cdot B$, k est le coefficient/facteur et A est une grandeur proportionnelle à B. Usage du terme facteur lorsque les grandeurs A et B sont de même dimension.

Paramètre Combinaison de grandeurs qui apparaissent sous une telle forme dans les équations, pouvant être considérée comme constituant de nouvelles grandeurs.

Nombre Combinaison de grandeurs sans dimension.

Rapport Quotient sans dimension de deux grandeurs.

Constante Grandeur qui présente la même valeur en toutes circonstances.

Massique Adjectif apposé à une grandeur caractérisant le quotient de cette grandeur par la masse.

Volumique Adjectif apposé à une grandeur caractérisant le quotient de cette grandeur par le volume.

Surfacique Adjectif apposé à une grandeur caractérisant le quotient de cette grandeur par l'aire.

Densité Adjectif apposé à une grandeur exprimant un flux ou un courant, qui caractérise le quotient de cette grandeur par l'aire.

Linéique Adjectif apposé à une grandeur caractérisant le quotient de cette grandeur par la longueur.

Molaire Adjectif apposé à une grandeur caractérisant le quotient de cette grandeur par la quantité de matière.

Concentration Adjectif apposé à une grandeur, spécifiquement dans le cas d'un mélange, caractérisant le quotient de cette grandeur par le volume total.

1.1.4 Alphabet

Nom		actère nain		actère lique	Nom		actère nain		actère lique
alpha	A	α	A	α	nu	N	ν	N	ν
beta	В	β	B	β	xi	Ξ	ξ	Ξ	ξ
gamma	Γ	γ	Γ	γ	omicron	O	O	O	0
delta	Δ	δ	Δ	δ	pi	П	π , ϖ	Π	π, ϖ
epsilon	\mathbf{E}	ϵ, ϵ	E	$\epsilon, arepsilon$	${ m rh\hat{o}}$	Р	ρ, ϱ	P	ho,arrho
zêta	\mathbf{Z}	ζ	Z	ζ	$_{ m sigma}$	Σ	σ	Σ	σ
êta	Η	η	H	η	tau	${ m T}$	τ	T	au
thêta	Θ	θ, ϑ	Θ	θ, ϑ	upsilon	Y	υ	Y	υ
iota	I	ı	I	ι	phi	Φ	ф	Φ	ϕ
kappa	K	κ, χ	K	κ, \varkappa	khi	X	χ	X	χ
lambda	Λ	λ	Λ	λ	psi	Ψ	Ψ	Ψ	ψ
mu	\mathbf{M}	μ	M	μ	oméga	Ω	ω	Ω	Ω

Tab. 1.1 – Alphabet grec

1.1.5 Système International

1.1.5.1 Généralités

Le Système International d'unités est un système cohérent d'unités dans l'ISQ. Il est abrégé SI dans toutes les langues et est formé de :



- Sept unités de base ;
- Des unités dérivées de ces unités de base.

1.1.5.2 Unités SI et grandeurs

Grandeur de bas	e de l'ISQ	Unité SI de base		
Nom	Symbole usuel	Nom	Symbole	
Longueur	L	mètre	m	
Masse	M, m	kilogramme	kg	
Temps	T	seconde	S	
Courant électrique	I	ampère	A	
Température thermo-	Θ	kelvin	K	
dynamique				
Quantité de matière	N	mole	mol	
Intensité lumineuse	J	candela	cd	

Tab. 1.2 – Unités SI et grandeurs correspondante de base

Facteur	P	réfixe	Facteur	P	réfixe
racteur	Nom	Symbole	Tacteur	Nom	Symbole
10^{24}	yotta	Y	10^{-1}	déci	d
10^{21}	zetta	${ m Z}$	10^{-2}	centi	\mathbf{c}
10^{18}	exa	${ m E}$			
10^{15}	péta	Р	10^{-3}	milli	m
	_		10^{-6}	micro	μ
10^{12}	téra	${ m T}$	10^{-9}	nano	n
10^{9}	giga	G	10^{-12}	pico	p
10^{6}	méga	${ m M}$		-	-
10^{3}	kilo	k	10^{-15}	femto	f
			10^{-18}	atto	a
10^{2}	hecto	h	10^{-21}	zepto	\mathbf{z}
10^{1}	déca	da	10^{-24}	yocto	У

Tab. 1.3 – Préfixes des unités SI

TAB. 1.4 – Unités SI dérivées avec des noms et des symboles spéciaux

Grandeur dériv	ée de l'ISQ	Unité SI dérivée		
Nom	Symbole usuel	Nom	Symbole & Valeur	
Angle plan	α	radian	$rad = m m^{-1}$	
Angle solide	Ω	stéradian	$sr = m^2 m^{-2}$	
Fréquence	f	hertz	$Hz = s^{-1}$	
Force	F	newton	$N = kg m s^{-2}$	
Pression, contrainte	P	pascal	$Pa = N m^{-2}$	
Énergie, travail	W	joule	$J = kg m^2 s^{-2}$	
Puissance	P	watt	$W = Js^{-1}$	
Charge électrique	Q	coulomb	C = As	

 $Page\ suivante$



Grandeur dérivée	de l'ISQ	Unité SI dérivée		
Nom	Symbole usuel	Nom	Symbole & Valeur	
Différence de potentiel élec-	U,V	volt	$V = WA^{-1}$	
trique				
Capacité électrique	C	farad	$F = CV^{-1}$	
Résistance électrique	R	ohm	$\Omega = V A^{-1}$	
Conductance électrique	G	siemens	$S = \Omega^{-1}$	
Flux d'induction magné-	Φ	weber	Wb = Vs	
tique				
Induction (champ) magné-	\overrightarrow{B}	tesla	$T = Wb m^{-2}$	
tique				
Inductance	L	henry	$H = Wb A^{-1}$	
Température Celsius	T	celsius	$^{\circ}C = K - 273,15$	
Flux lumineux	J	lumen	lm = cd sr	
Éclairement lumineux	E, E_{v}	lux	$lx = lm m^{-2}$	

Gr	andeur		Unités
Nom	Symbole usuel	Nom	Symbole & Valeur
Temps	t	minute heure jour	
Angle plan	lpha	degré minute seconde	$ \begin{array}{rcl} \circ & = & 180/\pi \times \text{rad} \\ ' & = & 1/60 \times \circ \\ '' & = & 1/60 \times ' \end{array} $
Volume	V	litre	$l, L = dm^3$
Masse	M, m	tonne	t = 1000 kg

Tab. 1.5 – Unités en usage avec le SI

Gran	$\mathbf{Grandeur}$		Unités			
Nom	Symbole usuel	Nom Symbole & Valeur				
Énergie	W	électronvolt	Énergie cinétique acquise par un électron en traversant une différence de potentiel de 1 v dans le vide. eV = $1,602176634e - 19J$			
Masse	M, m	dalton	$^{1}/_{12}$ de la masse d'un atome du nucléide $^{12}\mathrm{C}$ au repos et à l'état fondamental. Da = $1,660538782\mathrm{e} - 27\mathrm{kg}$			
Longueur	L	unité astrono- mique	Valeur conventionnelle approximativement égale à la valeur moyenne de la distance entre le Soleil et la Terre. au = 1,49597870691e11m			

 ${\it Tab.}\ 1.6$ – Unités en usage avec le SI dont la valeur est obtenue expérimentalement



1.2 Mathématique

Les tableaux suivants sont extraits de l'ouvrage **BourgeoisCogniel2005**, ils référencent les notations mathématiques utilisées en électrotechnique.

Signe	Utilisation	Énoncé	Signe	Utilisation	Énoncé
=	a = b	a égal b	+	a + b	a plus b
≠	$a \neq b$	a est différent de b	_	a - b	a moins b
≜	$a \triangleq b$	a correspond à b	×	$a \times b$	a multiplié par b
\simeq	$a \simeq b$	a est approximative-		$a \cdot b$	
		ment égal à b		ab	
<	a < b	a est strictement infé-	_	$\frac{a}{b}$	a divisé par b
	a > h	rieur à <i>b</i>	/	a/b	u divise pai v
>	a > b	a est strictement supérieur à b	/	n	
≤	$a \leq b$	a est inférieur ou égal à	\sum	$\sum_{i=1}^{n} a_{i}$	$a_1 + a_2 + a_3 \dots a_n$
	$a \ge b$	b	_	i=1	1 2 0 %
≥	$a \ge b$	a est supérieur ou égal à	П	$\prod_{n=1}^{n} a_n$	a V a V a
		b	П	$\prod_{i=1} a_i$	$a_1 \times a_2 \times a_3 \dots a_n$
«	$a \ll b$	a est très inférieur ou	,	n!	$1 \times 2 \times 3 \dots n$
		égal à b	:	a^n	a puissance n
>>	$a \gg b$	a est très supérieur ou			•
		égal à b		\sqrt{a}	racine carrée de a
∞		infini		$\sqrt[n]{a}$	racine ne de a
	a 1 h			$a^{1/n}$	
±	$a \pm b$	a plus ou moins b	11	a	valeur absolue de a
€	$x \in A$	x appartient à a		11	
∉	$x \notin A$	x n'appartient pas à a			

Tab. 1.7 – Signes mathématiques

Tab. 1.8 – Classification des locaux

Symbole	Énoncé	Symbole	Énoncé
f $f(x)$	fonction ou application valeur de la fonction f respective-	$\frac{\delta f}{\delta x}$	variation élémentaire de la fonction f par rapport à x
$[f(x)]_b^a$	ment en x f(b) - f(a)	$\int_{a}^{b} f(x)dx$	intégrale définie de la fonction f de a à b
$f(x) \mid_b^a \lim_{x \to a} f(x)$	limite de $f(x)$ quand x tend vers a	$\int_{a}^{b} f(x)dx$	intégrale définie de la fonction f de a à b
f'	dérivée (première) de la fonction f	\mathbb{N} \mathbb{Z}	ensemble des entiers naturels ensemble des entiers
$f^{(k)}(x)$	dérivée d'ordre k de la fonction f	Q	ensemble des nombres rationnels
Δf	dérivée totale globale de la fonction $f^{\mathbf{Wiki:NDS}}$	R C	ensemble des entiers réels ensemble des nombres complexes
$\frac{df}{dx}$	dérivée totale locale de la fonction f par rapport à x	\mathbb{P} $\cos x$	ensemble des nombres premiers cosinus de x
$\frac{\partial f}{\partial x}$	dérivée partielle locale de la fonction f par rapport à x	$ \sin x \\ \tan x \\ \cot x $	sinus de x tangente de x cotangente de x

 $Colonne\ suivante \\ Page\ suivante$



Symbole	Énoncé	Symbole	Énoncé
$\arccos x$	réciproque du cosinus de x	$\ln x$	logarithme népérien de x
$\arcsin x$	inverse du sinus de x	$\lg x$	logarithme décimal de x
$\arctan x$	inverse de la tangente de x	i ou j	unité imaginaire
e = 2,7182818	base des logarithmes népériens	arg	argument
$\exp x$	exponentielle de base e de x		

 $Colonne\ suivante$

1.3 Espace & temps

1.3.1 Généralités

Les tableaux suivants détaillent les noms, les symboles et les définitions des unités et grandeurs utilisées pour décrire mathématiquement l'espace et le temps. Ces notations seront d'application pour le restant des cours.

Tab. 1.9 – Unités SI et grandeurs définissant l'espace et le temps

Grandeur		${f Unit}{f \acute{e}}$		Remarque
Nom	Symbole usuel	Nom	Symbole	roomar que
Longueur	L, l	Mètre	m	
Largeur	B, b			
Hauteur	H, h			Le symbole H est régulièrement uti-
				lisé pour désigner l'altitude.
Épaisseur	d, δ			
Rayon	R, r			
Distance radiale	r_Q, ρ			
Diamètre	D, d			
Longueur curviligne	S			
Distance	d, r			
Rayon (vecteur)	\mathbf{r}			



Temporary page!

LATEX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it. If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because LATEX now knows how many pages to expect for this document.