Prefeitura de Fortaleza
Secretaria Municipal de Saúde

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para implante subdérmico liberador de etonogestrel 68 mg

Eu, _____, CPF _____, declaro ter recebido informações a respeito de benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos colaterais relacionados ao uso de implante subdérmico contraceptivo liberador de etonogestrel, indicado como método contraceptivo reversível de longa ação.

Compreendo que o implante contraceptivo é um pequeno tubo de plástico, de cerca de 4 centímetros de comprimento por 2 milímetros de diâmetro contendo um progestagênio (hormônio), chamado etonogestrel, e é colocado debaixo da pele do braço que não escrevo (braço não dominante).

Quem realiza a colocação é um profissional da saúde habilitado para tanto e foi me explicado que a ação do implante é contínua por 5 anos e acontece pela liberação do hormônio etonogestrel para o sangue da pessoa e funciona principalmente de dois modos: impede a ovulação; e espessa o muco do colo do útero, o que dificulta a passagem de espermatozoides para o útero.

Entendi que o implante tem eficácia superior a 99%, igual ou superior à eficácia da laqueadura tubária (5 gravidezes em 10.000 mulheres que usam o implante).

Compreendi ainda que as principais **vantagens** do implante são:

- É um método prático e de longa duração (5 anos).
- Evita ter que tomar a pílula todos os dias.
- Não interfere com a relação sexual.
- Não interfere com a amamentação.
- Melhora as cólicas menstruais.
- Pode ser usado por pessoas que não podem tomar pílulas contendo estrogênio.
- Não diminui a massa óssea (osteoporose).

Também foram a mim apresentadas as **possíveis desvantagens** desse método:

- Irregularidades da menstruação: na maioria dos casos, há sangramento irregular, seja aumento do fluxo menstrual ou ausência de menstruação. Essas alterações são mais comuns no primeiro ano, sendo que a cada 100 mulheres, 15 podem ter sangramento mais frequente.
- Algumas alterações da pele, dores de cabeça, enjoos, aumento da sensibilidade mamária e variações do humor (semelhantes às que ocorrem com outros métodos contraceptivos como a pílula).
- Cistos benignos nos ovários, que geralmente não necessitam de tratamento.

Prefeitura de Fortaleza
Secretaria Municipal de Saúde

Foi informado a mim também que o implante é eficaz em até sete dias após a colocação. É colocado na parte interna do braço, debaixo da pele, como se fosse uma injeção. É necessária anestesia local para inserção do implante. Pode ocorrer alguma dor, inchaço ou hematoma pequeno no local da colocação, que passa rapidamente.

Pode ser removido após 5 anos de sua inserção, ou antes, a meu pedido e para a remoção do implante, também é necessário anestesia local. Não há prejuízo à saúde caso não seja removido após o período de eficácia.

Os termos foram explicados e todas as dúvidas foram resolvidas pelo profissional da saúde _____, de número de registro no conselho de classe/UF _____, e sua equipe.

Afirmo ter recebido informação de maneira que pude entender quanto aos efeitos adversos e riscos de uso deste produto, sua frequência e gravidade. Estou ciente que a expulsão ou migração do implante é possível e que pode ser necessária pequena intervenção cirúrgica para a sua retirada em casos raros. Declaro ter recebido orientação da necessidade de acompanhamento após a implantação do dispositivo, inclusive com local e data do retorno. Recebi informações de qual lugar devo procurar caso eu tenha alguma complicação.

Assim, declaro satisfação com as informações e que compreendo os benefícios, os riscos e as consequências inerentes ao procedimento de inserção de implante subdérmico contraceptivo liberador de etonogestrel e estou de acordo com as condutas necessárias à realização deste procedimento.

Além disso, autorizo a Unidade de Atenção Primária à Saúde Doutor Edmar Fujita, localizada na Avenida Alberto Craveiro, nº 1480, Bairro Boa Vista/Castelão, Fortaleza-CE, a fazer uso de informações relativas ao meu prontuário sobre o uso do implante subdérmico contraceptivo liberador de etonogestrel, desde que seja assegurado o anonimato.

Fortaleza - CE, 06/08/2026

_____
Assinatura – Paciente

_____
Assinatura – Profissional de Saúde e registro de conselho de classe

Unidade de Atenção Primária à Saúde Doutor Edmar Fujita
Checklist para colocação do Implante Subdérmico Liberador de Etonogestrel 68 mg

Nome da paciente: _____
Data do nascimento: ___/___/_____ **Idade:** _____
Pressão arterial: ____x____ mmHg **Peso:** _____ kg **Altura:** _____ m
Alergias medicamentosas: ( ) NÃO ( ) SIM: _____
Patologias prévias: ( ) NÃO ( ) SIM: _____
Medicamentos em uso: ( ) NÃO ( ) SIM: _____

Contraindicações:

1) TVP ou TEP agudo	( ) NÃO	( ) SIM
2) Lúpus com anticorpo antifosfolípideo positivo	( ) NÃO	( ) SIM
3) Sangramento vaginal inexplicado	( ) NÃO	( ) SIM
4) Câncer sensível a esteroide sexual, inclusive mama ou ovário	( ) NÃO	( ) SIM
5) Cirrose severa (descompensada) ou tumor de fígado	( ) NÃO	( ) SIM

Contracepção atual:

( ) Contraceptivo oral	Data da última dose ___/___/_____
( ) Contraceptivo injetável mensal	Data da última dose ___/___/_____
( ) Contraceptivo injetável trimestral	Data da última dose ___/___/_____
( ) Dispositivo intrauterino	Data da inserção ___/___/_____
( ) Sem uso de método contraceptivo	

Data da última menstruação: ___/___/_____
(considerar até 7 dias do início da menstruação)
Data da última relação sexual: ___/___/_____
Teste rápido de gravidez: ___/___/_____
( ) Não realizado ( ) Negativo ( ) Positivo

Braço não dominante (de inserção): ( ) Esquerdo ( ) Direito

Orientações sobre possíveis efeitos adversos:
1) Irregularidade menstrual
2) Ganho ponderal
3) Acne
4) Cefaleia
5) Mastalgia

( ) CIENTE

Orientações Pós-inserção

Observações gerais

- O efeito anticoncepcional só inicia após 7 dias da inserção e até a chance de engravidar permanece alta.
- O implante não protege contra ISTs e, por isso, é importante usar sempre preservativo nas relações sexuais.
- Tem duração de 5 anos, mas pode ser removido a qualquer hora se quiser.
- Após os 5 anos, pode ser substituído por um novo se quiser.

Cuidados iniciais (primeiras 24-48h)

- Manter o curativo fechado e seco por 24h (não molhar).
- Após 24h, pode remover o curativo e usar um band-aid no local da inserção por até 5 dias.
- Em caso de dor no local, pode usar analgésicos comuns (paracetamol ou dipirona).
- É esperado um pequeno hematoma no local que some em poucos dias.

Sinais de alerta (retorno imediato ao posto)

- Febre, pele quente, vermelha ou com saída de pus.
- Saída do implante (ponta visível ou palpável)
- Não sentir o implante debaixo da pele.
- Dor intensa ou que piora no local da inserção.

Principais efeitos colaterais (marcar consulta para avaliar)

- Sangramento irregular: é possível a diminuição (ficar sem menstruar ou vir pouco sangue) ou o aumento (menstruar por mais dias ou mais de uma vez por mês), mas também pode mudar o padrão ao longo do uso.
- Espinhas (acne), dor de cabeça, enjoôs, variação do humor e sensibilidade nas mamas.
- Cistos no ovários (benignos, que não precisam ser tratados).