


核心精讲·慢性胃炎、消化性溃疡、阑尾炎、胰腺疾病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解 and 记忆思维导图




一、慢性胃炎

1. 非萎缩性/浅表性/单纯性胃炎：胃窦常见，黏膜浅层淋巴细胞和浆细胞浸润

2. 萎缩性胃炎

(1) 特征：黏膜变薄、皱襞变浅、黏膜下血管清晰可见、腺体变小和减少、胃小凹变浅及囊性扩张，淋巴细胞和浆细胞浸润（病程长者可形成淋巴滤泡）、纤维化

正常胃底黏膜



慢性萎缩性胃炎



(2) 腺上皮化生

假幽门腺化生	
肠上皮化生 (常见) 可有不典型/异型增生→可能癌变	完全型/小肠型/I型: 含有杯状、吸收、潘氏细胞 不完全型/II型: 含有杯状细胞 ①胃型/IIa 型 ② 结肠型/IIb 型→可能导致肠型胃癌大 2B

(3) A 型 VS B 型胃炎

	A 型胃炎	B 型胃炎 (常见)
病因	自身 免疫	Hp (常伴消化性溃疡)
抗壁细胞和内因子抗体	+	-
好发部位	胃体、胃底	胃窦
胃酸分泌	明显↓ (缺乏)	正常或↓
血胃泌素	↑	↓
血 VitB ₁₂	↓ (常伴恶性贫血)	正常

二、消化性溃疡

1. 病因: **Hp**, 防御屏障↓和侵袭因素↑等

	胃溃疡	十二指肠溃疡 (常见)
好发年龄	中老年 小老 dou 老胃病	青壮年
好发部位	胃窦小弯侧	球部前壁




图 11-2 幽门螺杆菌

沃森-斯塔里银染色 (Warthin-Starry 银染色) 示幽门螺杆菌呈黑色弯曲棒状 (箭头), 黏附于胃黏膜 (胃小凹) 表面, 细胞核为黑色。

2. 并发症

①出血: 最常见

②穿孔: 胃溃疡好发于**胃小弯**、十二指肠溃疡好发于**球部前壁**

③幽门狭窄

④癌变: 胃溃疡癌变率多<1% (来自溃疡**边缘**); **十二指肠溃疡几乎不癌变**

注意：GU 好发部位、出血好发部位、穿孔好发部位在胃小弯；DU 好发部位、急性穿孔好发部位在球部前壁，而 DU 出血和慢性穿孔好发部位在球部后壁**袜子-前面穿孔、后面出血**

3.胃溃疡的病理变化

(1) 圆形或椭圆形、多<2cm、边缘整齐如刀切、底部平坦、深达肌层、阶梯状（贲门侧深+幽门侧浅**本身有钱**），**周围黏膜皱襞呈放射状向溃疡集中**（溃疡底部瘢痕牵拉）

(2) 溃疡底部由内向外

①炎性渗出层：中性粒细胞等白细胞、纤维素

②坏死组织层：伊红色坏死组织（**纤维素样坏死**）

③**肉芽组织**层：大量新生毛细血管和成纤维细胞

④瘢痕组织层：**增殖性/闭塞性动脉内膜炎**（管腔狭窄闭塞、血栓形成）→影响再生使溃疡不易愈合、但**防止溃疡血管破裂出血**



图 11-3 胃溃疡

胃小弯近幽门处溃疡，边缘整齐，周围黏膜水肿，黏膜皱襞向周围放射状排列。





图 11-4 胃溃疡

溃疡断面呈斜置漏斗状，深达肌层，溃疡底部由内向外分为四层：A 为炎性渗出层；B 为坏死组织层；C 为肉芽组织层；D 为瘢痕层。



4.结局：渗出物及坏死组织逐渐被吸收、排出，已被破坏的肌层不能再生，由底部的**肉芽组织**增生形成瘢痕组织修复，同时周围**黏膜上皮再生**覆盖溃疡面而愈合




图 11-5 消化性溃疡愈合

三、急性阑尾炎

- (1) **中性粒细胞**等浸润
- (2) 单纯性、**化脓性（蜂窝织炎）**、坏疽穿孔性（可致弥漫性腹膜炎、阑尾周围脓肿）

炎症类型举例

- ①**变质**性炎：乙脑、阿米巴、病毒性肝炎等
- ②**纤维素**性炎：假膜性炎/黏膜的纤维素性炎（细菌性痢疾和白喉**假的立白**）、绒毛心、大叶性肺炎等
- ③**化脓**性炎：小叶性肺炎、流脑、淋病、急性阑尾炎等

四、胰腺疾病

1.急性胰腺炎

- ①水肿性/轻型（常见）
- ②出血坏死性/重型：胰腺明显肿大、大量出血、胰腺大片凝固性坏死、胰腺周围**脂肪坏死（特殊液化性坏死）**、黄白色斑点（**钙皂**）

2.胰腺癌

- ①好发部位：胰头
- ②最常见组织学类型：导管腺癌

真题解析·慢性胃炎、消化性溃疡、阑尾炎、胰腺疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

2013N166 X 胃溃疡的镜下病理特征有

- A.纤维瘢痕形成
- B.肉芽肿形成
- C.闭塞性动脉内膜炎
- D.纤维蛋白和中性粒细胞渗出

2015N167 X 以下选项中，属于慢性萎缩性胃炎的病变有

- A.胃黏膜慢性炎细胞浸润

- B.肠上皮化生
- C.幽门螺杆菌阳性
- D.鳞状上皮化生

2019N151 X 消化性溃疡的好发部位为

- A.十二指肠球部
- B.十二指肠升部
- C.胃窦部小弯侧
- D.胃窦部大弯侧

2022N150 X 消化性溃疡发生游离性穿孔的常见部位有

- A.胃小弯
- B.十二指肠球部前壁
- C.胃大弯
- D.十二指肠球部后壁

2023N36 A 胃体黏膜活检可见大量假幽门腺化生，病理诊断是

- A.慢性浅表性胃炎
- B.慢性萎缩性胃炎
- C.慢性肥厚性胃炎
- D.疣状胃炎

思维导图 • 慢性胃炎、消化性溃疡、阑尾炎、胰腺疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

