


核心精讲·病毒性肝炎

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解 and 记忆思维导图



一、病理变化——变质性炎

(一) 变质

水（水肿）解（溶解性坏死）脂肪（脂肪变性）酸（嗜酸性变和嗜酸性坏死）

1. 肝细胞**水肿/水样变性（最常见）**：肝细胞体积增大、**胞质/浆疏松化、气球样变**


2. **溶解性坏死（液化性坏死）** 淹死了

(1) **点状坏死** (~~旧称灶状/性坏死~~)

① 肝小叶内一至数个肝细胞坏死

② 见于**急性普通型肝炎、较轻慢性（普通型）肝炎、酒精性肝炎**等

③ 能**完全再生修复**



(2) **碎片状坏死/界面性肝炎**

① 肝小叶**周边界板**处肝细胞的灶性坏死

② 提示进入**慢性肝炎**（慢慢越界 ttsx）

(3) **桥接坏死/多小叶坏死形成坏死带**


① 两个中央静脉间、两个门/汇管区间、或中央静脉与门管区之间相互连接的肝细胞坏死

② **较重慢性肝炎的特征，与肝硬化最相关**（有重新分割小叶的感觉）

(4) 亚大块及大块坏死

①累及大部分或整个肝小叶 ($>$ 肝实质 $2/3$ 为大块、 $1/2-2/3$ 之间为亚大块), 导致**网状纤维支架塌陷**

②见于**重型肝炎**



3.嗜酸性变和嗜酸性坏死: 凋亡 (形成嗜酸性小体/Councilman body)

4.脂肪变性

①最多见于**丙肝、丁肝**

②肝细胞胞浆出现球形脂滴 (**空泡或苏丹III阳性**)。当肝细胞胞质内出现很多小脂滴泡、但尚未挤压细胞核时称为微泡型脂肪变; 当胞质内被一个大脂滴泡所占据、**将细胞核挤压至一侧**时称为**大泡型脂肪变**

注意: 病毒性肝炎没有脂肪坏死。脂肪坏死见于急性重型胰腺炎、女性乳房创伤

(二) 渗出和增生

1.渗出: 主要为**淋巴细胞和单核细胞**浸润 (林丹)

2.增生

①肝细胞: 再生的肝细胞体积较大、核大深染、有时可见双核 (不是异型增生), 邻近肝细胞可通过再生沿网状支架修复; 若坏死严重导致网状支架塌陷、再生的肝细胞呈**结节状再生 (再生结节)**

②Kupffer 细胞

③成纤维细胞

④肝**星状/贮脂细胞**：合成胶原纤维（**纤维化**）的主要细胞，是**导致肝硬化**最重要的细胞

⑤血管（间叶细胞）、小胆管

二、临床病理类型

（一）普通型肝炎

1. **急性普通**型肝炎（最常见）水一点上普通学校

①肝肿大

②**广泛水样变性**（气球样变等）

③**轻微点状坏死**、嗜酸性坏死/凋亡（Councilman body）




图 11-7 急性普通型肝炎
肝细胞水肿, 箭头示点状坏死处伴炎症细胞浸润。

2. **慢性**（普通型）肝炎

①较轻：点状坏死、碎片状坏死等，少量纤维化

②较重：**明显碎片状坏死、桥接坏死、纤维化，可致肝硬化**

（二）重型肝炎（肝缩小）

1. **急性重型**肝炎/暴发型肝炎

①质**软**、切面呈**黄红色**（急性黄/红色肝萎缩）**脂肪代谢-黄**；**肝血窦明显扩张充血出血-红**

②肝细胞**大块坏死**，**网状支架塌陷**，仅小叶**周边**残留少许变性肝细胞（残留的肝细胞**无**明显再生）




图 11-8 急性重型肝炎

A. 肝体积明显缩小, 重量明显减轻, 被膜皱缩, 质地柔软; B. 镜下肝细胞弥漫性大片坏死、消失, 仅残留网状支架, 库普弗细胞增生肥大, 吞噬活跃。

2.亚急性重型肝炎

- ①切面呈**黄绿色**（脂肪代谢-黄；纤维化致淤胆-绿）
- ②肝细胞**亚大块坏死、网状支架塌陷、肝细胞结节状再生、纤维化，可致肝硬化**

三、各型肝炎

（一）甲肝、戊肝

- ①主要通过消化道（粪口途径）传播
- ②**只引起急性肝炎（不发展为肝硬化）** **甲午急**，但免疫抑制患者感染 HEV 后可转为慢性肝炎、甚至演变为肝硬化
- ③**戊肝**合并妊娠易致**暴发型/急性重型**肝炎 **wu boom**

（二）乙肝（我国最多见）

1.HBV 是 DNA 病毒


（常见的 DNA 病毒：HBV、EBV、HPV、疱疹病毒、巨细胞病毒 **BBPP 巨**）

2.可引起急性肝炎、**慢性**肝炎（病程>6 个月、**可发展为肝硬化**）

3.乙肝的独特表现

（1）慢性乙肝的**毛玻璃样肝细胞乙-毛**

- ①肝细胞**胞质**充满嗜**酸**性细颗粒、使胞质不透明似毛玻璃样
- ②免疫检查 **HBsAg** 阳性，电镜见**滑/光面内质网增生** **surface**



（2）**砂粒样细胞核**——提示 HBV **复制活跃**：肝细胞核内充满大量 **HBcAg**（core）

（三）丙肝（欧美最多见）

1.最容易转为慢性肝炎、极易演变为肝硬化

（慢性肝炎的演变和预后主要取决于所感染的病毒类型）

2.慢性丙肝除了有慢性肝炎的典型病变以外、还有更多见的改变

①肝细胞**脂肪变性**

②门/汇管区形成**淋巴滤泡**

③**胆管损伤**（不是胆管增生，胆管增生是基本病理变化之一）

饼干泡面管饱、长胖、损伤

（四）丁肝

①HDV 必须依赖 HBV 才能复制

②可与 HBV 同时感染、或在 HBV 携带者中重叠感染

四、EB 病毒引起的肝炎

肝细胞点状坏死、门管区炎症，肝窦内淋巴细胞和单核细胞聚集，呈列兵样排列

真题解析·病毒性肝炎

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

2013N167 X 丙型肝炎除了一般病毒性肝炎的病理特点外，其相对特异的镜下特点还有

- A.汇管区淋巴滤泡形成
- B.肝细胞脂肪变性明显
- C.碎片样坏死
- D.凋亡小体

2014N44 A 以下肝细胞坏死中，属于凋亡的是

- A.嗜酸性坏死
- B.点状坏死
- C.碎片状坏死
- D.桥接坏死

2014N55 A 以下肝细胞病变中，与肝硬化形成最相关的是

- A.大块坏死
- B.桥接坏死
- C.灶状坏死
- D.碎片样坏死

2015N42 A 不会引起慢性肝炎的肝炎病毒是

- A.HAV
- B.HBV
- C.HCV
- D.HDV

2016N48 A 在以下病理变化中，属于急性普通型病毒性肝炎的是

- A.汇管区炎症并突破界板
- B.桥接坏死伴小叶结构破坏
- C.肝细胞广泛脂肪变性伴嗜酸性粒细胞浸润
- D.肝细胞广泛水肿伴点状坏死

2017N35 A 可引起肝细胞毛玻璃样变性的病原体是

- A.HAV
- B.HBV
- C.HCV
- D.HEV

2017N149 X 毛玻璃样肝细胞的特点有

- A.胞浆内含淀粉样物质
- B.胞浆内含 HBsAg(+)
- C.胞浆不透明似毛玻璃样
- D.胞浆内充满嗜酸性细颗粒物质

2018N36 A 肝细胞碎片样坏死的形态学改变是

- A.坏死肝细胞核碎裂
- B.肝小叶内肝细胞广泛的点状坏死
- C.坏死突破界板向肝小叶内扩散
- D.肝细胞坏死超过 1/3 造成小叶结构不完整

2019N152 X 能引起慢性肝炎的肝炎病毒有

- A.甲型肝炎病毒
- B.乙型肝炎病毒
- C.丙型肝炎病毒
- D.戊型肝炎病毒

2020N151 X 亚急性重型肝炎的病理特点有

- A.肝细胞亚大块坏死
- B.肝细胞再生结节形成
- C.残存肝细胞出现明显异型
- D.网状纤维支架塌陷



2021N32 A 急性重型肝炎中残留有少量肝细胞，其多见的部位在

- A.肝小叶周边
- B.中央静脉周围
- C.全小叶随机分布
- D.残留的网状支架旁

2023N150 X 属于肝细胞桥接坏死的有

- A.门管区-门管区连续的肝细胞坏死带
- B.门管区-小叶中央静脉连续的肝细胞坏死带
- C.肝细胞坏死占肝小叶的大部分
- D.小叶中央静脉-小叶中央静脉连续的肝细胞坏死带

2024N153 X 属于 RNA 病毒的肝炎病毒有

- A.HAV
- B.HBV
- C.HCV
- D.HEV

2025N36 A 慢性肝炎时，肝小叶周边部界板肝细胞可发生灶状坏死和崩解，使肝界板受到破坏，这种坏死的名称是

- A.点状坏死
- B.碎片状坏死
- C.桥接坏死
- D.亚大块坏死

思维导图·病毒性肝炎

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

