

核心精讲·消化道肿瘤

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解 and 记忆思维导图

一、食管癌

1. 好发于食管三个生理性狭窄部，以**胸中段**最多见

2. 早期食管癌

① 肿瘤累及黏膜层、黏膜下层，但**没有侵犯肌层**

无论有无淋巴结转移

（可有局部淋巴结转移，但无远处淋巴结转移、血道转移、种植性转移等）

② 早期食管癌包括：**原位癌**（未突破**基底膜**）、**黏膜内癌**（未突破黏膜肌层）、**黏膜下癌**（未突破黏膜下层）

天天师兄

3. 中晚期食管癌

（1）大体类型**阳伞**虽窄、胸中有水

① **髓质型**（最多见）

② **蕈伞/隆起型**

③ **溃疡型**：相对不易梗阻

④ **缩窄/硬化型**：环形狭窄致梗阻





图 11-11 食管癌大体类型
A. 溃疡型; B. 蕈伞型; C. 髓质型; D. 缩窄型。

(2) 组织学类型

①鳞癌最多见

②**腺癌**：多来自 **Barrett 食管**（食管下部的鳞状上皮被柱状上皮取代——**腺上皮化生**，多见于**胃食管反流病**，是食管腺癌的癌前病变，需**定期接受胃镜复查**）



二、胃癌

1.好发于胃窦小弯侧

2.危险因素

- ①异型/不典型增生（如胃溃疡伴异型增生）
- ②Hp 感染、亚硝胺、慢性萎缩性胃炎特别是伴结肠型不完全肠化（与肠型胃癌密切相关）、胃腺瘤性息肉

3.早期胃癌

- ①肿瘤累及黏膜层、黏膜下层，但**没有侵犯肌层**，**无论有无**淋巴结转移，包括原位癌、黏膜内癌、黏膜下癌
- ②类型：凹陷型/溃疡周边癌性糜烂（最多见）、隆起型、表浅型
- ③**早期胃癌的特殊类型**：微小癌（ $\leq 5\text{mm}$ 毫米）、小胃癌（ $6-10\text{mm}$ 毫米）、一点癌

4.中晚期胃癌

(1) 大体类型

- ①**溃疡型（最多见）**
- ②**息肉/蕈伞/结节蕈伞型**（这里就不要说隆起型了、因为隆起型是早期胃癌的类型之一）
- ③**浸润型**：局限性或弥漫性浸润，若为弥漫性浸润可致**革囊胃/皮革胃（预后最差）**




图 11-12 中晚期胃癌大体类型
A. 结节蕈伞型; B. 溃疡型; C. 革囊胃。




图 11-12 中晚期胃癌大体类型
A. 结节蕈伞型; B. 溃疡型; C. 革囊胃

(2) 组织学类型

①**腺癌最多见**。其中能分泌大量粘液的腺癌为**黏液腺癌/胶样癌**（肿瘤含>50%的黏液成分），肉眼可表现为**胶冻样外观**，但仍属于组织学类型。癌细胞分泌大量粘液至细胞外形成粘液湖；粘液潴留在细胞内为**印戒细胞癌（属于低黏附性癌）**

②少见类型：鳞癌（贲门部）、腺鳞癌、未分化癌（无腺管结构）、类癌（起源嗜银细胞）

5. 转移

①**最早、最常见：淋巴转移**。晚期易转移至**左**锁骨上淋巴结的 **Virchow**

注意：食管癌、胃癌晚期易转移至左锁骨上淋巴结，而肺癌易转移至右锁骨上淋巴结

②**血道转移**：晚期最常转移至**肝脏**

③特别是**胃的印戒细胞癌**常**种植性转移**至**双侧卵巢**，形成 **Krukenberg 瘤**






图 11-13 胃癌常见转移途径和部位示意图







图 11-13 胃癌转移示意图

6.胃癌溃疡型 VS 胃溃疡

	胃溃疡 ttsx 乖	胃癌溃疡型
外形	圆形或椭圆形	火山口或皿状
大小	多<2cm	多>2cm
深度	较深	较浅 (不是浅溃疡-more than)
边缘	整齐、不隆起	不整齐、隆起
底部	较平坦	凹凸不平, 坏死、出血明显
周围黏膜	黏膜皱襞呈放射状向溃疡集中	黏膜皱襞中断、结节状肥厚
龛影	位于胃腔轮廓之外	位于胃腔轮廓之内
胃酸	多正常或↓	明显↓(缺乏)



三、大肠癌

1. 肿瘤只有突破黏膜肌层**到达黏膜下层**才称为癌，否则称为**上皮内瘤变**

2. 好发于**直肠壶腹部**、其次在**乙状结肠**



图 11-14 家族性腺瘤性息肉病

3. 癌前病变


息肉病	①家族性/遗传性腺瘤性息肉病 FAP: 未经治疗 100% 癌变 ②增生性息肉 病 、幼年性息肉 病 ③ 色素沉着黑斑息肉综合征 Peutz-Jeghers ④ 肠息肉病合并多发性骨瘤和软组织瘤 Gardner ⑤胶质瘤息肉病综合征 Turcot 桃胶	
腺瘤	管状腺瘤最常见、 绒毛状腺瘤易癌变 惹毛了就癌变、混合型腺瘤、息肉状腺瘤	
其它	慢性 血吸虫病 、 溃疡性结肠炎 （克罗恩病也可）	

4. 中晚期大肠癌

（1）大体类型（**左亲右拢**溃疡多）

- ①**溃疡型**（**最多见**，因直肠癌以溃疡型最多见）
- ②**隆起/息肉/蕈伞型**（多分化较高）：**右侧**结肠癌隆起型多见，**腹部肿块和全身症状（低热/贫血/消瘦）**多见
- ③**浸润型**：**左侧**结肠癌浸润型多见，**肠梗阻（大便细）和便血**多见

注意：胶样型在 10 版教材 P219 已删除



（2）组织学类型：**腺癌（最多见）**、鳞癌（直肠肛门附近）

组织学类型中的黏液腺癌/胶样癌在大肠癌中预后最差（黏液胶样预后差）

5.转移：胃肠道癌晚期血道转移至肝可有牛眼征



6.与大肠癌密切相关的基因（尤其 *APC*、*KRAS*、*TP53*）

①原癌基因：*c-MYC*、*RAS*、*BRAF*

②抑癌基因：*p53*、*p16*、*APC*（遗传性腺瘤性息肉病）、*DCC*、*MCC*、*DPC*（墨督督 app）

③错配修复基因：*MLH* 和 *MSH*（遗传性非息肉病性大肠癌/Lynch 林奇综合征）

非错不可霉死了




图 11-15 结直肠黏膜上皮逐步癌变的分子生物学基础

7.Dukes 分期




图 11-16 结直肠癌 Dukes 分期示意图

A 期,肿瘤局限于黏膜层;B₁ 期,肿瘤未穿透肌层,无淋巴结转移;B₂ 期,肿瘤穿透肌层,但无淋巴结转移;C₁ 期,肿瘤未穿透肌层,但有淋巴结转移;C₂ 期,肿瘤穿透肌层,并有淋巴结转移;D 期,有远处转移。

A: 黏膜内癌, 无淋巴结转移 (100%)

B₁: 未穿透肌层, 无淋巴结转移 (67%)

B₂: 穿透肠壁, 无淋巴结转移 (54%)

C₁: 未穿透肌层, 有淋巴结转移 (43%)

C₂: 穿透肠壁, 有淋巴结转移 (22%)

D: 肝、肺、骨、皮肤的远处转移 (存活率极低)

真题解析·消化道肿瘤

习惯-读完所有选项; 意识-选择最佳答案; 巩固-复习核心考点

2014N165 X 中晚期食管癌的肉眼类型有

- A.胶样型
- B.髓质型
- C.溃疡型
- D.隆起型

2015N47 A 双侧卵巢肿大，活检发现癌细胞，首先应考虑癌细胞来源于

- A.胃
- B.肠
- C.卵巢
- D.子宫

2015N133-134 B

- A.溃疡型
- B.隆起型
- C.浸润型
- D.胶样型

组织学上表现为黏液癌的大肠癌类型是
较易引起肠梗阻的大肠癌类型是

2015N165 X 胃癌的肉眼类型有

- A.胶样型
- B.溃疡型
- C.浸润型
- D.蕈伞型

2018N153 X 下列选项中，符合早期胃癌描述的有

- A.肿瘤最大径小于 2cm
- B.肿瘤尚未侵及肌层
- C.可有局部淋巴结转移
- D.可有单个的肝转移灶

2019N33 A 关于早期胃癌的叙述中，不正确的是

- A.癌细胞不能侵犯粘膜下层
- B.可有胃周淋巴结转移
- C.大多数属于腺癌
- D.无远处转移

2020N152 X 下列病变中，属于胃癌晚期的有

- A.癌细胞浸润至黏膜下层
- B.癌细胞转移至双侧卵巢
- C.癌细胞转移至局部淋巴结



D.癌细胞转移至左锁骨上淋巴结

2021N34 A 胃癌的好发部位是

- A.胃窦
- B.胃后壁
- C.胃前壁
- D.胃底

2022N39 A Virchow 淋巴结穿刺标本中发现癌细胞，最可能的原发灶是

- A.大肠
- B.胃
- C.肝
- D.肺

2023N153 X 与大肠癌发生有关的病变有

- A.幼年性息肉病
- B.溃疡性结肠炎
- C.家族性腺瘤性息肉病
- D.绒毛状腺瘤

2024N38 A “革囊胃”所对应的胃癌大体类型是

- A.息肉型
- B.蕈伞型
- C.溃疡型
- D.弥漫浸润型

2025N37 A 下列胃癌类型中，属于低黏附性癌的是

- A.管状腺癌
- B.印戒细胞癌
- C.乳头状腺癌
- D.腺鳞癌

思维导图·消化道肿瘤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

