

核心精讲·风湿病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解记忆思维导图

一、风湿病是与 A 组 β (乙) 型溶血性链球菌感染有关的变态反应疾病

链球菌中的 M 蛋白抗原与人心瓣膜等组织存在交叉抗原性（交叉免疫反应）

二、风湿病的特征是 Aschoff 小体

1. 变质渗出期：黏液样变性、纤维素样坏死、浆液和纤维素渗出等

2. 增生期/肉芽肿期

①最有诊断意义：Aschoff 小体/风湿小体/风湿肉芽肿。Aschoff 小体由聚集在纤维素样坏死灶的成群风湿细胞、少量淋巴细胞（主要是 T 细胞）和浆细胞构成

②风湿细胞由增生的巨噬细胞吞噬纤维素样坏死物后转变而来

③风湿细胞体积大、核大、核膜清晰、染色质集中于中央、核周可见明显的亮晕，核的横切面似梟眼状 o 像眼、纵切面似毛毛虫状 像毛毛虫，有时可见多个核的 Aschoff 巨细胞




图 9-21 风湿性心肌炎

A. 低倍; B. 高倍。

3. 纤维化期/硬化期：风湿细胞转变为成纤维细胞→风湿小体机化形成梭形小瘢痕

三、风湿病可累及全身结缔组织的胶原纤维

（一）风湿性心脏病

1. 风湿性心内膜炎（最严重）

- ①**最常累及二尖瓣**，其次是二尖瓣（心房面）和主动脉瓣（心室面）同时受累
- ②瓣膜闭锁缘形成**疣状赘生物**，**不易脱落**，呈灰白色、单行串珠状排列，由**血小板**等构成（**白色血栓**）
- ③**病变反复发作可致慢性心瓣膜病**。由于病变所致瓣膜口狭窄或关闭不全，受 **ttsx** 血流反流冲击较重引起**心内膜灶状增厚（McCallum 斑）**，多见于**左心房后壁马后炮**






图 9-22 风湿性疣状心内膜炎
二尖瓣闭锁缘可见细小赘生物，有的呈溃疡改变。

2. 风湿性心肌炎

- ①病变主要累及心肌**间质**结缔组织（间质性心肌炎）
- ②Aschoff 小体常位于**心肌间质小血管旁**
- ③Aschoff 小体机化形成小瘢痕（心肌纤维化）
- ④累及传导系统可致传导阻滞



3. 风湿性心外膜炎/心包炎

- ①浆液渗出为主→心包积液；**纤维素渗出为主→绒毛心**
- ②渗出的大量**纤维素若不能被溶解吸收→缩窄性心包炎**




图 9-23 风湿性心外膜炎
心外膜表面有大量纤维蛋白渗出，呈绒毛状。




图 9-24 风湿性心外膜炎
渗出的纤维蛋白与心外膜紧密相连。

（二）风湿性关节炎

1. 病变呈游走性、反复发作

2. 对比

	风湿	类风湿
炎症类型	慢性 肉芽肿 （特殊增生性炎）	慢性 非特异增生 性炎
变态反应	II/细胞毒型 2个字	III/免疫复合物/血管炎型 3个字
主要侵犯	大 关节（膝、肩关节等）	小 关节（腕、掌指、近端指间关节等）
关节腔 主要渗出	浆液二大爷 （易被完全吸收）	纤维素 （不易被完全吸收）
关节畸形	不 （ 舔过关节咬住心脏 ）	常 （ 天鹅颈样、纽扣花样等畸形 ）

（三）皮肤病变（有诊断意义）

环形红斑	皮下结节
渗出 性病变（没有 Aschoff 小体）	增生性病变
	

（四）风湿性动脉炎

小动脉受累较常见，血管壁发生纤维素样坏死等

（五）风湿性脑病

① 脑的风湿性动脉炎和皮质下脑炎

② 累及锥体外系可引起**小舞蹈病**（肢体不自主运动）

真题解析·风湿病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

2013N133-134 B

- A.心内膜炎
- B.心肌内 Aschoff 小体
- C.心包内纤维蛋白性炎症
- D.关节病变

对风湿病最有诊断意义的病变是

对风湿病人造成最严重危害的病变是

2015N48 A 风湿小结内的 Aschoff 细胞来源于

- A.T 淋巴细胞
- B.B 淋巴细胞
- C.巨噬细胞
- D.成纤维细胞

2016N168 X 在风湿热病变中，可出现 Aschoff 小体的有

- A.风湿性心肌炎
- B.环状红斑
- C.皮下结节
- D.风湿性动脉炎

2018N34 A 以下关于风湿热的描述中，错误的是

- A.属于变态反应性疾病
- B.其发病与溶血性链球菌感染有关
- C.常可导致关节畸形
- D.心脏病变的后果对人体危害最为严重

2024N35 A 风湿性心肌炎病理特征性细胞的来源是

- A.中性粒细胞
- B.浆细胞
- C.巨噬细胞
- D.肥大细胞

思维导图·风湿病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

