

核心精讲·心肌疾病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解记忆思维导图

一、心肌病

(一) 分类



- ①**原发性/特发性**心肌病（原因不明）：**扩张型心肌病 DCM（最常见）、肥厚型心肌病 HCM、限制型心肌病 RCM、致心律失常性右室心肌病**
- ②**继发性/特异性**心肌病：**克山病**（地方性心肌病）、酒精性心肌病、围生期心肌病、药物性心肌病
- ③未分类心肌病

(二) 肥厚型心肌病是青年猝死最常见的原因

1. 常染色体显性遗传常显肥

2. 病理变化


- ①**心室明显非对称肥厚**（心房没有肥厚）：左心室和或右心室肥厚，**尤其室间隔肥厚，室间隔厚度大于左心室游离壁**（两者之比 >1.3 ）




- ②心室腔变小（左室显著），左心室充盈受阻和**舒张期顺应性下降**



图 9-28 肥厚型心肌病
室间隔非对称性肥厚，心室腔及左心室流出道狭窄。



- ③由于**收缩期二尖瓣**向前移动与室间隔左侧 ttsx 心内膜接触，可引起**二尖瓣增厚**、**主动脉瓣下心内膜增厚**（左室流出道狭窄/肥厚型梗阻型心肌病，不是主动脉瓣狭窄）



（三）扩张型心肌病

1. 免疫介导的心肌损害

2. 病理变化

- ①**左心室开始且显著扩张**，后期各心腔均可扩张（临床常有心界向两侧扩大）






图 9-27 扩张型心肌病
左心室明显扩张，肉柱和乳头肌变扁平。

- ②心室壁变**薄**、略厚或正常，心尖部室壁常呈钝圆形，**心内膜增厚**
- ③萎缩和肥大的心肌细胞交错排列，心肌细胞损伤（变性、坏死），**收缩**功能障碍，**室壁运动普遍/弥漫减弱**（VS 肥厚型心肌病心肌细胞弥漫性肥大）



（四）限制型心肌病

①**心内膜及心内膜下心肌纤维化**（纤维性增厚），以心尖部为重，**酷似缩窄性心包炎**

（缩心炎外套太紧、限心病内衣太紧）

②心室腔狭窄，心室充盈受限和舒张期容量减少

（五）致心律失常性右室心肌病（幼稚）

右心室心肌被**脂肪**组织或纤维脂肪组织进行性替代→**右**心室进行性扩大、难治性右心衰




图 9-29 致心律失常性右室心肌病
右心室局部被脂肪组织所替代。



（六）克山病（缺硒）

①两侧心腔扩大，心室壁变薄，以心尖部为重，心脏呈球形（类似扩心病）

②心肌严重变性（水肿、空泡变性、脂肪变性）、坏死、瘢痕形成

注意：上述心肌病均可有**房室瓣关闭不全**、心衰、栓塞（**附壁血栓**脱落）、猝死（肥厚型心肌病最常见）

二、心肌炎

（一）病毒性心肌炎

1.相关病毒：**柯萨奇 B 组（最常见）**、柯萨奇 A 组、埃可、腺、流感、风疹、巨细胞、肝炎病毒等

《内科学》：柯萨奇 B 组（最常见）、埃可、脊髓灰质炎、腺、流感、细小、冠状病毒等

2.病理变化（有实质性病变、间质性病变，以**间质性病变为主**）

①心肌细胞损伤、心肌纤维化

②心肌细胞间**淋巴细胞和单核细胞**浸润，将心肌分割呈条索状（心肌细胞变细）




图 9-32 心肌炎

心肌细胞间和间质可见大量的淋巴细胞、单核细胞浸润，多数心肌细胞变细，可见散在的肥大的心肌细胞。

（二）细菌性心肌炎

多发小脓肿（中性粒细胞浸润）

（三）特发性/孤立性/Fiedler 心肌炎

①弥漫性间质性心肌炎

②特发性巨细胞性心肌炎：肉芽肿形成

（四）免疫反应性心肌炎

偶见肉芽肿形成

（有肉芽肿形成的心肌炎：特发性巨细胞性心肌炎、免疫反应性心肌炎、风湿性心肌炎）

真题解析·心肌疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

2014N48 A 扩张型心肌病肉眼检查不包括的主要病理变化是

- A.心脏重量增加达 500-800g
- B.两侧心腔扩张
- C.二尖瓣、三尖瓣关闭不全
- D.心内膜增厚

2015N163 X 肥厚型心肌病其肉眼病理变化有

- A.左心室壁肥厚
- B.室间隔不均匀肥厚
- C.二尖瓣肥厚
- D.左心房壁肥厚

2023N152 X 可引起心肌坏死的病变有

- A.病毒性心肌炎
- B.主动脉粥样硬化
- C.肺动脉瓣狭窄
- D.扩张型心肌病

思维导图·心肌疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

