

核心精讲·肺硅沉着病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

职业病：即使脱离 SiO_2 环境后硅肺的肺部病变仍继续发展：

巨噬细胞吞噬 $\text{SiO}_2 \rightarrow \text{SiO}_2$ 与水形成硅酸 $\rightarrow$ 巨噬细胞崩解自溶 $\rightarrow$ 释放出 SiO_2

一、基本病变

1. 肺组织弥漫纤维化

天天师兄

2. 特征——硅结节

① $<5\mu\text{m}$ 的 SiO_2 (**1-2 μm 致病性最强** 12-i2) 进入肺泡、被**巨噬细胞**吞噬 $\rightarrow$ **细胞性结节** $\rightarrow$ **纤维性结节**

② 硅结节**最早**出现在**肺门淋巴结**先进门

③ 硅结节内胶原纤维呈同心圆/漩涡状排列、可伴玻璃样变性。玻璃样变性的硅结节含较多免疫球蛋白（提示硅肺与免疫因素有关 ttsx）

④ 硅结节可融合，中央可因坏死形成空洞




图 10-14 硅肺

图示纤维性硅结节，主要由玻璃样变的胶原纤维构成，呈漩涡状排列。

二、分期的主要特点

I	II	III
累及肺门淋巴结 (肺门淋巴结肿大)	结节性病变散布于双肺 胸膜增厚	肺门淋巴结 蛋壳样钙化 胸膜广泛增厚

三、并发症

①**肺结核（最常见）**

②肺部感染

③慢性肺心病

④阻塞性肺气肿

真题解析·肺硅沉着病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

2018N35 A 硅肺最早的病理变化出现在

- A.两肺上叶
- B.两肺下叶
- C.肺门淋巴结
- D.上、下肺叶交界的胸膜处

2022N40 A I 期肺硅沉着病的病变特点是

- A.病变主要在肺门淋巴结
- B.胸膜明显增厚
- C.结节性病变散在分布于双肺
- D.肺重量增加

思维导图·肺硅沉着病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

