

核心精讲·呼吸系统肿瘤

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解记忆思维导图

一、原发性支气管肺癌（肺癌）

（一）病因举例

- ①**吸烟**：最常见。吸烟与所有病理类型肺癌的危险性相关
- ②**空气污染**：肺癌发病率城市高于农村；厨房做饭油烟（对女性腺癌影响大）
- ③**结核**（主要为腺癌）

（二）病理变化

1.大体类型

- ①**中央型/肺门型（最常见）**
- ②**周围型：常侵犯胸膜**
- ③**弥漫型**：起源于末梢肺组织，易与转移癌混淆



图 10-20 肺癌(中央型)
近肺门部癌组织包绕管壁增厚的支气管。



图 10-21 肺癌(周围型)



2.组织学类型

（1）腺癌

- ①**女性肺癌最常见**，多为**非吸烟者**
- ②多为**周围型**
- ③**特殊腺癌**周边县城泡菜 nb

细支气管肺泡癌（原位腺癌）	多为弥漫型，呈肺炎样外观
黏液癌	可呈胶冻状
瘢痕癌	

(2) 鳞癌

①多为男性、吸烟者、**中央型**

②来源于支气管上皮**鳞化**，包括：

高分化/角化型	癌巢有 角化珠 、 细胞间桥 高龄华侨
低分化/非角化型	
基底细胞样型	癌细胞小、胞质少、栅栏状排列

(3) 神经内分泌癌 (APUD)

①包括：**小细胞癌**、**大细胞神经内分泌癌**、**类癌**（**类癌恶性度最低**类似癌）小大类

②起源于支气管黏膜上皮的**嗜银细胞**/Kulchitsky

③小细胞癌**人小鬼大还贪财**、**裸露菊花**

多为 男性 、 吸烟者 、 中央型
恶性度最高、分化最低、最早最易转移、对放化疗最敏感、预后最差
燕麦细胞 ： 癌细胞小、胞质少似 ttsx 裸核
可围绕小血管形成 假菊形团 结构
异位分泌抗利尿激素、ACTH、5-HT 等




图 10-23 肺小细胞癌(燕麦细胞癌)
癌细胞小,梭形,胞质少,似裸核,平行排列呈片状。

(4) 大细胞未分化癌

(5) 腺鳞癌：癌组织有腺癌和鳞癌（两种成分各占 10%以上、不管何种组织结构为主）

3. 转移

①晚期淋巴转移多见于：**右锁骨上淋巴结**

②肺癌血道转移多见于：**脑、肾上腺、骨**

(三) 隐性肺癌

①肺内无明显肿块、**无淋巴结转移**、影像学检查(-)

②痰细胞学检查癌细胞(+)

③手术切除标本经病理证实为支气管黏膜**原位癌或早期浸润癌**


（四）早期肺癌（无淋巴结转移）

①中央型：位于大支气管，癌组织仅限于管壁内生长（未侵犯肺实质）。包括腔内型和管壁浸润型

②周围型：在肺组织内呈结节状，直径<2cm

《病理学》10版教材 P190：中央型肺癌发生于主、叶支气管（教材定义错误×）

正确的定义为中央型肺癌发生于段及以上支气管（主、叶、段支气管，即大支气管）



二、鼻咽癌

1.与 EBV 密切相关

（与 EBV 密切相关的有：鼻咽癌的分化性鳞癌、霍奇金淋巴瘤的经典型、Burkitt 淋巴瘤、NK/T 细胞淋巴瘤）比伯穿 CK

2.鼻咽顶部最多见，大体类型以结节型最多见，组织学类型以分化性鳞癌最多见

①高分化/角化型：癌巢内细胞分层明显、角化珠、细胞间桥

②低分化/非角化型

3.放疗为主：恶性程度高的低分化鳞癌和泡状核细胞癌对放疗敏感低龄放炮

真题解析·呼吸系统肿瘤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

2015N51 A 细支气管肺泡癌属于以下哪种肿瘤类型

- A.腺癌
- B.小细胞癌
- C.大细胞癌
- D.鳞状细胞癌

2015N168 X 呼吸系统肿瘤中，由神经内分泌细胞发生的有

- A.支气管类癌
- B.小细胞癌
- C.鳞癌
- D.腺癌

2020N36 A 与 EB 病毒感染密切相关的肿瘤是

- A.鼻咽癌
- B.胃腺癌
- C.宫颈鳞癌
- D.肺鳞癌

2023N32 A 男性，62 岁。体检时发现右锁骨上淋巴结肿大，无压痛。淋巴结切除送检，病理诊断：淋巴结内可见腺癌浸润。肿瘤原发部位最可能是

- A.食管
- B.胃
- C.肝
- D.肺

2025N35 A 男性，70 岁。体检发现左肺门处直径约 3cm 大小的不规则肿物。支气管镜活检组织的病理学特点：肿瘤细胞呈片状、条索状排列，呈浸润性生长；肿瘤细胞体积小，胞质少，似裸核，异型性明显，核分裂象多。该肿瘤最可能的病理类型是

- A.浸润性腺癌
- B.鳞状细胞癌
- C.小细胞癌
- D.腺鳞癌

思维导图·呼吸系统肿瘤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

