

核心精讲·内分泌系统疾病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解 and 记忆思维导图

一、甲状腺癌

(一) 乳头状癌（最常见，好发于青少年女性）

- ①乳头中心**砂粒体**（**钙化小体**）多个乳头脱毛要杀菌
- ②**毛玻璃样核**（核染色质少）、**核沟**、**核重叠**、**核内假包涵体**
- ③多中心病灶，**局部淋巴结转移较早**、但**预后最好**（**局部淋巴结转移与预后无关**）
- ④TTF（甲状腺转录因子）、TG（甲状腺球蛋白）**(+)**




图 15-12 甲状腺乳头状癌
肿瘤呈囊状，囊内癌组织形成许多乳头状结构。




图 15-13 甲状腺乳头状癌
细胞核呈毛玻璃状，有核沟，伴砂粒体形成。

(二) 滤泡癌

- ①**早期易血道转移**。滤泡癌少见淋巴转移
- 记特殊**：绒癌、肝细胞癌 HCC、甲状腺滤泡癌、肺腺癌最早最常见为血道转移
- ②分化极好的滤泡癌很难与滤泡性腺瘤区别，需对肿瘤及包膜多处取材、观察是否有**包膜侵犯**和**血管侵犯（浸润）**、即依靠**生物学行为**鉴别
- ③TTF、TG**(+)**

(三) 未分化癌

- ①**间变**：恶性肿瘤由**未分化**细胞构成，**异型性显著**、**分化程度极低（去分化）**、**极高恶性**、**预后最差**
- ②早期易局部和远处转移
- ③类型：**小、梭形、巨、混合细胞型**小说剧情混乱
- ④TTF、TG 多**(-)**

(四) 髓样癌


①来源于甲状腺**滤泡旁/C 细胞**

②**淀粉样变性**水一点

③分泌**降钙素**致**低钙血症**

分泌 5-HT 等致**类癌综合征**（面部潮红、腹泻、多汗）

④TTF、**CT**（降钙素）、**Syn**（突触素）**(+)**，**TG(-)**



二、其它甲状腺疾病

1. 结节性甲状腺肿（结甲）

①甲状腺**不对称**、**结节状**肿大

②结节**大小不等**、常**无**完整包膜，切面常有**囊性变**、**出血**、坏死、钙化、瘢痕等继发性改变（**前世今生**），部分滤泡上皮增生、复旧或萎缩 **ttsx** 不一致




图 15-7 结节性甲状腺肿
甲状腺内有多发性结节，有的分界不清，无包膜。




图 15-8 弥漫性非毒性甲状腺肿(结节期)
可见纤维分割，形成结节。

2. 弥漫性毒性甲状腺肿（Graves 病）

①甲状腺双侧**弥漫性**肿大（对称）

②滤泡上皮增生呈**高柱状**，滤泡腔内**胶质稀薄**、滤泡周边胶质出现许多大小不一的上皮细胞的**吸收空泡**，间质**血管丰富**、**淋巴组织增生**，滤泡基底膜上有 **IgG** 沉着







图 15-10 弥漫性毒性甲状腺肿
滤泡腔内有上皮细胞的吸收空泡，间质淋巴组织增生。



3. 桥本 VS 亚甲炎

慢性淋巴细胞性/自身免疫性甲状腺炎/桥本	亚急性/肉芽肿性/巨细胞性甲状腺炎
免疫介导	病毒感染
甲状腺双侧弥漫性肿大（对称）	甲状腺不对称、结节状肿大
无痛	痛
质韧，与周围组织无粘连	常与周围组织粘连
广泛滤泡被破坏、萎缩	部分滤泡被破坏、胶质外溢，异物巨细胞类似结核结节肉芽肿（但无干酪样坏死）
伴大量淋巴细胞和不等量的嗜酸性粒细胞浸润，淋巴滤泡	伴多量中性粒细胞和不等量的嗜酸性粒细胞、淋巴细胞、浆细胞浸润，微小脓肿
	

4. 结甲和甲状腺腺瘤均可有囊性变、出血等继发性改变：

tsx	结节性甲状腺肿	甲状腺腺瘤
结节数量	常多发、常累及双侧	常单发、常累及单侧
结节包膜	不完整	完整
滤泡大小	不一致	较一致
邻近甲状腺组织	无受挤压	受挤压



图 15-11 甲状腺腺瘤
腺瘤呈卵圆形，包膜完整，分界清楚。

小结：

	机制	甲状腺肿大	甲功
单纯性/弥漫性 非毒性甲状腺肿	缺碘致内分泌 病理性增生	早期：双侧弥漫性肿大（对称） 后期：少数变为结甲（不对称）	
弥漫性毒性甲状腺肿 （Graves 病）	免疫介导	双侧弥漫性肿大（对称） 常伴突眼	甲亢
慢性淋巴细胞性/自身免 疫性甲状腺炎/桥本	免疫介导	双侧弥漫性肿大（对称）	甲减
亚急性/肉芽肿性/巨细 胞性甲状腺炎	病毒感染	不对称肿大、压痛	可致甲减

三、胰岛疾病

1.糖尿病

①可有**玻璃样变性**

②1型：与免疫相关、 β 细胞数目↓、淋巴细胞浸润、可伴**纤维素样坏死**

③2型：**淀粉样变性**（**两点一线**）、后期 β 细胞数目↓

2.胰岛细胞瘤

①好发部位：尾>体>头（**五体投地**）

②功能性瘤包括胰岛素瘤、高血糖素瘤、生长抑素瘤、VIP瘤、PP瘤、胃泌素瘤

小结：与**APUD**细胞（**嗜银**细胞/**神经内分泌**细胞）有关的肿瘤有：**小细胞肺癌、大细胞神经内分泌癌、类癌、甲状腺髓样癌、胰岛细胞瘤、嗜铬细胞瘤**等（**小大两类水一个**）

真题解析·内分泌系统疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

2013N56 A 一例甲状腺肿瘤，呈浸润性生长，镜下可见癌细胞呈滤泡状排列，细胞核呈毛玻璃状，核重叠，核沟明显。应诊断为

- A.乳头状癌
- B.滤泡状癌
- C.髓样癌
- D.未分化癌

2016N56 A 诊断甲状腺滤泡癌最有价值的病理变化是

- A.肿瘤呈浸润性生长
- B.肿瘤分化差，形态类似胚胎期甲状腺组织
- C.肿瘤细胞高度异型
- D.肿瘤细胞核为毛玻璃样

2018N124-125 B

- A.乳头状癌
- B.滤泡状癌
- C.髓样癌
- D.肉瘤样癌

主要根据细胞核形态诊断的甲状腺癌是

主要根据细胞生物学行为诊断的甲状腺癌是


2019N38 A 甲状腺最常见的恶性肿瘤是

- A.滤泡癌
- B.未分化癌
- C.髓样癌
- D.乳头状癌

2020N40 A 甲状腺肿块活检，镜下见肿瘤细胞呈滤泡状生长，细胞核呈典型毛玻璃样改变，核重叠、有核沟。该肿瘤应诊断为

- A.滤泡癌
- B.髓样癌
- C.乳头状癌
- D.小滤泡型腺瘤

以题带动
知识点复习



2021N40 A 间质内常有淀粉样物质沉着的甲状腺肿瘤是

- A.未分化癌
- B.髓样癌
- C.乳头状癌
- D.滤泡癌

2021N151 X 甲状腺乳头状癌的特征包括

- A.肿瘤细胞核内可见假包涵体
- B.患者预后与局部淋巴结转移有关
- C.肿瘤间质内常见淀粉样物质沉积
- D.肿瘤细胞核呈毛玻璃状

2022N38 A 甲状腺滤泡癌区别于腺瘤的要点是

- A.腺泡结构异型
- B.细胞异型
- C.包膜侵犯
- D.肿瘤切面出血

2023N37 A 可伴有低钙血症表现的甲状腺癌是

- A.乳头状癌
- B.滤泡癌
- C.髓样癌
- D.未分化癌

2024N152 X 弥漫性毒性甲状腺肿的病理改变有

- A.滤泡上皮细胞增生呈高柱状

- B.滤泡周边的胶质中有大量吸收空泡
- C.间质中有大量淋巴细胞浸润
- D.增生的细胞胞核呈毛玻璃样改变

2025N153 X 结节性甲状腺肿的病理学特点有

- A.甲状腺呈不对称结节状肿大，结节大小不等
- B.结节边界比较清楚，常有完整包膜
- C.切面常见出血、坏死、囊性变
- D.部分滤泡上皮增生，部分滤泡上皮复旧或萎缩

思维导图·内分泌系统疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

