

核心精讲·乳腺疾病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解 and 记忆思维导图




图 14-21 乳腺解剖结构和各部位主要病变

一、乳腺导管增生

- ①**普通型导管**增生：增生细胞呈**流水样分布**（水-普通）
- ②**异型/非典型导管**增生：增生细胞分布**均匀**、**单一**形态

二、乳腺癌（女性最常见恶性肿瘤）

1. 危险因素

- ①**雌激素**暴露时间延长，如月经**早**、绝经**晚**、**晚育不育**、**肥胖**、乳腺增生性病变（其中**导管上皮非典型/异型增生为癌前病变**）
- ②遗传，如抑癌基因乳腺癌易感基因（Breast Cancer Susceptibility Genes,**BRCA**）缺陷（安吉丽娜朱莉就是因为这个切除了乳腺）

小结：与雌激素过高相关的有子宫内膜增生症、子宫内膜腺癌、子宫平滑肌瘤、乳腺导管增生、乳腺癌

2. 乳腺癌**缺失肌上皮细胞**（与乳腺硬化性腺病鉴别）**复习：**前列腺癌缺失基底细胞（鸡）

3. 好发于**外上**象限

4.分类

(1) 非浸润癌

①**导管原位癌/导管内癌**：其中高级别者核分裂象常见、粉刺样坏死（**粉刺癌**）

②小叶原位癌：核分裂象**罕见**、癌变间期**长**、多累及**双侧**乳房多个象限

（小这个字中间长、两边有点）ttsx




图 14-25 高级别导管原位癌
导管内癌细胞排列紧密，大小不一，胞质丰富、嗜酸，中央有大片坏死。

(2) 浸润癌

①浸润癌**非特殊型**：以前称为**浸润性导管癌（最常见）**：巢状等结构、边界不清、间质纤维组织多

②浸润性小叶癌：由小叶原位癌穿透基膜向间质浸润所致。癌细胞大小一致、核分裂象少见，呈**单行串珠状/列兵样/细条索状排列、或环形排列在正常导管周围（牛眼样/靶环）**。常转移至脑脊液、浆膜表面、卵巢、子宫、骨髓（**小孩站一排、围成圈、泡水里玩**）

③浸润癌**特殊型**：

预后较好的类型 (比浸润癌非特殊型预后好) 软软的小实性 乳头分泌黏液	小管癌/高分化腺癌：大量腺体形成 大量淋巴细胞浸润的髓样癌：巢状等结构、边界清楚、癌细胞大、间质少（大清软软的） 黏液腺癌 分泌性癌 实性乳头状癌 
预后较差的类型	炎性乳癌（预后最差）、 浸润性微乳头状癌、富于脂质性癌、高级别化生性癌

5.临床

①**橘皮样变（皮肤水肿）**：阻塞真皮内**淋巴管**

复习：由于淋巴回流受阻导致的组织水肿有丹毒象皮肿、乳腺癌橘皮样变、丝虫病**橡皮虫**

②**酒窝征（皮肤凹陷）**：侵犯 Cooper/乳房悬**韧带**

③**淋巴转移**最早和最常见（首先至**同侧腋窝**淋巴结）；也易经**椎旁静脉**转移至**骨**、肺、肝、肾上腺、脑

小结：易经椎旁静脉发生骨转移的有乳腺癌、前列腺癌、甲状腺癌、肾癌（**甲乳省钱**）

④**雌激素受体 ER+**预后**较好**，可**内分泌**治疗；**HER2+**预后**较差**，可**靶向**治疗



真题解析·乳腺疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

2013N168 X 以下属于乳腺髓样癌形态特点的有

- A.边界清楚
- B.癌细胞体积大
- C.有较多的淋巴细胞浸润
- D.HER2/neu 过度表达

2014N47 A 女性，58 岁。左乳腺外上象限肿物，直径 2.0cm。组织学检查：肿瘤细胞小，在纤维组织中排列成单排细胞，浸润周围脂肪组织。该患者的诊断是

- A.浸润性小叶癌
- B.浸润性导管癌
- C.导管内癌
- D.小叶原位癌

2014N56 A 以下乳腺癌的病理学类型中，属于原位癌的是

- A.粉刺癌
- B.黏液癌
- C.小管癌
- D.髓样癌

2015N56 A 以下乳腺癌的病理学类型中，恶性度较低的是

- A.浸润性小叶癌
- B.髓样癌
- C.小管癌
- D.浸润性导管癌

2018N39 A 乳腺浸润癌与乳腺硬化性腺病形态相似，鉴别两者最主要的依据是

- A.浸润癌核分裂象多见
- B.浸润癌腺体异型明显
- C.浸润癌增生活跃
- D.浸润癌腺腔周围无肌上皮细胞

思维导图·乳腺疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

