

核心精讲·结核

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解记忆思维导图

一、结核是传染病、是炎症

1. 传染病

- ①传染源：肺结核患者（主要是空洞性肺结核）
- ②传播途径：呼吸道飞沫（最常见）、消化道、皮肤伤口等
- ③易感人群：所有人尤其是免疫力低下者

2. 炎症基本病理变化：变质、渗出、增生

二、结核杆菌不同于普通细菌


结核杆菌不产生毒素，其致病性/毒性依靠菌体细胞壁成分（脂类等）：

- ①多糖→血清反应等免疫应答
- ②蜡质→干酪样坏死、空洞
- ③蛋白质→皮肤红斑和结核菌素试验 PPD 阳性

三、结核的病理特征是慢性干酪性肉芽肿（结核结节）


（1）构成结核结节的细胞（凌晨累死）

- ①**上皮样细胞/类上皮细胞**（吞噬结核杆菌的**单核-巨噬细胞**）
- ②**朗汉斯/Langhans 巨细胞**
- ③**大量淋巴细胞**
- ④少量反应性增生的**成纤维细胞**



（2）典型结核结节中央伴**干酪样坏死**

- ①坏死灶干燥、淡黄、细腻、质地较实（含脂质多）
- ②干酪样坏死是**彻底的凝固性坏死**，镜下为**无结构嗜酸性红染颗粒物**



四、肺结核最常见

(一) 原发性肺结核

(1) 概念：机体初次感染结核杆菌，无特异免疫力（之后在病程中出现）

(2) 好发：儿童

(3) 基本病理特征——**原发复合征**（X线呈**哑铃影**）

①肺内原发灶（**起始部位**）：**上叶下部、下叶上部近胸膜处**的炎性灶

②结核性**淋巴管炎**

③肺门淋巴结结核：**肺门淋巴结肿大**。多为**单侧**肿大、常伴干酪样坏死

(4) 主要经**淋巴道或血道**播散（**TB 嚣张**）





图 18-4 肺结核原发复合征模式图
右侧肺上叶下部胸膜下见黄白色原发病灶,肺门部见肿大的淋巴结,二者之间以淋巴管炎相连。



（二）继发性肺结核

1.概念：机体再次感染结核杆菌（**内源复发**为主），有免疫力

2.好发：成人，尤其是抵抗力低下者

3.病变特征

①**好发部位：上叶尖后段、下叶背段和后基底段**（勾肩搭背 hou 基友）

②病变常从右**肺尖**开始，自上而下主要经**支气管**播散→病变**上重下轻、上旧下新**

③病变 **tsx** 多局限于肺内

④**常伴空洞**

4.若合并 AIDS

①好发于**下叶**

②趋于原发性肺结核：常有肺门、纵隔淋巴结肿大，空洞少见

③病变常累及多个部位：胸膜/心包渗出、粟粒影多见

④**肉芽肿少见**

⑤PPD 常呈**阴**性或弱阳性

5.继发性肺结核的类型

（1）**局灶型**肺结核（**非**活动性）

①好发于**肺尖**，境界清楚的结节（以增生为主）

②提示结核杆菌数量少+机体免疫力强→多无症状

（2）**浸润型**肺结核（**最常见的活动性**继发性肺结核）

①好发于**肺尖和锁骨下**，境界不清/边缘模糊、密度不均的**云雾状/云絮状影**（以渗出为主），可有薄壁空洞

②提示结核杆菌数量多+机体免疫力弱→多有咳嗽、**低热**、盗汗等症状


(3) 干酪性肺炎 (病情**危重**)

虫蚀样空洞，可有大叶性实变



(4) 慢性纤维空洞型肺结核 (传染性强的**开放**性肺结核)

①好发于**上叶**的**厚壁**空洞。ttsx 洞壁分三层：**内层** (干酪样坏死物+大量结核杆菌)、中层 (肉芽组织)、外层 (纤维结缔组织)



②同侧或对侧肺组织可见由**支气管**播散引起的很多病灶，它们大小不等、上旧下新

③肺组织严重破坏、**广泛纤维化**、肺体积缩小变形、**肺门抬高**、肺纹理呈**垂柳样**

④可并发**慢性肺心病**

(5) 结核球/结核瘤

①孤立的境界清楚 (纤维包裹) 的干酪样坏死灶


②结核球来自：浸润型肺结核的干酪样坏死灶纤维包裹；结核空洞引流的支气管阻塞→空洞由干酪样坏死物填充；多个结核病灶融合



(6) 结核性胸膜炎 (可致胸膜增厚粘连)

①湿性多见: 浆液纤维蛋白性渗出性炎 (胸腔积液)

②干性: 增生性



五、肺结核血源播散所致病变

原发性和继发性肺结核通过血道播散引起粟粒性结核、肺外结核

(原发性肺结核绝大部分愈合、但却可致糟糕的粟粒性结核)




图 18-7 肺结核的发展过程示意图






图 18-2 结核分枝杆菌引起的正常免疫反应和超敏反应

1. 急性全身粟粒性结核: 结核杆菌在短时间内一次或反复多次大量侵入肺静脉分支→经左心至体循环、播散到全身各器官 (肺、肝、脾、脑膜等处)

2. 慢性全身粟粒性结核

3. 急性粟粒性肺结核 (属于血源播散性肺结核): 双肺弥漫的粟粒影 (2mm), 其分布、大小、密度均匀 (三均匀)



4. 慢性粟粒性肺结核

5.肺外结核



抓规律：肺外结核多继发于肺结核（肠结核、骨结核、肾结核 90%均继发于肺结核）

记特殊：结核性腹膜炎多继发于腹腔内结核灶（肠结核、肠系膜淋巴结结核、输卵管结核）直接蔓延；其它泌尿系结核、男生殖系结核多继发于肾结核



（1）肠结核

①多继发于空洞性肺结核（经口感染-反复咽下含有结核杆菌的痰液）

②好发于**回盲部**

③溃疡型多见：肠黏膜**淋巴管呈环形走向**→**环形溃疡**（溃疡长轴与肠长轴**垂直**）

→**易致肠梗阻**

（2）结核性腹膜炎：**揉面感/柔韧感**

（3）结核性脑膜炎：儿童多见，脑底病变最明显

（4）女性生殖系统结核：以 **tsx 输卵管** 结核最常见

（5）淋巴结结核：以**颈部**淋巴结最常见

（6）肾结核：**慢性膀胱刺激征、肾自截**






图 18-8 肾结核
肾实质内多数干酪样坏死灶及空洞形成。



（7）骨与关节结核：**腰椎**结核最常见，**椎体破坏、椎间隙变窄、冷/寒性脓肿**



真题解析·结核

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

2013N54 A 肠结核溃疡的形态特征取决于

- A.肠粘膜的皱襞形态
- B.肠粘膜淋巴小结的形态
- C.肠粘膜淋巴管的走向
- D.肠粘膜血管的走向

2014N166 X 继发性肺结核的病理特点有

- A.常循血道播散
- B.常循淋巴道播散
- C.常循气道播散
- D.病灶多由肺尖部开始

2015N55 A 原发性肺结核的好发部位是

- A.肺上叶下部、下叶上部
- B.肺锁骨下区
- C.肺下叶
- D.肺尖部

2015N135-136 B

- A.局灶性肺结核
- B.浸润性肺结核
- C.干酪性肺炎
- D.慢性纤维空洞性肺结核

非活动性肺结核是
病情危重的肺结核是

2017N32 A 尸检病理见脏层胸膜内多发、粟粒大小、一致性硬结节，应首先考虑

- A.小叶性肺炎
- B.肝癌肺转移
- C.血源性播散性结核
- D.栓塞性肺脓肿

2017N36 A 以下选项中，容易导致肠腔狭窄的是

- A.阿米巴肠病
- B.伤寒
- C.痢疾
- D.肠结核



以题带动
知识点复习

2019N35 A 下列病变中属于原发性肺结核病的是

- A.结核球
- B.干酪性肺炎
- C.浸润型肺结核
- D.肺门淋巴结结核

2021N126-127 B

- A.局灶型肺结核
- B.浸润型肺结核
- C.干酪性肺炎
- D.慢性纤维空洞型肺结核

最常见的肺结核类型是

病情危重，中毒症状明显的肺结核类型是

2022N152 X 典型的结核结节病变中包括

- A.干酪样坏死
- B.朗汉斯巨细胞
- C.上皮样细胞
- D.淋巴细胞

2023N38 A 累及骨旁软组织形成“冷脓肿”的疾病是

- A.骨肉瘤
- B.骨结核
- C.骨髓瘤
- D.骨髓炎

2025N30 A 肺结核结节的上皮样细胞起源的细胞是

- A.鳞状上皮细胞
- B.肺泡上皮细胞
- C.淋巴细胞
- D.巨噬细胞

思维导图·结核

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



微信搜一搜

天天师兄