


核心精讲·其它传染病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解记忆思维导图

一、中枢神经系统感染性疾病

	流行性脑脊髓膜炎	流行性乙型脑炎
致病微生物	脑膜炎双球菌	乙脑病毒
传播	冬春季多见，经飞沫呼吸道传播	夏秋季多见，蚊子是重要媒介
炎症类型	软脑膜、软脊膜的化脓性炎 流脑流脓	中枢神经系统的变质性炎变异 (大脑皮质、基底核、视丘等)
病理变化	蛛网膜下腔大量脓性渗出物（中性粒细胞为主）、血管扩张充血 注意：急性暴发性流脑脑膜炎较轻，主要为广泛出血和循环衰竭  颅骨 硬脑膜 蛛网膜 蛛网膜下腔 软脑膜 脑组织	①筛状软化灶（特征） ②血管周围 ttx 淋巴细胞套 ③星形胶质细胞增生及胶质纤维瘢痕 ④小胶质细胞增生及结节形成 ⑤噬神经细胞现象（小胶质细胞小吃），小胶质细胞吞噬神经组织崩解产物后、胞质出现大量脂质、HE 染色空泡状，称为格子细胞或泡沫细胞 ⑥卫星现象（少突胶质细胞突围） ttx 变质大鸡屎、筛状软化灶、血管淋巴套、星巴小姐姐、噬神经卫星
其它	脑膜刺激征、脑神经麻痹更严重	颅内高压更严重





图 16-14 流行性乙型脑炎淋巴细胞套
以淋巴细胞为主的渗出环绕脑组织血管周围呈袖套状外观。




图 16-6 卫星现象
退变的神经元周围见多个少突胶质细胞围绕。




图 16-15 流行性乙型脑炎噬神经细胞现象和小胶质细胞结节
左上角箭头(▼)示噬神经细胞现象，右下角箭头(→)示小胶质细胞结节。




图 16-16 筛状软化灶
脑组织内见淡染的类圆形境界清楚的镂空筛网状病灶，病灶内为液化性坏死的神经组织碎屑和吞噬细胞。

二、伤寒

- ①全身**单核-巨噬细胞系统增生**：**肝、脾、骨髓、淋巴结**等，以**回肠末端**集合、孤立淋巴小结多见**全身冷**
- ②**特征为伤寒小结（急性肉芽肿）**：伤寒细胞（吞噬红细胞/伤寒杆菌/细胞碎片的**巨噬细胞**）聚集
- ③肠道溃疡期：累及**淋巴小结**→**圆形/椭圆形**溃疡（溃疡长轴与肠长轴**平行**→**不引起肠梗阻**）**小姐玛丽**。可并发肠出血（最常见）、肠穿孔（最严重）
- ④**蜡样**变性：横纹肌发生**凝固性坏死**，常累及膈肌、腹直肌、股内收肌**蜡烛-凝固**
- ⑤脾大、玫瑰疹、中性粒细胞多↓、肥达反应(+)



图 18-10 伤寒髓样肿胀期



图 18-11 细菌性痢疾
结肠黏膜有多处表浅“地图状”溃疡。

三、细菌性痢疾

- ①以**直肠和乙状结肠**多见，粘液脓血便、里急后重
- ②**假膜性炎（黏膜的纤维素性炎）**
- ③急性：表**浅**不规则**地图状**溃疡→多不引起肠梗阻、肠穿孔
- ④**中毒性痢疾**：2-7岁多见（特异体质），全身重而**肠道轻**
（**卡他性炎**-此为黏膜的**浆液性炎、滤泡性炎**）




图 18-16 结肠急性阿米巴痢疾的“烧瓶状溃疡”模式图
溃疡深达黏膜下层，口小底大呈烧瓶状，溃疡口周围的黏膜悬置于溃疡面上。

小结：

ttsx	肠结核	肠伤寒	急性细菌性痢疾	肠阿米巴
炎症	慢性肉芽肿	急性肉芽肿	假膜性炎	变质性炎
好发	回盲部	回肠末端	直肠和乙状结肠	盲肠和升结肠
溃疡	长轴 垂直 肠长轴 (肠黏膜 淋巴管 环形走向)	长轴 平行 肠长轴 (淋巴小结 圆形 /椭圆形)	表 浅 不规则 地图状	口小底大的烧瓶状 溃疡周围找滋养体 烧瓶装果酱
肠梗阻	会（最常见）	不	多不	会

注意：

	肠伤寒	急性肠菌痢	消化性溃疡	胃癌
出血	√	√	√	√
穿孔	√	多×	√	√
梗阻	×	多×	√	√

四、血吸虫病


(1) 传播条件：带虫卵粪便入水、中间宿主钉螺孳生、人皮肤接触含尾蚴疫水

(2) 童虫：引起血管及其周围炎，肺损害最明显 **同学度**

(3) **虫卵**引起的损害最主要最严重 (**肉芽肿**)

主要沉着于直肠、乙状结肠、肝

IV型变态反应



①急性虫卵结节 **着急喝酸汤、cao、之后流眼泪**

放射状火焰样嗜 酸 性棒状物	Hoepli
嗜酸性脓肿	大量嗜 酸 性粒细胞
Charcot-Leyden 结晶	嗜酸性粒细胞崩解产物
虫卵周围的肉芽组织含大量嗜 酸 性粒细胞	抓规律记特殊
晚期出现 ttsx 类上皮细胞	

②**慢性虫卵结节/假结核结节**：**类上皮细胞为主，少量异物巨细胞、淋巴细胞、成纤维细胞**

凌晨累异

注意：慢性虫卵结节与结核结节的共同点是**常钙化 (学姐钙化)**、大量类上皮细胞/上皮样细胞；而它们的不同点是**慢性虫卵结节没有干酪样坏死、淋巴细胞少、含异物巨细胞、毛蚴已死亡**

五、性传播疾病

(性传播是主要但非唯一途径)

(一) 梅毒

1.基本病变：闭塞性动脉内膜炎、小血管周围炎、肉芽肿（特征）周围塞车肿么办

2.分期

(1) 一期：硬下疳会阴周围摸了就传染



(2) 二期（传染性最大）：梅毒疹随便摸哪都容易传染

(3) 三期（传染性最小）鞍鼻痴呆不想摸了

①主动脉炎、主闭、主动脉瘤（破裂致猝死）、麻痹性痴呆、脊髓痨、马鞍鼻

主主主延毕咯 mlb

②树胶样肿/梅毒瘤（肉芽肿）：浆细胞和淋巴细胞多见尤其浆细胞恒定出现（乌梅子酱），而类上皮细胞和朗汉斯巨细胞少见，绝少钙化，伴凝固性坏死（可见原有血管壁轮廓）

注意：朗汉斯巨细胞、异物巨细胞属于多核巨细胞姐妹们 VS 异甲虫

①结核、梅毒、麻风所致肉芽肿的多核巨细胞为朗汉斯巨细胞

②异物（手术缝线/石棉）、慢性虫卵结节、亚甲炎所致肉芽肿的多核巨细胞为异物巨细胞

(二) 尖锐湿疣

①HPV-6、11 型等

与 HPV 密切相关的有尖锐湿疣、宫颈癌、喉癌

②挖空/凹空细胞

③好发于潮湿温暖的粘膜和皮肤交界处如外生殖器、肛门




图 18-14 尖锐湿疣
左上为挖空细胞,左下为 HPV 外壳蛋白免疫组织化学染色阳性。

(三) 淋病（最常见的性病）

急性化脓性炎，主要累及泌尿、生殖系统

真题解析·其它传染病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

2013N55 A 在血吸虫病中，给病人造成最大危害的因素是

- A.虫卵
- B.童虫
- C.成虫
- D.尾蚴

2014N137-138 B

- A.硬性下疳
- B.树胶样肿
- C.梅毒疹
- D.脊髓痨

属于I期梅毒的病变是

属于II期梅毒的病变是

2015N166 X 以下选项中，属于梅毒的病变有

- A.硬性下疳
- B.梅毒疹
- C.脊髓痨
- D.黏液性水肿

2016N55 A 发生梅毒性增生性动脉内膜炎时，血管周围浸润的特征性炎细胞是

- A.T 淋巴细胞
- B.中性粒细胞
- C.巨噬细胞
- D.浆细胞

2018N126-127 B

- A.巨噬细胞
- B.淋巴细胞
- C.浆细胞
- D.多核巨细胞

构成伤寒肉芽肿的主要是

构成梅毒肉芽肿的主要是

2020N39 A 急性血吸虫病由虫卵引起的早期基本病理变化是

- A.嗜酸性脓肿
- B.假结核结节
- C.钙化虫卵

D.肝纤维化

2022N35 A 中毒性细菌性痢疾的肠道病理变化特点是

- A.假膜性肠炎
- B.滤泡性肠炎
- C.溃疡性肠炎
- D.出血性肠炎

2024N150 X 以肉芽肿为基本病变的疾病有

- A.结核病
- B.伤寒
- C.阿米巴病
- D.细菌性痢疾


专题串联·常考溃疡

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

ttsx	好发部位	溃疡特点
肠结核 ⊥	回盲部	环/横形溃疡，其长轴与肠长轴垂直 (与肠粘膜淋巴管走向一样)
肠伤寒 	回肠末端	圆形/椭圆形溃疡，其长轴与肠长轴平行 (与肠粘膜淋巴小结形态一样)
细菌性痢疾	直肠和乙状结肠	表浅不规则地图状溃疡
阿米巴	盲肠和升结肠	口小底大的烧瓶状溃疡
溃疡性结肠炎	直肠和乙状结肠	连续性浅溃疡
克罗恩病	回肠末端及邻近结肠	早期鹅口疮样 后期节段性纵行裂隙状深溃疡
消化性溃疡	十二指肠球部前壁 胃窦小弯侧	圆形/椭圆形的深溃疡(镜下分4层) 黏膜皱襞放射状向溃疡集中
胃癌溃疡型	胃窦小弯侧	火山口状、凹凸不平、黏膜皱襞中断
胃泌素瘤	十二指肠球部	不典型部位 (十二指肠降部和水平部、空肠近段、食管远段)出现多发溃疡
应激性溃疡	胃底胃体	应激→GC↑→促进胃酸、胃蛋白酶原↑

注意：好发于直肠和乙状结肠的有细菌性痢疾、血吸虫、溃疡性结肠炎、大肠癌

吸血鬼哎



思维导图·其它传染病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



微信搜一搜

天天师兄