สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
งานวัคซีน กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

จังหวัดอุบลราชธานี

แนวทางการให้บริการวัคซีน PCV
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมค็อกคัส

กลุ่มเป้าหมาย

- เด็กที่เกิดตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2569 รับวัคซีนตามเกณฑ์ปกติ
- เด็กที่เกิดตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ที่มารับล่าช้า ให้บริการตามแนวทาง

กำหนดการให้วัคซีน (2p+1)

เข็มที่ 1	เข็มที่ 2	เข็มกระตุ้น
2 เดือน	→ 4 เดือน	→ 12 เดือน

แนวทางการบริการสำคัญ

1. ให้บริการครบถ้วนตามมาตรฐาน ฉีดคนละตำแหน่ง หากใกล้กันให้ห่าง ≥ 1 นิ้ว
2. ผู้ฉีดเป็นพยาบาลวิชาชีพ หรือผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข และปฏิบัติตามหลัก 6R
3. สังเกตอาการหลังฉีดอย่างน้อย 30 นาที และเฝ้าระวัง AEFI
4. บันทึกข้อมูลในแฟ้ม EPI (รหัส P21, P22, P24) และรายงานผ่าน MOPH Claim

การจัดเก็บวัคซีน

- เก็บที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 °C
- ห้ามแช่แข็ง
- ขวดที่เปิดแล้ว ใช้ให้หมดภายใน 8 ชั่วโมง



ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

- แจ้งสิทธิการรับวัคซีน และติดตามเด็กที่พลาดนัด
- ให้ข้อมูลประโยชน์และอาการที่อาจเกิดขึ้น

ร่วมสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้เด็กไทยแข็งแรง
ปลอดภัยในอนาคต



บริการด้วยใจ ห่วงใยสุขภาพเด็กไทย