ตั้งค่ารหัส วัคซีน PCV ใน JHCIS

ทำครั้งเดียวต่อหน่วยบริการ ก่อนบันทึกการให้บริการ เพื่อส่งออก 43 แฟ้ม ได้ถูกต้อง

1–2 เข้าสู่ระบบ แล้วเลือกเมนูหลัก

ใช้บัญชี adm → การปรับแต่งระบบ และรหัสข้อมูล




3 เปิดรหัสยา

กล่อง รหัสข้อมูล → รหัสยา-เวชภัณฑ์



4 เปิดใช้วัคซีน PCV

ติ๊ก วัคซีนทั้งหมด ตั้ง P21–P24 เป็น 1:มีใช้ รหัสส่งออก 43 แฟ้ม ต้องตรงกัน



ตรวจหลังตั้งค่า: หน้าบันทึกวัคซีน ต้องเห็น พีซีวี 1–4 ให้เลือก

รหัสที่ต้องเปิดใช้

P21	PCV1 เข็มที่ 1	2 เดือน
P22	PCV2 เข็มที่ 2	4 เดือน
P24	PCV4 เข็มกระตุ้น	12 เดือน
P23	PCV3 เฉพาะเข็มที่ 3 จากเอกชน	6 เดือน


คู่มือเจ้าหน้าที่ · โปรแกรม JHCIS

บันทึกและรหัส วัคซีน PCV ใน JHCIS

บันทึกทุกครั้งที่ให้บริการ ด้วยรหัสที่ถูกต้อง

บันทึกเมื่อให้บริการ

ตัวอย่าง: บันทึก P22 (PCV2) พร้อมวัคซีนตามวัย ในนัดเดียวกัน



- การให้บริการ (OP/PP Service)
- แท็บ โภชนาการ & วัคซีน
- ส่วน EPI เลือกรหัส PCV ระบุ Lot No. วันหมดอายุ สถานบริการ
- กด SAVE ตรวจว่ารายการขึ้นในตาราง

แนวทาง PCV 2570
สแกนเพื่อเปิด แนวทางฉบับเต็ม

รหัสวัคซีน PCV

ตารางของรัฐ 2p+1 ใช้ P21 · P22 · P24

P21	PCV1 เข็มที่ 1	2 เดือน
P22	PCV2 เข็มที่ 2	4 เดือน
P24	PCV4 เข็มกระตุ้น	12 เดือน
P23	PCV3 เฉพาะเข็มที่ 3 จากเอกชน	6 เดือน

รหัสอ้างอิงอื่น

ICD-10	TMT	รหัส 24 หลัก
Z23.8	1370838	210070190028664310181178

การเก็บรักษา

วัคซีนเชื้อตาย เก็บ +2 ถึง +8 °C ชั้นเดียวกับ DTP ห้ามแช่แข็ง

อาการหลังฉีด

พบบ่อย: ไข้ ≥ 38 °C ปวด บวม แดง งอแง ง่วงซึม เบื่ออาหาร
พบไม่บ่อย: ร้องไห้ผิดปกติ ท้องเสีย อาเจียน ผื่น ชักจากไข้สูง ลมพิษ → **รายงาน AEFI**

✔ **ตรวจก่อนกด SAVE:** รหัสตรงกับเข็มตามอายุ Lot No. และวันหมดอายุ ตรงกับขวดที่ใช้จริง

งานวัคซีน กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.อุบลราชธานี