สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี



นายประพนธ์ บุญไชย
หัวหน้ากลุ่มงาน
ควบคุมโรคติดต่อ



นายแพทย์วรุตม์ เกตุสิริ
รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี




นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง
นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี

ชวนพาลูกรับวัคซีน PCV
เด็กอายุ 2–23 เดือน ฟรี ใกล้บ้าน

**“ ครบ ตรงเวลา ไม่ตกหล่น
ปกป้องลูกรัก จากปอดอักเสบ ”**

ประชาสัมพันธ์ งานวัคซีน

เริ่มให้บริการ 2 พฤศจิกายน 2569



วัคซีน PCV ป้องกัน โรคติดเชื้อนิวโมค็อกคัส ชนิดรุนแรง ได้แก่ **ปอดอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ** และ **การติดเชื้อในกระแสเลือด** ซึ่งอันตรายมาก ในเด็กเล็ก ปัจจุบัน บรรจุในแผนงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เด็กไทยรับได้ **ฟรีตามสิทธิ** ที่หน่วยบริการของรัฐ ใกล้บ้าน

ใครรับได้ และฉีดเมื่อไร

กลุ่มที่ 1 ตามตารางมาตรฐาน
เด็กที่เกิด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2569

2 เดือน	เข็มที่ 1
4 เดือน	เข็มที่ 2
12 เดือน	เข็มกระตุ้น

✔ ฉีดพร้อมวัคซีนตามวัย ในนัดเดิม ไม่ต้องแยกนัด

กลุ่มที่ 2 กลุ่มรอยต่อ (มารับล่าช้า)
เด็กที่เกิด 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569

เริ่มก่อน 12 เดือน	2 เข็ม ห่าง ≥ 4 สัปดาห์ + เข็มกระตุ้น
เริ่ม 12–23 เดือน	2 เข็ม ห่าง ≥ 8 สัปดาห์ ไม่ต้องกระตุ้น

✔ เคยฉีดแล้ว นับเข็มต่อได้ ไม่ต้องเริ่มใหม่ ฉีดให้ครบ ก่อนอายุครบ 2 ปี

ผู้ปกครอง ควรรู้


- นำสมุดบันทึก สุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู) มาด้วยทุกครั้ง
- ฉีดพร้อมวัคซีนอื่น ในวันเดียวกัน ปลอดภัย ไม่ลดภูมิคุ้มกัน
- นั่งสังเกตอาการ 30 นาที หลังฉีด
- อาจมีไข้ ปวด บวม แดง หายเองใน 2–3 วัน
- ซึม ชัก หรือหายใจลำบาก รีบพบแพทย์ทันที

เจ้าหน้าที่ ให้บริการตามแนวทาง

- ค้นหาเด็กทั้ง 2 กลุ่ม จากทะเบียน แล้วนัดเข้ารับวัคซีน
- ให้ข้อมูลผู้ปกครอง อย่างเพียงพอ ก่อนฉีดทุกราย
- PCV 0.5 มล. เข้ากล้ามเนื้อต้นขา ห่างวัคซีนอื่น ≥ 1 นิ้ว
- สังเกตอาการ 30 นาที เฝ้าระวัง และรายงาน AEFI
- บันทึกรหัส P21 P22 P24 ให้ครบ ตรงกับเข็มที่ฉีด

พาลูกมารับวัคซีน PCV ที่ รพ.สต. หรือโรงพยาบาลของรัฐ ใกล้บ้าน

สอบถามวันนัด ได้ที่หน่วยบริการ ใกล้บ้านท่าน ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วย ร่วมค้นหา และติดตามเด็ก ให้ได้รับวัคซีนครบ ตามแนวทางที่กำหนด



แนวทาง PCV

อ้างอิง: คำแนะนำการให้วัคซีน PCV กรมควบคุมโรค ต.ค. 2569 · ประกาศ สปสช.

งานวัคซีน กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.อุบลราชธานี