

第3回 確率論の基礎(2)

ベイズの定理 — データで信念を更新する

統計学II 2026後期 北星学園大学
小野原 彩香

今日のゴール

1. **ベイズの定理** : $P(H \mid D) = \frac{P(D \mid H)P(H)}{P(D)}$
2. 事前・尤度・事後の役割
3. **基準率の誤謬** と **陽性的中率**
4. 逐次更新（今日の事後＝明日の事前）＝学習

前回の答案から 冒頭で確認する3つ

第2回の結果

学生17名提出 / 記述は13名が満点

減点4名と小テストの誤答に、**共通する型が3つ**

どれも今日のベイズの定理に直接ひびく

① 分母をどこに取るか（小テスト A1）

学生100人：アルバイト30人、一人暮らし20人、両方12人

答え	何の確率か	計算
0.12	$P(A \cap B)$ – 100人のうち両方	12/100
0.60	$P(A \mid B)$ – 一人暮らし20人のうち	12/20
0.40	$P(B \mid A)$ – アルバイト30人のうち	12/30

同じ12人を、3つの違う分母で割っている

今日やるのは、この分母の取り替え

ベイズの定理

$$P(H \mid D) = \frac{P(D \mid H) P(H)}{P(D)}$$

分母を $P(D)$ に取り替えることで
向きが逆になる

② 条件の名前で、求めた確率を呼ぶ

× 「少なくとも1人は女」という確率は $1/3$

字義どおりなら $P(\text{少なくとも1人は女}) = 1/3$
だが実際は $3/4$

○ 「少なくとも1人は女」という条件のもとで
「2人とも女」である確率が $1/3$

今日いちばん危ない言い間違い

今日の検査の例でいえば

× 「陽性の確率は50%」

○ 「陽性という条件のもとで、病気である確率が50%」

陽性になる確率そのものは 約2%

③ 記号の書き方・事象の立て方

書かれていたこと	直し方
$P(A/B)$ と書いた	$P(A \mid B)$ 。縦棒は割り算ではない
$A =$ 「授業をとっている人 (100人)」	$A \cdot B$ は 出来事 。人の集まりではない
「それぞれ1/4」を書かなかった	4通りが 等確率だからこそ 1/3 になる
「従属だから因果がある」	従属は確率が変わるだけ。 原因は問わない

今日につながること

主題は $P(\text{病気} \mid \text{陽性})$ と $P(\text{陽性} \mid \text{病気})$ の取り違い

①の「分母をどこに取るか」

②の「条件の名前で呼んでしまう」

どちらもこの取り違いと同じ構造

直感クイズ

検査が陽性、あなたは病気か？

クイズ

検査の性能：

- 感度 $P(\text{陽性} \mid \text{病気}) = 99\%$
- 特異度 $P(\text{陰性} \mid \text{健康}) = 99\%$

病気は **100人に1人**（有病率1%）。あなたは **陽性**。

本当に病気の確率は？

「99%の精度だから99%」？

答え：99%ではなく 約50%

(有病率1%のもとでの値)

100万人を検査すると...

	人数	うち陽性
病気 (1%)	10,000	9,900 真陽性
健康 (99%)	990,000	9,900 偽陽性

$$P(\text{病気} \mid \text{陽性}) = \frac{9900}{19800} = 50\%$$

病気が稀 → 偽陽性が真陽性と同じだけ出る

最重要：条件付き確率の「向き」

直感は取り違える：

$$P(\text{陽性} \mid \text{病気}) = 99\% \neq P(\text{病気} \mid \text{陽性}) = 50\%$$

第2回の「 $P(A \mid B)$ と $P(B \mid A)$ は一般には等しいとは限らない」そのもの
検査の精度 と 陽性的中率 は別の数字

ベイズの定理

$$\underbrace{P(H \mid D)}_{\text{事後}} = \frac{\overbrace{P(D \mid H)}^{\text{尤度}} \overbrace{P(H)}^{\text{事前}}}{P(D)}$$

要素	検査の例
事前 $P(H)$	有病率 1%
尤度 $P(D \mid H)$	感度 99%
事後 $P(H \mid D)$	陽性的中率 50%

データで信念を更新する計算

基準率を動かすと激変する

有病率	陽性的中率
0.1%	9.0%
1%	50.0%
10%	91.7%
50%	99.0%

検査の性能は同じ。 珍しい病気ほど的中率は低い

→ **基準率の誤謬** (base rate fallacy)

迷惑メール判定・顔認証・不正検知...全部同じ罫

逐次更新 = 学習

今日の事後を、明日の事前として使う

- 真の $p = 0.7$ のコインを投げ続ける
- 事前 $\text{Beta}(1, 1) \rightarrow$ 観測 $\rightarrow$ 事後 $\text{Beta}(1 + k, 1 + n - k)$

回数が増えるほど、信念は **0.7 の周りに締まる**
= データを積めば正しい方へ更新される

独立性との関わり

ベイズ更新が健全に働くには — **独立で多様な情報** が要る

第12～13回：みんなが互いを真似て**同じ情報**ばかり見ると、
集団の信念が**間違った方向に固まる**（情報カスケード）

ここでも独立性が効いてくる

今日の課題

陽性的中率の計算（自動採点）

＋「なぜ基準率を無視する／ベイズ更新とは」（記述）

次回：二項分布・ポアソン分布

「10回投げて7回表。イカサマ？」独立試行 n 回の分布