

作业三

敖旭扬

PB18071477

2021 年 1 月 5 日

第一题 解：

(a) 由 Gauss 顺序消元法的步骤和过程，第一次迭代后 A 的第一列完成消去时，有

$$a_{ij}^{(1)} = a_{ij} - \frac{a_{i1}}{a_{11}}a_{1j}, \quad i, j = 2, 3, \dots, n \quad (1)$$

由于 A 是对称矩阵且满足 $a_{11} \neq 0$ ，所以有

$$a_{ij} = a_{ji}, \quad i, j = 1, 2, 3, \dots, n \quad (2)$$

所以

$$a_{ij}^{(1)} = a_{ij} - \frac{a_{i1}}{a_{11}}a_{1j} = a_{ji} - \frac{a_{1i}}{a_{11}}a_{j1} = a_{ji} - \frac{a_{j1}}{a_{11}}a_{1i} = a_{ji}^{(1)}, \quad i, j = 2, 3, \dots, n \quad (3)$$

从而 $A^{(1)}$ 是对称的。

(b) 计算一个正定 (positive definite) 矩阵 LU 分解的算法如下：

```

1  %% 正定矩阵(Positive Definite Matrix)LU分解算法
2  function [L, U] = LU_PDM(A)
3      [~, n] = size(A);
4      L = zeros(n, n);
5      U = zeros(n, n);
6      for i = 1:n
7          for j = i + 1:n
8              for k = j:n
9                  A(j, k) = A(j, k) - A(i, k)*A(j, i)/A(i, i);
10                 A(k, j) = A(j, k);
11             end
12         end
13         for k = i:n
14             U(i, k) = A(i, k);
15             L(k, i) = A(i, k) / U(i, i);
16         end
17     end
18 end
    
```

(c) 使用 Cholesky 分解解方程组 $Ax = b$ 的 MATLAB 程序显示如下:

```
1 clear,clc,clf
2 A = [4,-2,4,2; -2,10,-2,-7; 4,-2,8,4; 2,-7,4,7];
3 b = [8; 2; 16; 6];
4 x = deEquations(A,b)
5 %% 运行的输出结果
6 % x =
7 %
8 %      1
9 %      2
10 %      1
11 %      2
12
13 %% 用Cholesky分解解方程组Ax=b
14 function [X]=deEquations(A,b)
15 N=length(A);
16 L=cholesky(A);
17 Lt=L';
18 X=zeros(N, 1);
19 Y=zeros(N, 1);
20 for j=1:N
21     Y(j)=(b(j)-L(j,1:j-1)*Y(1:j-1))/L(j,j);
22 end
23 for k=N:-1:1
24     X(k)=(Y(k)-Lt(k,k+1:N)*X(k+1:N))/Lt(k,k);
25 end
26 end
27
28 function [L]=cholesky(A)
29 N=length(A);
30 for i=1:N
31     A(i,i)=sqrt(A(i,i)-A(i,1:i-1)*A(i,1:i-1)');
32     if A(i,i)==0
33         ME=MException('Zero Element', 'A(%d,%d) = 0',i,i);
34         throw(ME);
```

```

35     end
36     for j=i+1:N
37         A(j,i)=(A(j,i)-A(j,1:i-1)*A(i,1:i-1)')/A(i,i);
38     end
39 end
40 L = tril(A); %取下三角部分
41 end

```

根据上述程序在命令行输出的结果（以注释形式写在了上面的代码中），原题所求的解为：

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

第二题 解：

(a) 证明：

Richardson 迭代方法的迭代关系式为：

$$x^{(k+1)} = \omega I \left(\frac{1}{\omega} I - A \right) x^{(k)} + \omega I b = (I - \omega A) x^{(k)} + \omega b \quad (4)$$

令

$$G_{\omega} = I - \omega A \quad (5)$$

则

$$x^{(k+1)} = G_{\omega} x^{(k)} + \omega b \quad (6)$$

根据课本第五章开头处对迭代法收敛性的讨论可知，上述 Richardson 迭代方法收敛的充要条件为谱半径 $\rho(G_{\omega}) < 1$ ，又 A 是正定矩阵，所以它的特征值均为正数，由已知， G_{ω} 的特征值为 $1 - \omega \lambda_i$ ，其中 $0 < \lambda_1 \leq \lambda_i \leq \lambda_n$ ，则

$$\rho(G_{\omega}) = \max |1 - \omega \lambda_i| < 1 \quad (7)$$

则对任意 λ_i ，需要满足

$$0 < \omega \lambda_i < 2 \quad (8)$$

即

$$\omega < 2/\lambda_n \quad (9)$$

(b) 由 (a) 得,

$$\rho(G_\omega) = \max |1 - \omega \lambda_i| = \max(1 - \omega \lambda_1, \omega \lambda_n - 1) \quad (10)$$

应该使得收敛速度尽量快, 所以 $\rho(G_\omega)$ 应该尽量小, 即取

$$\rho(G_\omega) = \min_{\omega} \max(1 - \omega \lambda_1, \omega \lambda_n - 1) \quad (11)$$

所以 ω 的最佳值为

$$\omega_b = \arg \min_{\omega} \max(1 - \omega \lambda_1, \omega \lambda_n - 1) = \frac{2}{\lambda_1 + \lambda_n} \quad (12)$$

且

$$\rho(G_\omega) = \begin{cases} 1 - \omega \lambda_1 & \omega \leq \omega_b \\ \frac{\lambda_n - \lambda_1}{\lambda_n + \lambda_1} & \omega = \omega_b \\ \omega \lambda_n - 1 & \omega \geq \omega_b \end{cases} \quad (13)$$

(c) 使用 Richardson 迭代方法解 $Ax = b$ 的 MATLAB 程序显示如下:

```
1 clear, clc, clf
2 %% 构造A和b
3 D = orth(rand(5, 5));
4 B = diag([1, 2, 3, 4, 5]);
5 A = D \ B * D;
6 b = rand(5, 1);
7 xexact = A \ b; % x精确解
8
9 %% 使用多个omega迭代求解
10 lambda1 = 1;
11 lambdan = 5;
12 omegab=2/(lambda1+lambdan);
13 eponch=1001;
14 omegalist = linspace(0.001, 0.399, eponch);
15 count=zeros(eponch,1)';
16 for i = 1:eponch
17     count(i)=Richardson(A,b,xexact,omegalist(i));
18 end
19
20 %% 输出结果
```

```

21 [mink,idx]=min(count);
22 omegalist(idx);
23 fp=fopen('p2c_out.txt','w');
24 fprintf (fp,'bestomega = %f\tk=%d\n',omegalist(idx),mink);
25 fprintf (fp,'omegab = %f\tk=%d\n',omegab,richardson(A,b,
    xexact,omegab));
26 semilogy(omegalist, count, 'k.-');
27 xlabel('\omega');
28 ylabel('迭代次数');
29
30 %% 返回Richardson迭代方法的迭代次数
31 function [k]=Richardson(A,b,xexact,omega)
32     G = eye(5) - omega * A;
33     x = zeros(5, 1);
34     k = 0;
35     while norm(x - xexact) > 1e-13
36         x = G * x + omega * b;
37         k = k + 1;
38     end
39 end

```

上述程序某一次执行输出的结果为：

```

bestomega = 0.333330    k=70
omegab = 0.333333    k=70

```

同时输出的收敛迭代次数随 ω 变化的 semilogy 图为：




图 1: 寻找 Richardson 迭代方法的最佳 ω

这一结果验证了最佳 ω 是 ω_b , 它使得收敛速度最快。

第三题 解:

(a) $I(f) = \int_a^b f(x)dx$ 关于积分节点 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 的 Gauß 积分的数值积分公式为

$$I_n(f) = \sum_{i=1}^n \alpha_i f(x_i) \quad (14)$$

$n = 6$ 时, 代数精度不超过 $2n - 1 = 11$, 所以依次取线性不相关的 $f(x) = 1, x, x^2, \dots, x^{11}$, 即 $f(x) = x^k$, $k = 0, 1, \dots, 11$, 根据

$$I_n(f) = I(f) \quad (15)$$

取 $a = -1, b = 1$ 得

$$\sum_{i=1}^n \alpha_{ki} x_i^k = \int_{-1}^1 x^k dx = \frac{1 - (-1)^{k+1}}{k+1}, \quad k = 0, 1, \dots, 11 \quad (16)$$

(b) 截断。

(c) 由 (a)

(d) 一阶