

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Кафедра теории вероятностей и математической статистики

Павлов Александр Сергеевич

Анализ и прогнозирование гидрологических данных

Дипломная работа

Научный руководитель:

Цеховая Татьяна

Вячеславовна

доцент кафедры ТВиМС

канд. физ.-мат. наук

Допущена к защите

«___» _____ 2015 г.

Минск, 2015

АННОТАЦИЯ

В курсовом проекте исследована одна из важнейших характеристик любого водоёма — температура воды. проведёны корреляционный и регрессионный анализы, проанализирован ряд остатков, построены модели вариограмм и на их основе вычислены прогнозные значения временного ряда наблюдений с 1975 по 2012 гг. для озера Баторино.

АННАТАЦЫЯ

У курсавым праекце даследавана адна з найважнейшых характарыстык любога вадаёма — тэмпература вады. Вылічаны апісальныя статыстыкі, прааналізаваны закон размеркавання, праведзены карэляцыйны і рэгрэсійны аналіз, прааналізаваны шэраг рэшткаў, пабудаваны мадэлі варыаграм і на іх аснове вылічаны прагнозныя значэнні часовага шэрагу назіранняў з 1975 па 2012 гг. для возера Баторына.

ANNOTATION

One of the most important characteristics of any pond — the water temperature — was investigated in the course project. Descriptive statistics were calculated, the distribution was analysed, the correlation and regression analyses were conducted, variogram models and based on them prediction values of time series of observations from 1975 to 2012 for Lake Batorino were computed.

Реферат

Дипломная работа 35 страниц, 3 главы, 11 рисунков, 7 таблиц, 29 источников, 4 приложения

ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ, R, ОПИСАТЕЛЬНЫЕ СТАТИСТИКИ, КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ, РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ, АНАЛИЗ ОСТАТКОВ, ВАРИОГРАММА, КРИГИНГ.

Объектом исследования являются наблюдения температуры воды в озере Баторино в период с 1975 по 2012 гг.

Цель работы — анализ, обработка и прогнозирование в современном пакете прикладных программ для статистического анализа R.

В процессе работы проведён сравнительный анализ современных пакетов статистического анализа. При помощи пакета R вычислены и проанализированы описательные статистики, произведена подборка закона распределения, проведёны корреляционный и регрессионный анализы, проанализирован ряд остатков, построены модели вариограмм и на их основе вычислены прогнозные значения.

Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего исследований в различных прикладных областях науки: биологии, химии, гидрологии, — а также, для анализа экологической ситуации в Нарочанском парке и других регионах.

Данная работа может быть продолжена для получения модели, более точно описывающей поведение исходного временного ряда. Полученные в процесса работы алгоритмы исследования могут быть использованы для анализа других аналогичных данных.

Abstract

Diploma thesis, 35 pages, 3 chapters, 11 figures, 7 tables, 29 sources, 4 appendixes.

TIME SERIES, R, DISCRIPTIONAL STATISTICS, CORRELATIONAL ANALYSIS, REGRESSION ANALYSIS, RESIDUAL ANALYSIS, VARIOGRAMM, KRIGING.

Object of research is water temperature observations of Batorino lake in period from 1975 till 2012.

Research purpose — analysis, processing and forecasting in modern software package for statistical analysis — R.

During the research was performed comparative analysis of modern packages for statistical research. With help of R package were computed and analysed descriptional statistics, was performed distribution analysis and fitting, were conducted correlational and regression analysis, was performed analysis of residual time series, variogram models and based on them prediction values were computed.

Results of this research could be used for further researches in various applied areas of science: biology, chemistry, hydrology, — and also for analysis of ecology situation at the Narochansky park and other regions.

This research could be continued in case of getting model that will be more accurate in describing source time series. Algorithms that were obtained during the research could be used for analysis other similar data.

Содержание

Введение	5
1 Случайный процесс и его характеристики	7
1.1 Случайный процесс. Стационарность	7
1.2 Вариограмма и внутренне стационарный случайный процесс	8
2 Оценка вариограммы внутренне стационарного гауссовского случайного процесса и ее свойства	9
2.1 Первые два момента оценки вариограммы	9
2.2 Асимптотическое поведение оценки вариограммы	11
3 Анализ временного ряда в пакете R	17
3.1 Детерминированный подход	17
3.1.1 Описательные статистики и первичный анализ данных	17
3.1.2 Корреляционный анализ	22
3.1.3 Регрессионный анализ	23
3.1.4 Анализ остатков	25
3.2 Геостатистический подход	27
3.2.1 Вариограммный анализ. Кригинг.	27
Заключение	33
Приложение А	Исходные данные
	34
Приложение В	Графические материалы
	35
Приложение С	Результаты вычислений
	40
Приложение D	Код программ
	41

Введение

Работа посвящена обработке, исследованию и статистическому анализу реальных временных рядов. В современных условиях выбор этой направленности соответствует необходимости в проведении анализа наблюдений, полученных в течение длительного времени, с математической и, в частности, статистической точки зрения. Часто наличие даже большого количества информации, полученной в процессе каких-либо наблюдений, не всегда позволяет раскрыть те или иные причины и следствия, имеющие место в конкретном случае. Для выявления всех скрытых проблем и свойств объекта, за которым проводилось наблюдение, необходимо провести всесторонний анализ полученной информации. В свою очередь, математический аппарат и его конкретные прикладные части могут позволить не только проанализировать сложившуюся ситуацию, но и постараться дать некоторый прогноз по состоянию объекта в будущем.

В качестве материала для исследования в данной работе используется база данных с реальными наблюдениями, зафиксированными на озёрах, входящих в Нарочанский национальный парк, за период с 1955 по 2012 годы, полученная от учебно-научного центра «Нарочанская биологическая станция им. Г.Г.Винберга». В представленной базе присутствуют данные, полученные в ходе наблюдений за озёрами Баторино, Нарочь и Мястро. Из них для исследования было выбрано озеро Баторино. Данное озеро является уникальным природным объектом, изучение которого позволит решать экологические проблемы не только в региональном, но и глобальном масштабе. Оно располагается у самой границы города Мядель и, вместе с вышеназванными Нарочью и Мястро, а также озерами Белое и Бледное, входит в состав Нарочанской озёрной группы.

В данной работе исследуемым показателем озера Баторино было выбрано значение температуры воды. Температура воды принадлежит к числу наиболее важных и фундаментальных характеристик любого водоёма. Её изменение во времени является одним из главных факторов, отражающих изменения в окружающей среде. Также нужно отметить, что свойства воды непосредственно зависят от температуры, что делает исследование температуры воды еще более актуальной задачей. Данная характеристика оказывает сильное влияние на плотность воды, растворимость в ней газов, минеральных и органических веществ, в том числе кислорода. Растворимость кислорода и насыщенность воды этим газом — одни из важнейших характеристик для условий обитания в воде живых организмов. В частности, от температуры воды в значительной мере зависит жизнедеятельность рыб: их распределение в водоёме, питание, размножение. К тому же, температура тела рыб, как правило, не превышает температуры окружающей их воды. В то же время, любой водоём как экосистема является средой обитания различных, отличных от рыб, организмов. И поэтому отслеживание всех изменений и влияние этих изменений на их жизнь является крайне важным не только в экологическом смысле, но и в биологическом. Как следствие вышесказанного, изменение температуры с течением времени следует считать одним из важнейших индикаторов изменений, происходящих в экосистеме озера. А исследование данного показателя, в свою очередь, является важнейшим в исследовании различных проблем, возникающих в экосистемах водоёмов. В подтверждение актуальности исследования данной темы можно привести научные работы [?, ?, ?, ?, ?], имеющие аналогичное направление.

Среди представленных следует отметить работу [?], где в качестве объекта исследования рассматривается крупнейшее в мире озеро — Байкал, подробно изучается изменение климата в контексте данного озера в период с 1950 по 2012 гг.

В работе [?] исследуется температура воды Великих озёр в Северной Америке, а также исследуется влияние, оказываемое изменением температуры на рыб, обитающих в этих озёрах.

В [?] исследуется влияние гидрологических, метеорологических и топологических параметров на изменение температуры воды в озере Цибунту (Индонезия) на основе данных с 2008 по 2009 год.

В работе [?] анализируется временной ряд температуры поверхности воды и потоки тепла водоема Итумбиара (Бразилия) в целях улучшения понимания изменений как следствие находящейся там гидроэлектростанции.

В последней упомянутой работе [?] автор исследует на предмет выявления антропогенного влияния на качество воды в крупнейшем озере в Гондурасе — Йоджоа.

В настоящее время, в условиях глобального потепления и крайне нестабильной климатической ситуации, наблюдения за состоянием озёрных экосистем представляют особую ценность как с научной, так и с практической стороны, поскольку только на основе таких наблюдений возможно выделить последствия антропогенного воздействия на фоне изменения природных факторов. А также получить некоторые заключения по экологической обстановке в определенной области.

Основным инструментом анализа данных в работе является пакет **R**. Такой выбор был обусловлен тем, что

- **R** является специализированным языком программирования для статистической обработки данных
- На сегодняшний день **R** — один из самых популярных в статистической среде инструментов анализа данных, имеющий широкую пользовательскую аудиторию, развитую систему поддержки
- Пакет постоянно развивается и дополняется современнейшими средствами, моделями и алгоритмами
- Бесплатен, свободно распространяется и доступен для всех популярных операционных систем
- Обладает развитыми возможностями для работы с графикой

Глава 1

Случайный процесс и его характеристики

1.1 Случайный процесс. Стационарность

Для введения следующих понятий воспользуемся [?, ?].

Пусть (Ω, \mathcal{F}, P) — вероятностное пространство, где Ω является произвольным множеством элементарных событий, \mathcal{F} — сигма-алгеброй подмножеств Ω , и P — вероятностной мерой.

Определение 1.1. Действительным случайным процессом $X(t) = X(\omega, t)$ называется семейство действительных случайных величин, заданных на вероятностном пространстве (Ω, \mathcal{F}, P) , где $\omega \in \Omega, t \in \mathbb{T}$, где \mathbb{T} — некоторое параметрическое множество.

При $\omega = \omega_0, t \in \mathbb{T}$ $X(\omega_0, t)$ является неслучайной функцией временного аргумента и называется *траекторией случайного процесса*.

При $t = t_0, \omega \in \Omega, X(\omega, t_0)$ является случайной величиной и называется *отсчетом случайного процесса*.

Определение 1.2. Если $\mathbb{T} = \mathbb{R} = (-\infty; +\infty)$, или $\mathbb{T} \subset \mathbb{R}$, то $X(t), t \in \mathbb{T}$ называют *случайным процессом с непрерывным временем*.

Определение 1.3. Если $\mathbb{T} = \mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$, или $\mathbb{T} \subset \mathbb{Z}$, то говорят, что $X(t), t \in \mathbb{T}$, — *случайный процесс с дискретным временем*.

Определение 1.4. n -мерной функцией распределения случайного процесса $X(t), t \in \mathbb{T}$, называется функция вида

$$F_n(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) = P\{X(t_1) < x_1, \dots, X(t_n) < x_n\},$$

где $x_j \in \mathbb{R}, t_j \in \mathbb{T}, j = \overline{1, n}$.

Определение 1.5. Математическим ожиданием случайного процесса $X(t), t \in \mathbb{T}$, называется функция вида

$$m(t) = E\{X(t)\} = \int_{\mathbb{R}} x dF_1(x; t), t \in \mathbb{T}.$$

Определение 1.6. Дисперсией случайного процесса $X(t), t \in \mathbb{T}$ называется функция вида:

$$V(t) = V\{X(t)\} = E\{X(t) - m(t)\}^2 = \int_{\mathbb{R}} (x - m(t))^2 dF_1(x; t).$$

Определение 1.7. Ковариационной функцией случайного процесса $X(t), t \in \mathbb{T}$ называется функция вида:

$$\begin{aligned} cov(t_1, t_2) &= cov\{X(t_1), X(t_2)\} = E\{(X(t_1) - m(t_1))(X(t_2) - m(t_2))\} = \\ &= \iint_{\mathbb{R}^2} (x_1 - m(t_1))(x_2 - m(t_2)) dF_2(x_1, x_2; t_1, t_2) \end{aligned}$$

Определение 1.8. Корреляционной функцией случайного процесса $X(t), t \in \mathbb{T}$ называется функция вида:

$$\text{corr}\{X(t_1), X(t_2)\} = E\{X(t_1)X(t_2)\} = \iint_{\mathbb{R}^2} x_1 x_2 dF_2(x_1, x_2; t_1, t_2)$$

Замечание 1.1. Имеет место следующее соотношение, связывающее ковариационную и корреляционную функции:

$$\text{corr}\{X(t_1), X(t_2)\} = \frac{\text{cov}\{X(t_1), X(t_2)\}}{\sqrt{V\{X(t_1)\}V\{X(t_2)\}}},$$

где $X(t), t \in \mathbb{T}$, — случайный процесс.

Определение 1.9. Случайный процесс $X(t), t \in \mathbb{T}$, называется *стационарным в широком смысле*, если $\exists E\{x^2(t)\} < \infty, t \in \mathbb{T}$, и

1. $m(t) = E\{x(t)\} = m = \text{const}, t \in \mathbb{T}$;
2. $\text{cov}(t_1, t_2) = \text{cov}(t_1 - t_2), t_1, t_2 \in \mathbb{T}$.

Определение 1.10. Случайный процесс $X(t), t \in \mathbb{T}$, называется *стационарным в узком смысле*, если $\forall n \in \mathbb{N}, \forall t_1, \dots, t_n \in \mathbb{T}, \forall \tau, t_1 + \tau, \dots, t_n + \tau \in \mathbb{T}$ выполняется соотношение:

$$F_n(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) = F_n(x_1, \dots, x_n; t_1 + \tau, \dots, t_n + \tau).$$

Замечание 1.2. Если случайный процесс $X(t), t \in \mathbb{T}$, является стационарным в узком смысле и $\exists E\{x^2(t)\} < \infty, t \in \mathbb{T}$, то он будет стационарным и в широком смысле, но не наоборот.

1.2 Вариограмма и внутренне стационарный случайный процесс

Определение 1.11. Вариограммой случайного процесса $X(t), t \in \mathbb{T}$ называется функция вида

$$2\gamma(h) = V\{X(t+h) - X(t)\}, t, h \in \mathbb{T}. \quad (1.1)$$

При этом функция $\gamma(h), h \in \mathbb{T}$, называется *семивариограммой*.

Определение 1.12. Случайный процесс $X(t), t \in \mathbb{T}$, называется *внутренне стационарным*, если справедливы следующие равенства:

$$E\{X(t_1) - X(t_2)\} = 0, \quad (1.2)$$

$$V\{X(t_1) - X(t_2)\} = 2\gamma(t_1 - t_2), \quad (1.3)$$

где $2\gamma(t_1 - t_2)$ — вариограмма рассматриваемого процесса, $t_1, t_2 \in \mathbb{T}$.

Замечание 1.3. Если $X(t), t \in \mathbb{T}$, — гауссовский случайный процесс, то

$$(X(t+h) - X(t))^2 = 2\gamma(h)\chi_1^2,$$

где χ_1^2 — случайная величина, распределенная по закону *хи-квадрат* с одной степенью свободы.

При этом

$$E\{X(t+h) - X(t)\}^2 = 2\gamma(h), \quad (1.4)$$

$$V\{X(t+h) - X(t)\}^2 = 2(2\gamma(h))^2. \quad (1.5)$$

В дальнейшем в данной работе будем рассматривать случайные процессы с дискретным временем.

Глава 2

Оценка вариограммы внутренне стационарного гауссовского случайного процесса и ее свойства

Рассмотрим внутренне стационарный гауссовский случайный процесс с дискретным временем $X(t)$, $t \in \mathbb{Z}$, нулевым математическим ожиданием, постоянной дисперсией и неизвестной вариограммой.

Наблюдается процесс $X(t)$, $t \in \mathbb{Z}$, и регистрируются наблюдения $X(1), X(2), \dots, X(n)$ в последовательные моменты времени $1, 2, \dots, n$.

В качестве оценки вариограммы рассмотрим статистику, предложенную Матероном [?]:

$$2\tilde{\gamma}(h) = \frac{1}{n-h} \sum_{t=1}^{n-h} (X(t+h) - X(t))^2, \quad h = \overline{0, n-1}, \quad (2.1)$$

при этом положим $\tilde{\gamma}(-h) = \tilde{\gamma}(h)$, $h = \overline{0, n-1}$; $\tilde{\gamma}(h) = 0$, $|h| \geq n$.

2.1 Первые два момента оценки вариограммы

Найдем выражения для первых двух моментов оценки вариограммы (2.1).

Теорема 2.1. *Для оценки $2\tilde{\gamma}(h)$, представленной равенством (2.1), имеют место следующие соотношения:*

$$E\{2\tilde{\gamma}(h)\} = 2\gamma(h), \quad (2.2)$$

$$\begin{aligned} & cov(2\tilde{\gamma}(h_1), 2\tilde{\gamma}(h_2)) = \\ &= \frac{2}{(n-h_1)(n-h_2)} \sum_{t=1}^{n-h_1} \sum_{s=1}^{n-h_2} (\gamma(t-h_2-s) + \gamma(t+h_1-s) - \gamma(t-s) - \gamma(t+h_1-s-h_2))^2, \end{aligned} \quad (2.3)$$

$$V\{2\tilde{\gamma}(h)\} = \frac{2}{(n-h)^2} \sum_{t,s=1}^{n-h} (\gamma(t-h-s) + \gamma(t+h-s) - 2\gamma(t-s))^2, \quad (2.4)$$

где $\gamma(h)$, $h \in \mathbb{Z}$, — *семивариограмма процесса* $X(t)$, $t \in \mathbb{Z}$, $h, h_1, h_2 = \overline{0, n-1}$.

Доказательство. Вычислим первый момент оценки (2.1), используя свойства математического ожидания:

$$E\{2\tilde{\gamma}(h)\} = E\left\{\frac{1}{n-h} \sum_{t=1}^{n-h} (X(t+h) - X(t))^2\right\} = \frac{1}{n-h} \sum_{t=1}^{n-h} E\{(X(t+h) - X(t))^2\}.$$

Из равенства (1.4) получаем, что

$$E\{2\tilde{\gamma}(h)\} = \frac{1}{n-h} \sum_{t=1}^{n-h} 2\gamma(h) = 2\gamma(h).$$

Таким образом, оценка (2.1) является **несмещённой** оценкой вариограммы.

Найдём второй момент оценки вариограммы при различных значениях h :

$$\begin{aligned}
\text{cov}\{2\tilde{\gamma}(h_1), 2\tilde{\gamma}(h_2)\} &= E\{(2\tilde{\gamma}(h_1) - E\{2\tilde{\gamma}(h_1)\})(2\tilde{\gamma}(h_2) - E\{2\tilde{\gamma}(h_2)\})\} = \\
&= E\left\{\frac{1}{n-h_1} \sum_{t=1}^{n-h_1} ((X(t+h_1) - X(t))^2 - E\{(X(t+h_1) - X(t))^2\}) \times \right. \\
&\quad \times \frac{1}{n-h_2} \sum_{s=1}^{n-h_2} ((X(s+h_2) - X(s))^2 - E\{(X(s+h_2) - X(s))^2\})\} = \\
&= \frac{1}{(n-h_1)(n-h_2)} \sum_{t=1}^{n-h_1} \sum_{s=1}^{n-h_2} \text{cov}\{(X(t+h_1) - X(t))^2, (X(s+h_2) - X(s))^2\} \quad (2.5)
\end{aligned}$$

Из свойства 1.1 корреляции получаем, что

$$\begin{aligned}
\text{cov}\{(X(t+h_1) - X(t))^2, (X(s+h_2) - X(s))^2\} &= \text{corr}\{(X(t+h_1) - X(t))^2, (X(s+h_2) - X(s))^2\} \times \\
&\quad \times \sqrt{V\{(X(t+h_1) - X(t))^2\} V\{(X(s+h_2) - X(s))^2\}}
\end{aligned}$$

Принимая во внимание (1.5) и предыдущее соотношение, из (2.5) получаем:

$$\begin{aligned}
\text{cov}\{(X(t+h_1) - X(t))^2, (X(s+h_2) - X(s))^2\} &= \frac{2(2\gamma(h_1))(2\gamma(h_2))}{(n-h_1)(n-h_2)} \times \\
&\quad \times \sum_{t=1}^{n-h_1} \sum_{s=1}^{n-h_2} \text{corr}\{(X(t+h_1) - X(t))^2, (X(s+h_2) - X(s))^2\}
\end{aligned}$$

Далее воспользуемся леммой 1 из [?]:

$$\begin{aligned}
\text{cov}\{2\tilde{\gamma}(h_1), 2\tilde{\gamma}(h_2)\} &= \\
&= \frac{2(2\gamma(h_1))(2\gamma(h_2))}{(n-h_1)(n-h_2)} \sum_{t=1}^{n-h_1} \sum_{s=1}^{n-h_2} (\text{corr}\{(X(t+h_1) - X(t))^2, (X(s+h_2) - X(s))^2\})^2 = \\
&= \frac{2(2\gamma(h_1))(2\gamma(h_2))}{(n-h_1)(n-h_2)} \sum_{t=1}^{n-h_1} \sum_{s=1}^{n-h_2} \left(\frac{\text{cov}\{X(t+h_1) - X(t), X(s+h_2) - X(s)\}}{\sqrt{V\{X(t+h_1) - X(t)\} V\{X(s+h_2) - X(s)\}}} \right)^2
\end{aligned}$$

Воспользовавшись леммой 3 из [?] и определением корреляционной функции, получаем соотношение (2.3):

$$\begin{aligned}
\text{cov}\{2\tilde{\gamma}(h_1), 2\tilde{\gamma}(h_2)\} &= \\
&= \frac{2}{(n-h_1)(n-h_2)} \times \quad (2.6)
\end{aligned}$$

$$\times \sum_{t=1}^{n-h_1} \sum_{s=1}^{n-h_2} (\gamma(t-h_2-s) + \gamma(t+h_1-s) - \gamma(t-s) - \gamma(t+h_1-s-h_2))^2, \quad (2.7)$$

что и требовалось показать.

Отсюда нетрудно получить соотношение (2.4) для дисперсии оценки вариограммы $2\tilde{\gamma}(h)$, если положить $h_1 = h_2 = h$:

$$\begin{aligned}
V\{2\tilde{\gamma}(h)\} &= \frac{2}{(n-h)^2} \sum_{t,s=1}^{n-h} (\gamma(t-h-s) + \gamma(t+h-s) - \gamma(t-s) - \gamma(t+h-s-h))^2 = \\
&= \frac{2}{(n-h)^2} \sum_{t,s=1}^{n-h} (\gamma(t-h-s) + \gamma(t+h-s) - 2\gamma(t-s))^2.
\end{aligned}$$

□

2.2 Асимптотическое поведение оценки вариограммы

Проанализируем асимптотическое поведение моментов второго порядка оценки (2.1).

Теорема 2.2. *Если имеет место соотношение*

$$\sum_{h=-\infty}^{+\infty} |\gamma(h)| < +\infty, \quad (2.8)$$

то

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} (n - \min\{h_1, h_2\}) \text{cov}\{2\tilde{\gamma}(h_1), 2\tilde{\gamma}(h_2)\} = \\ & = 2 \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \gamma(m - h_2) + \gamma(m + h_1) - \gamma(m) - \gamma(m + h_1 - h_2))^2, \end{aligned} \quad (2.9)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n - h) V\{2\tilde{\gamma}(h)\} = 2 \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \gamma(m - h) + \gamma(m + h) - 2\gamma(m))^2. \quad (2.10)$$

где $\gamma(h), h \in \mathbb{Z}$, — семивариограмма процесса $X(t), t \in \mathbb{Z}$, $h, h_1, h_2 = \overline{0, n-1}$.

Доказательство. В (2.6) сделаем следующую замену переменных

$$t = t, \quad m = t - s.$$

Получим

$$\begin{aligned} & \text{cov}\{2\tilde{\gamma}(h_1), 2\tilde{\gamma}(h_2)\} = \\ & = \frac{2}{(n - h_1)(n - h_2)} \sum_{t=1}^{n-h_1} \sum_{t-m=1}^{n-h_2} (\gamma(m - h_2) + \gamma(m + h_1) - \gamma(m) - \gamma(m + h_1 - h_2))^2 \end{aligned} \quad (2.11)$$

Таким образом, в зависимости от h_1 и h_2 , возможны два случая: $h_1 > h_2$ и $h_1 < h_2$.




Рисунок 2.2.1 — Области суммирования после замены переменных

Рассмотрим первый случай: $h_1 > h_2$. Поменяем порядок суммирования в (2.11).

$$\begin{aligned}
cov\{2\tilde{\gamma}(h_1), 2\tilde{\gamma}(h_2)\} &= \frac{2}{(n-h_1)(n-h_2)} \times \\
&\times \left(\sum_{m=1-n+h_2}^{h_2-h_1-1} \sum_{t=1}^{m+n-h_2} (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 + \right. \\
&+ \sum_{m=h_2-h_1}^0 \sum_{t=1}^{n-h_1} (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 + \\
&\quad \left. + \sum_{m=1}^{n-h_1-1} \sum_{t=m+1}^{n-h_1} (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 \right)
\end{aligned}$$

Заметим, что выражение под знаком суммы не зависит от t , получим:

$$\begin{aligned}
cov\{2\tilde{\gamma}(h_1), 2\tilde{\gamma}(h_2)\} &= \frac{2}{(n-h_1)(n-h_2)} \times \\
&\times \left(\sum_{m=1-n+h_2}^{h_2-h_1-1} (m+n-h_2)(\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 + \right. \\
&+ (n-h_1) \sum_{m=h_2-h_1}^0 (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 + \\
&\quad \left. + \sum_{m=1}^{n-h_1-1} (n-h_1-m)(\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 \right)
\end{aligned}$$

Вынесем $n-h_1$ из каждого слагаемого:

$$\begin{aligned}
cov\{2\tilde{\gamma}(h_1), 2\tilde{\gamma}(h_2)\} &= \frac{2}{n-h_2} \times \\
&\times \left(\sum_{m=1-n+h_2}^{h_2-h_1-1} \left(1 + \frac{h_1+m-h_2}{n-h_1}\right) (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 + \right. \\
&+ \sum_{m=h_2-h_1}^0 (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 + \\
&\quad \left. + \sum_{m=1}^{n-h_1-1} \left(1 - \frac{m}{n-h_1}\right) (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 \right)
\end{aligned}$$

Раскроем скобки под знаками сумм:

$$\begin{aligned}
cov\{2\tilde{\gamma}(h_1), 2\tilde{\gamma}(h_2)\} &= \frac{2}{n-h_2} \left(\sum_{m=1-n+h_2}^{h_2-h_1-1} (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 + \right. \\
&+ \frac{1}{n-h_1} \sum_{m=1-n+h_2}^{h_2-h_1-1} (h_1+m-h_2)(\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 + \\
&+ \sum_{m=h_2-h_1}^0 (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 + \\
&+ \sum_{m=1}^{n-h_1-1} (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 - \\
&\quad \left. - \frac{1}{n-h_1} \sum_{m=1}^{n-h_1-1} m(\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 \right)
\end{aligned}$$

Приведём подобные:

$$\begin{aligned}
cov\{2\tilde{\gamma}(h_1), 2\tilde{\gamma}(h_2)\} &= \frac{2}{n-h_2} \left(\sum_{m=1-n+h_2}^{n-h_1-1} (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 + \right. \\
&+ \frac{1}{n-h_1} \sum_{m=1-n+h_2}^{h_2-h_1-1} (h_1+m-h_2)(\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 - \\
&\quad \left. - \frac{1}{n-h_1} \sum_{m=1}^{n-h_1-1} m(\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 \right)
\end{aligned}$$

Во втором слагаемом сделаем замену переменных $m = -(m+h_1-h_2)$, получим:

$$\begin{aligned}
cov\{2\tilde{\gamma}(h_1), 2\tilde{\gamma}(h_2)\} &= \frac{2}{n-h_2} \left(\sum_{m=1-n+h_2}^{n-h_1-1} (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 - \right. \\
&- \frac{1}{n-h_1} \sum_{m=1}^{n-h_1-1} m(\gamma(-m-h_1) + \gamma(-m+h_2) - \gamma(-m-h_1+h_2) - \gamma(-m))^2 - \\
&\quad \left. - \frac{1}{n-h_1} \sum_{m=1}^{n-h_1-1} m(\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 \right)
\end{aligned}$$

По определению семивариограммы, $\gamma(-h) = \gamma(h)$, тогда

$$\begin{aligned}
cov\{2\tilde{\gamma}(h_1), 2\tilde{\gamma}(h_2)\} &= \frac{2}{n-h_2} \left(\sum_{m=1-n+h_2}^{n-h_1-1} (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 - \right. \\
&\quad \left. - \frac{2}{n-h_1} \sum_{m=1}^{n-h_1-1} m(\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 \right)
\end{aligned}$$

Аналогично для случая $h_1 < h_2$:

$$\begin{aligned}
cov\{2\tilde{\gamma}(h_1), 2\tilde{\gamma}(h_2)\} &= \frac{2}{(n-h_1)(n-h_2)} \times \\
&\times \left(\sum_{m=1-n+h_2}^0 \sum_{t=1}^{m+n-h_2} (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 + \right. \\
&+ \sum_{m=1}^{h_2-h_1} \sum_{t=m+1}^{m+n-h_2} (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 + \\
&\quad \left. + \sum_{m=h_2-h_1+1}^{n-h_1-1} \sum_{t=m+1}^{n-h_1} (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 \right)
\end{aligned}$$

Выражение под знаком суммы не зависит от t :

$$\begin{aligned}
cov\{2\tilde{\gamma}(h_1), 2\tilde{\gamma}(h_2)\} &= \frac{2}{(n-h_1)(n-h_2)} \times \\
&\times \left(\sum_{m=1-n+h_2}^0 (m+n-h_2)(\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 + \right. \\
&+ (n-h_2) \sum_{m=1}^{h_2-h_1} (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 + \\
&\quad \left. + \sum_{m=h_2-h_1+1}^{n-h_1-1} (n-h_1-m)(\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 \right)
\end{aligned}$$

Вынесем $n-h_2$ из каждого слагаемого:

$$\begin{aligned}
cov\{2\tilde{\gamma}(h_1), 2\tilde{\gamma}(h_2)\} &= \frac{2}{n-h_1} \times \\
&\times \left(\sum_{m=1-n+h_2}^0 \left(1 + \frac{m}{n-h_2}\right) (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 + \right. \\
&+ \sum_{m=1}^{h_2-h_1} (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 + \\
&\quad \left. + \sum_{m=h_2-h_1+1}^{n-h_1-1} \left(1 + \frac{h_2-h_1-m}{n-h_2}\right) (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 \right)
\end{aligned}$$

Раскроем скобки под знаками сумм:

$$\begin{aligned}
cov\{2\tilde{\gamma}(h_1), 2\tilde{\gamma}(h_2)\} &= \frac{2}{n-h_1} \left(\sum_{m=1-n+h_2}^0 (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 + \right. \\
&+ \frac{1}{n-h_2} \sum_{m=1-n+h_2}^0 m(\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 + \\
&+ \sum_{m=1}^{h_2-h_1} (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 + \\
&+ \sum_{m=h_2-h_1+1}^{n-h_1-1} (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 + \\
&+ \frac{1}{n-h_2} \sum_{m=h_2-h_1+1}^{n-h_1-1} (h_2-h_1-m)(\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 \Big)
\end{aligned}$$

Приведём подобные:

$$\begin{aligned}
cov\{2\tilde{\gamma}(h_1), 2\tilde{\gamma}(h_2)\} &= \frac{2}{n-h_1} \left(\sum_{m=1-n+h_2}^{n-h_1-1} (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 + \right. \\
&+ \frac{1}{n-h_2} \sum_{m=1-n+h_2}^0 m(\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 + \\
&+ \frac{1}{n-h_2} \sum_{m=h_2-h_1+1}^{n-h_1-1} (h_2-h_1-m)(\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 \Big)
\end{aligned}$$

Во втором слагаемом сделаем замену переменных $m = -m$, в третьем $m = m - h_1 + h_2$, получим:

$$\begin{aligned}
cov\{2\tilde{\gamma}(h_1), 2\tilde{\gamma}(h_2)\} &= \frac{2}{n-h_1} \left(\sum_{m=1-n+h_2}^{n-h_1-1} (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 - \right. \\
&- \frac{1}{n-h_2} \sum_{m=0}^{n-h_2-1} m(\gamma(-m-h_2) + \gamma(-m+h_1) - \gamma(-m) - \gamma(-m+h_1-h_2))^2 - \\
&- \frac{1}{n-h_2} \sum_{m=1}^{n-h_2-1} m(\gamma(m-h_1) + \gamma(m+h_2) - \gamma(m-h_1+h_2) - \gamma(m))^2 \Big)
\end{aligned}$$

По определению семивариограммы, $\gamma(-h) = \gamma(h)$, тогда

$$\begin{aligned}
cov\{2\tilde{\gamma}(h_1), 2\tilde{\gamma}(h_2)\} &= \frac{2}{n-h_1} \left(\sum_{m=1-n+h_2}^{n-h_1-1} (\gamma(m-h_2) + \gamma(m+h_1) - \gamma(m) - \gamma(m+h_1-h_2))^2 - \right. \\
&- \frac{2}{n-h_2} \sum_{m=1}^{n-h_2-1} m(\gamma(m+h_2) + \gamma(m-h_1) - \gamma(m) - \gamma(m-h_1+h_2))^2 \Big)
\end{aligned}$$

Дальше начинаются рассуждения!!!

Нужно доказать: при $h_1 > h_2$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n - h_2) \text{cov}\{2\tilde{\gamma}(h_1), 2\tilde{\gamma}(h_2)\} = 2 \sum_{m=-\infty}^{+\infty} (\gamma(m - h_2) + \gamma(m + h_1) - \gamma(m) - \gamma(m + h_1 - h_2))^2 \quad (2.12)$$

Изначально для поиска предела нужно домножить $\text{cov}\{2\tilde{\gamma}(h_1), 2\tilde{\gamma}(h_2)\}$ на $(n - h_2)$, потому что эта ковариация была расписана в виде произведения, а предел произведения искать мы не можем.

Дальше смотрим:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (n - h_2) \frac{2}{n - h_2} & \left(\sum_{m=1-n+h_2}^{n-h_1-1} (\gamma(m - h_2) + \gamma(m + h_1) - \gamma(m) - \gamma(m + h_1 - h_2))^2 - \right. \\ & \left. - \frac{2}{n - h_1} \sum_{m=1}^{n-h_1-1} m(\gamma(m - h_2) + \gamma(m + h_1) - \gamma(m) - \gamma(m + h_1 - h_2))^2 \right) = \\ & = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left(\sum_{m=1-n+h_2}^{n-h_1-1} (\gamma(m - h_2) + \gamma(m + h_1) - \gamma(m) - \gamma(m + h_1 - h_2))^2 - \right. \\ & \left. - \frac{2}{n - h_1} \sum_{m=1}^{n-h_1-1} m(\gamma(m - h_2) + \gamma(m + h_1) - \gamma(m) - \gamma(m + h_1 - h_2))^2 \right) = \\ & = 2 \sum_{m=-\infty}^{+\infty} (\gamma(m - h_2) + \gamma(m + h_1) - \gamma(m) - \gamma(m + h_1 - h_2))^2 - \\ & - 4 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n - h_1} \sum_{m=1}^{n-h_1-1} m(\gamma(m - h_2) + \gamma(m + h_1) - \gamma(m) - \gamma(m + h_1 - h_2))^2 \end{aligned}$$

Последнее равно стоит потому, что в первой сумме от n зависели только пределы суммирования, и они стали бесконечностями. Дальше нужно работать с выражением $-4 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n - h_1} \sum_{m=1}^{n-h_1-1} m(\gamma(m - h_2) + \gamma(m + h_1) - \gamma(m) - \gamma(m + h_1 - h_2))^2$ и показать, что оно равно 0.

Тут, кажется, можно использовать несколько способов (но ни один у меня не вышел).

Используем способ, как в доказательстве теоремы о свойствах выборочного среднего для временного ряда (Харин-Зуев-Жук, с 409 или ЭУМК по ТВИМС на с. 1840). Идея состоит в том, что если ряд из гамма сходится абсолютно, то любая его часть ограничена и с некоторого места даже мала. Это нас более чем устраивает, но в нашем пределе гамма стоит в квадрате, да еще и домножается на m .

Второй способ заключается в том, что мы берем не просто предел, а предел от модуля того же выражения, можем везде его по максимуму раскрывать и ставить знаки \leq . И снова пытаться действовать, как в той теореме. И вопрос возникает такой же - у нас выражения с гамма под квадратом и есть сомножитель.

На странице 411 из Харин Зуев Жук (страница 1842 и 1843 ЭУМК) есть интересные сходимости для рядов, влекомые нашим условием. Может, может получиться что-то с ними.

□

Глава 3

Анализ временного ряда в пакете R

3.1 Детерминированный подход

3.1.1 Описательные статистики и первичный анализ данных

В качестве исходных данных примем выборку из полученной от учебно-научного центра базы данных, путём отбора наблюдений в июле месяце за период с 1975 по 2012 год. Выборка представлена в приложении А в таблице А.1. Графически исходные данные представлены на рисунке 3.1.1.




Рисунок 3.1.1 — График исходных данных

Следует отметить, что для непосредственного исследования были использованы наблюдения с 1975 по 2009 год. Наблюдения за 2010–2012 годы были намеренно исключены из исследования в целях дальнейшего оценивания результатов анализа и прогнозирования. Заметим, что работа, представленная в параграфах 3.1.1–3.1.3, была также проделана и для всей выборки. Так как поведение целой выборки сохранилось в уменьшенной, то, без потери общности, будем считать её исходной.

Начнём исследование временного ряда с вычисления описательных статистик. R предоставляет в пакете *base* различные функции для расчетов базовых статистик. Также, в различных пакетах можно найти другие интересные функции, как статистические, так и математические. Но в целях удобства, компактности и контроля за функциональностью на основе [?, ?] мной был написан модуль *dstats*, представленный в приложении D листинге D.1. Данный модуль позволяет вычислять все рассмотренные в данной работе описательные статистики. Полученные результаты для исходных данных отображены в таблице 1.

	Значение
Среднее	19.88
Медиана	19.80
Нижний квартиль	18.20
Верхний квартиль	21.40
Минимум	16.00
Максимум	24.20
Размах	8.20
Квартильный размах	3.20
Дисперсия	4.92
Стандартное отклонение	2.22
Коэффициент вариации	24.75
Стандартная ошибка	0.37
Асимметрия	0.18
Ошибка асимметрии	0.40
Экссесс	-0.79
Ошибка эксцесса	0.78

Таблица 1 — Описательные статистики для наблюдаемых температур.

Рассмотрим подробнее некоторые полученные статистики.

Как видно из таблицы, *средняя* температура в июле месяце за период с 1975 по 2009 составляет приблизительно 20°C.

Коэффициент вариации в нашем случае равен 24.75%. Из этого следует, что выборку можно считать однородной, так как полученное значение является меньшим 33% [?].

Коэффициент асимметрии — мера симметричности распределения. Полученное значение: 0.185. Данное значение говорит о незначительной правосторонней асимметрии распределения. То есть о том, что выборочное распределение можно считать близким к нормальному [?].

Коэффициент эксцесса в рассматриваемом случае равен -0.79 . Так как коэффициент эксцесса нормального распределения равен 0, то в данном случае можно говорить о пологости пика распределения выборки по отношению к нормальному распределению [?].

С помощью тестовых статистик для коэффициента асимметрии и эксцесса [?, с.85-89], проверим значимость полученных значений для генеральной совокупности. Для этого в модуле *dstats* мной реализованы функции *dstats.test.skew* и *dstats.test.kurtosis*:

Полученная тестовая статистика для коэффициента асимметрии:

$$Z_{A_S} = \frac{A_S}{SES} = 0.465.$$

Данное значение попадает под случай $|Z_{A_S}| \leq 2$, а значит, выборочный коэффициент асимметрии не является значимым. Из чего, в свою очередь, следует, что по нему нельзя судить о коэффициенте асимметрии генеральной совокупности [?, с.85].

Полученная тестовая статистика для коэффициента эксцесса:

$$Z_K = \frac{K}{SEK} = -1.02.$$

Данное значение попадает под случай $|Z_K| \leq 2$, а значит, в данном случае выборочный коэффициент эксцесса не является значимым и нельзя ничего сказать о коэффициенте эксцесса генеральной совокупности [?, с.89].

Из полученных результатов следует отметить, что коэффициенты асимметрии и эксцесса, указывают на близость выборочного распределения к нормальному закону. Но при

этом, из-за недостаточного объёма выборки, по этим коэффициентам нельзя судить о соответствующих коэффициентах генеральной совокупности.

В **R** можно найти различные пакеты, позволяющие строить разнообразные гистограммы, диаграммы рассеяния, вероятностные графики, линейные графики, диаграммы диапазонов, размахов, круговые диаграммы, столбчатые диаграммы, последовательные графики и т.д., позволяющие увидеть специфику данных. В процессе работы в пакете **R** использовались источники [?, ?, ?].

С помощью функции пакета *ggplot2* построим гистограмму для отображения вариационного ряда исходных данных [?]. Гистограммы позволяют увидеть, как распределены значения переменных по интервалам группировки, то есть как часто переменные принимают значения из различных интервалов. А также, что бывает более важным, позволяет сделать предположение о разновидности распределения. Для вычисления интервалов разбиения воспользуемся *формулой Стерджеса*. Из [?] количество интервалов разбиения рассчитывается по формуле:

$$k = \lceil \log_2 n \rceil + 1 = \lceil \log_2 35.00 \rceil + 1 = 7.00. \quad (3.1)$$

Так как по гистограмме можно визуально предположить близость выборочного распределения к нормальному распределению, нанесём на график кривую плотности нормального распределения (рисунок 3.1.2). Проанализируем эту гистограмму. Во-первых, на ней




Рисунок 3.1.2 — Гистограмма наблюдаемых температур с кривой плотности нормального распределения $\mathcal{N}(19.88, 4.92)$

наглядно представлена близость выборочного распределения к нормальному с параметрами $\mathcal{N}(19.88, 4.92)$. Во-вторых, по этой гистограмме можно подтвердить или опровергнуть результаты, полученные на этапе вычисления описательных статистик.

Следует отметить согласованность полученных описательных статистик с полученной гистограммой. Во-первых, по коэффициенту асимметрии мы предположили о близости

распределения к симметричному. Это подтверждается гистограммой: на ней можно заметить небольшую скошенность вправо, что также согласовывается со знаком коэффициента. Во-вторых, коэффициент эксцесса указывал на пологость пика распределения. Данное заключение подтверждается кривой плотности — она имеет чуть более растянутую колоколообразную форму.

Другим часто используемым графическим способом проверки характера распределения данных является построение т.н. *графиков квантилей* (*Q-Q plots, Quantile-Quantile plots*). На таких графиках изображаются квантили двух распределений — эмпирического (т.е. построенного по анализируемым данным) и теоретически ожидаемого нормального распределения. При нормальном распределении проверяемой переменной точки на графике квантилей должны выстраиваться в прямую линию, исходящую под углом 45 градусов из левого нижнего угла графика. Графики квантилей особенно полезны при работе с небольшими по размеру совокупностями, для которых невозможно построить гистограммы, принимающие какую-либо выраженную форму.

В ходе данной работы была написана функция *ggqqp*, с помощью которой построен график 3.1.3. На этом графике можно визуально обнаружить аномальное положение наблю-




Рисунок 3.1.3 — График квантилей для наблюдаемых температур

даемых значений по отношению к нормальному распределению. В данном случае отклонения можно наблюдать на концах рассматриваемого промежутка. Остальные значения образуют отчетливую прямую. А значит, подтверждается предположение о нормальности выборочного распределения.

Далее следует проверить полученные результаты с помощью некоторых формальных тестов. Существует целый ряд статистических тестов, специально разработанных для проверки нормальности выборочного распределения. В общем виде проверяемую при помощи этих тестов нулевую гипотезу можно сформулировать следующим образом: “Анализируемая выборка происходит из генеральной совокупности, имеющей нормальное распределение”. Если получаемая при помощи того или иного теста вероятность ошибки P оказывается меньше некоторого заранее принятого уровня значимости (например, 0.05), нулевая гипотеза отклоняется.

В **R** реализованы практически все имеющиеся тесты на нормальность — либо в виде стандартных функций, либо в виде функций, входящих в состав отдельных пакетов. Примером базовой функции является *shapiro.test()*, при помощи которой можно выполнить широко используемый *тест Шапиро-Уилка* [?]. Из полученных в **R** результатов, статистика Шапиро-Уилка $W = 0.97$. Вероятность ошибки $p = 0.57 > 0.05$, а значит нулевая гипотеза не отвергается [?]. Следовательно опровергнуть предположение на основе данного теста нельзя.

Попробуем опровергнуть наше предположение на основе проверки критерия χ^2 Пирсона [?]. Для этого воспользуемся пакетом *nortest* и функцией *pearson.test*. Из полученных в **R** результатов, статистика χ^2 Пирсона $P = 2.80$. Вероятность ошибки $p = 0.83 > 0.05$, а значит нулевая гипотеза не отвергается. Следовательно опровергнуть предположение о нормальности на основе данного теста также нельзя. Проверим критерий: примем уровень значимости $\alpha = 0.05$, тогда из таблицы распределения χ^2 найдём критическое значение критерия $P_{кр}(\alpha, k) = 43.8$. Отсюда следует, что

$$P < P_{кр}.$$

А значит, нулевую гипотезу при уровне значимости $\alpha = 0.05$ не отвергаем и подтверждаем сделанный вывод на основании вычисленной вероятности ошибки.

Воспользуемся для тех же целей критерием Колмогорова–Смирнова [?]. Как в предыдущем случае воспользуемся представленной в пакете *nortest* функцией *ks.test*. Из полученных в **R** результатов, статистика Колмогорова–Смирнова $D = 0.078$. Вероятность ошибки $p = 0.98 > 0.05$, а значит нулевую гипотезу отвергнуть нельзя. Следовательно опровергнуть предположение о нормальности, как и в предыдущих случаях, также нельзя. Проверим критерий: примем так же уровень значимости $\alpha = 0.05$, тогда критическое значение $D_{кр}(\alpha) = 1.358$. Следовательно,

$$D < D_{кр}(\alpha),$$

и подтверждаем сделанные ранее заключения: нельзя отвергнуть нулевую гипотезу о нормальности выборочного распределения.

На данном этапе по полученным ранее результатам возникли подозрения о выбросах в исходной выборке. Выявление таких аномальных значений важно, так как их наличие, как правило, сильно влияет на всю выборку, в частности, на коэффициент корреляции. Проверим наличие выбросов с помощью статистических критериев. Для этих целей воспользуемся критерием Граббса [?]. Данный основан на предположении о нормальности исходных данных. То есть, перед применением данного критерия необходимо убедиться, что данные могут быть в разумных пределах аппроксимированы нормальным распределением [?]. Поскольку ранее высказано предположение о нормальности, воспользуемся им для определения наличия выбросов.

Полученные результаты проверки критерия Граббса: статистика $G = 1.950.89$, вероятность ошибки $p\text{-value} = 0.81$ — что однозначно говорит нам о том, что следует отклонить альтернативную гипотезу H_1 и принять гипотезу H_0 . Другими словами, это говорит о том, что в исходной выборке нету выбросов. А значит выборка однородна. Таким образом, наши подозрения о выбросах не подтвердились проверкой критерия.

В соответствии с результатами проверки критериев и на основе построенных гистограммы и графика квантилей, можно сделать заключение о том, что распределение температуры воды озера Баторино в июле 1975–2009 годов является близким к нормальному закону распределения с параметрами $\mathcal{N}(19.88, 4.92)$. Что подтверждается коэффициентами асимметрии и эксцесса из таблицы 1. Следует также отметить, что эквивалентные результаты были получены и для всей выборки, до исключения последних наблюдений.

3.1.2 Корреляционный анализ

Исследуем теперь зависимость температуры воды от времени, построив диаграмму рассеяния и вычислив коэффициент корреляции соответствующих переменных.

Диаграммы рассеяния используются для визуального исследования зависимости между двумя переменными. Если переменные сильно связаны, то множество точек данных принимает определённую форму. С помощью таких диаграмм можно наглядно изучить знак коэффициента корреляции. Если точки на диаграмме расположены хаотически, то это говорит о независимости рассматриваемых переменных. Если с ростом переменной t возрастает переменная x то имеет место положительная корреляция. Если же с ростом переменной t переменная x убывает, то это указывает на отрицательную корреляцию.




Рисунок 3.1.4 — Диаграмма рассеяния

Из рисунка 3.1.4 видно, что точки образуют своеобразное «облако», ориентированное по вверх, то есть присутствует некая зависимость между рассматриваемыми переменными. Также, данная диаграмма наглядно показывает силу этой зависимости: так как точки не образуют чёткой формы, а разбросаны относительно линии, то можно говорить о наличии умеренной корреляции.

Проверим полученные результаты подробнее. Из расчётов в **R**, коэффициент корреляции $r_{xt} = 0.469$. Этим подтверждаются наши выводы из диаграммы рассеяния о положительной корреляции, поскольку полученный коэффициент корреляции является положительным и присутствует умеренная зависимость: $r_{xt} \approx 0.5$.

Оценим значимость полученного выборочного коэффициента корреляции с помощью возможностей пакета **R** и функции *cor.test*. Представленная функция позволяет с помощью различных методов выполнять проверки значимости выборочного коэффициента корреляции. Воспользуемся проверкой теста методом Пирсона. Из результатов её выполнения статистика $t = 3.05$, количество степеней свободы $df = 33$ и вероятность ошибки $p = 0.0045 < 0.05$, следовательно это говорит о том, что необходимо отвергнуть гипотезу $H_0 : r = 0$.

Другими словами, выборочный коэффициент значимо отличается от нуля, т.е. температура воды и время при уровне значимости $\alpha = 0.05$ имеют зависимость.

Следовательно, в рассматриваемом случае можно говорить о присутствии значимой зависимости между температурой воды в озере Баторино и временем.

3.1.3 Регрессионный анализ

Для введения последующих понятий анализа временных рядов воспользуемся [?].

В отличие от анализа случайных выборок, анализ временных рядов основывается на предположении, что последовательные значения в файле данных наблюдаются через равные промежутки времени.

Большинство методов исследования временных рядов включает различные способы фильтрации шума, выделения сезонной и циклической составляющих, позволяющие увидеть регулярную составляющую более отчётливо.

Во временных рядах выделяют три составляющие:

1. *Тренд (тенденция развития) (T)* — эволюционная составляющая, которая характеризует общее направление развития изучаемого явления и связана с действием долговременных факторов развития.
2. *Циклические (K), сезонные (S) колебания* — это составляющие, которые проявляются как отклонения от основной тенденции развития изучаемого явления, и связаны с действием краткосрочных, систематических факторов развития.
3. *Нерегулярная случайная составляющая (ошибка) (E)*, являющаяся результатом действия второстепенных факторов развития.

Первые два типа компонент представляют собой детерминированные составляющие. Случайная составляющая образована в результате суперпозиции некоторого числа внешних факторов.

По типу взаимосвязи вышеперечисленных составляющих ряда динамики можно построить следующие модели временных рядов (X):

- Аддитивная модель: $X = T + K + S + E$;
- Мультипликативная модель: $X = T \times K \times S \times E$.

Аддитивной модели свойственно то, что характер циклических и сезонных колебаний остаётся постоянным.

В мультипликативной модели характер циклических и сезонных колебаний остаётся постоянным только по отношению к тренду (т.е. значения этих составляющих увеличиваются с возрастанием значений тренда).

По причине того, что в данном случае мы рассматриваем один месяц в году на протяжении длительного периода, будем считать, что в нашем временном ряде циклическая и сезонная составляющие отсутствуют. Построим график временного ряда.

На графике 3.1.4 можно заметить явно выраженный линейный рост значений со временем. Из этого следует, что уравнение тренда имеет вид:

$$x(t) = at + b,$$

где $a, b \in \mathbb{R}$, $t = \overline{0, n-1}$, n — объем выборки.

Продолжая рассуждение, как наблюдение из графика, можно отметить, что не происходит увеличения амплитуды колебаний с течением времени. А значит, данная модель

является аддитивной. Из всего вышесказанного можно заключить, что модель исходного временного ряда имеет вид:

$$X = T + E,$$

В **R** реализованы функции, позволяющие подгонять линейные модели к исследуемым данным [?]. Одной из таких функций является *lm(Fitting Linear Model)* [?, с.178]. Она позволяет получить коэффициенты линии регрессии(тренд), остатки после удаления тренда. Коэффициенты, полученные с помощью данной функции представлены в (3.2).

$$a = 0.11, \quad b = 17.96. \quad (3.2)$$

Следует отметить, что в пакете **STATISTICA** похожая процедура была проведена для всей выборки с помощью инструмента *Trend Subtract*, результаты которой согласуются с полученными в **R** коэффициентами.

Таким образом получена линейная модель, описывающая тенденцию развития:

$$x(t) = at + b = 0.11t + 17.96 \quad (3.3)$$

На основе полученной линейной модели (3.3), построим ряд остатков(приложение С, таблица С.1), удалив тренд из исходного ряда. Полученный ряд графически представлен на рисунке В.1 в приложении В.

Проведём анализ полученной регрессионной модели. Для этого проверим значимость полученных коэффициентов регрессии и оценим адекватность регрессионной модели. Рассчитаем вспомогательные величины, воспользовавшись [?]. Дисперсия отклонения

$$\sigma_\varepsilon^2 \approx 4.07,$$

стандартные случайные погрешности параметров a, b :

$$\sigma_a \approx 0.0393, \quad \sigma_b \approx 0.745.$$

Воспользуемся критерием значимости коэффициентов линейной регрессии [?]. Примем уровень значимости $\alpha = 0.05$, тогда

$$T_a = 2.79, \quad T_b = 24.11.$$

Число степеней свободы $k = 30.00$, $t_{кр}(k, \alpha) = 1.70$.

- $|T_a| > t_{кр} \Rightarrow$ коэффициент a значим.
- $|T_b| > t_{кр} \Rightarrow$ коэффициент b значим.

Следовательно, при уровне значимости $\alpha = 0.05$, коэффициенты линейной регрессии являются значимыми.

Оценим адекватность полученной регрессионной модели. Дисперсия модели:

$$\overline{\sigma^2} \approx 1.02.$$

Остаточная дисперсия:

$$\overline{D} \approx 3.94.$$

Воспользуемся F-критерием Фишера. Пусть уровень значимости $\alpha = 0.05$,

$$F_{крит} \approx 7.79,$$

при степенях свободы $v_1 = 1, v_2 = 30.00$, $F_{табл}(v_1, v_2, \alpha) = 4.17$.

$$F_{\text{крит}} > F_{\text{табл.}}$$

Следовательно, при уровне значимости $\alpha = 0.05$, регрессионная модель является адекватной.

Рассчитаем коэффициент детерминации:

$$\eta_{x(t)}^2 \approx 0.275.$$

Проверим отклонение от линейности: $\eta_{x(t)}^2 - r_{xt}^2 \approx -0.00644 \leq 0.1$. Следовательно отклонение от линейности незначительно. Но при этом коэффициент детерминации оказался не высоким (< 0.7), это говорит о том, что построенная регрессионная модель не описывает в достаточной мере поведение временного ряда. Это, в свою очередь, может значить, что изменение температуры зависит не только от времени, но ещё и от каких-то других, неучтённых, факторов.

Тем не менее, попробуем построить прогноз по полученной модели. Вычисленные прогнозные значения на 2010-2012 годы для сравнения отображены на таблице 2:

	Год	Актуальное	Прогнозное
1	2010	24.30	18.15
2	2011	22.80	18.25
3	2012	20.20	18.36

Таблица 2 — Сравнение прогнозных значений

Имеющееся отклонение прогнозов от реальных данных ещё раз подтверждает, что построенная модель временного ряда обладает невысокой точностью.

3.1.4 Анализ остатков

Проанализируем временной ряд остатков. Для этого проверим свойства, которым должна удовлетворять нерегулярная составляющая ε :

1. $E(\varepsilon) = 0$.
2. Дисперсия ε постоянна для всех значений.
3. Остатки независимы и нормально распределены.

Вычислим описательные статистики для остатков. Полученные результаты проследим по таблице 3.

Как видно из таблицы 3, среднее значение равно нулю. При этом коэффициенты асимметрии ($A_S = 0.424$) и эксцесса ($K = -0.773$) указывают на большее отклонение распределения остатков от нормального закона.

Построим гистограмму и график квантилей для проверки последних заключений. Построенная гистограмма (приложение В, рисунок В.2) наглядно демонстрирует полученные в таблице 3 коэффициенты асимметрии и эксцесса.

Для проверки нормальности построим график квантилей. На рисунке 3.1.5 можно заметить, что присутствуют отклонения относительно нормального распределения. Наиболее явный из них — нижний хвост. Остальные — небольшие скачки по ходу линии нормального распределения. Проверим с помощью критерия Шапиро-Уилка, можно ли считать полученные остатки нормально распределёнными. Из полученных в **Р** результатов, статистика Шапиро-Уилка $W = 0.95$. Вероятность ошибки $p = 0.12 > 0.05$, а значит нулевая

	Значение
Среднее	-0.00
Медиана	0.14
Нижний квартиль	-1.80
Верхний квартиль	1.28
Минимум	-2.99
Максимум	4.33
Размах	7.32
Квартильный размах	3.07
Дисперсия	3.84
Стандартное отклонение	1.96
Стандартная ошибка	0.33
Асимметрия	0.42
Ошибка асимметрии	0.40
Эксцесс	-0.77
Ошибка эксцесса	0.78

Таблица 3 — Описательные статистики остатков

гипотеза не отвергается. Следовательно опровергнуть предположение о нормальности на основе данного теста нельзя.

Проверим критерий χ^2 Пирсона. Из полученных в **R** результатов, статистика χ^2 Пирсона $P = 10.51$. Вероятность ошибки $p = 0.10 > 0.05$, а значит нулевая гипотеза не отвергается. Но при этом, это значение очень близко к 0.05. Проверим критерий: примем уровень значимости $\alpha = 0.05$, тогда из таблицы распределения χ^2 найдём критическое значение критерия $\chi^2_{кр}(\alpha, k) \approx 43.8$. Отсюда следует, что

$$\chi^2_{набл} < \chi^2_{кр},$$

где $\chi^2_{набл} = P = 10.51$. А значит, гипотезу о нормальности не отклоняем.

Построим график автокорреляционной функции для определения наличия взаимосвязей в ряде остатков (рисунок 3.1.6). На графике пунктирные линии разграничивают значимые и не значимые корреляции: значения, выходящие за линии, являются значимыми [?, с.376]. На представленном графике автокорреляционной функции все значения не выходят за интервал, обозначенный пунктирными линиями. Проверим значимость автокорреляций с помощью теста Льюнга-Бокса [?, с.377-378]. Данный тест проверяет наличие автокорреляций в исследуемом ряде. Используя возможности пакета **R** получили значения: статистика Льюнга-Бокса $X^2 = 0.075$ и вероятность ошибки $p = 0.78 > 0.05$ — это говорит о том, что тест не выявил значимых автокорреляций.

На рисунке 3.1.6 также можно заметить некоторое затухание всвязи с увеличением лага. На основе этого можно сделать предположение о стационарности. Для проверки этого предположения воспользуемся расширенным тестом Дики-Фуллера(ADF) [?]. Из результатов проверки теста, статистика Дики-Фуллера $DF = -3.27$, вероятность ошибки $p = 0.093 < 0.05$. Следовательно, необходимо принять альтернативную гипотезу о стационарности.

Полученная модель оказалась неоднозначной. С одной стороны, полученное значение коэффициента детерминации показало недостаточную точность полученной модели и не удалось достоверно показать нормальность ряда остатков. С другой стороны, была показана стационарность и отсутствие автокорреляции. Поэтому возникает необходимость строить модель другими методами.




Рисунок 3.1.5 — График квантилей для остатков

3.2 Геоestatистический подход

3.2.1 Вариограммный анализ. Кригинг.

В данной части работы для более объективного оценивания полученных прогнозов возьмем в качестве исследуемой выборки первые 32 значения исходных данных.

Традиционные детерминированные методы, широко используемые в задачах прогнозирования, в большинстве случаев на практике не позволяют в полной мере решить ту или иную задачу. В наиболее благоприятных вариантах исследований они позволяют оценивать значения в точках, в которых измерения не проводились и определять значения на плотной сетке (в близких к измерениям точках). Следует также отметить, что данные измерений, как правило, дискретны и неоднородно распределены. В свою очередь, анализ этих данных и его результаты в значительной мере зависят как от качества так и от количества исходных данных. И именно такие выводы были сделаны в результате проделанной в предыдущих частях данной работы. Отсюда следует, что необходимо использовать другие современные методы, позволяющие сделать более точные модели и выводы.

Для поставленной задачи в современных исследованиях хороших результатов позволяет добиться методы геостатистики, что подтверждается работами [?, ?]. Современная геостатистика — это широкий спектр статистических моделей и инструментов для анализа, обработки и представления пространственно-распределенной информации.

В рамках геостатистики, для получения наилучшей в статистическом смысле пространственной оценки используются модели из семейства кригинга (*kriging*) — наилучшей линейной несмещенной оценки (*Best Linear Unbiased Estimator* — *BLUE*). Кригинг является “наилучшим” оценщиком в статистическом смысле — его оценка обладает минимальной дисперсией. Важным свойством кригинга является точное воспроизведение значений измерений в имеющихся точках (интерполяционные свойства). В отличие от многочисленных детерминированных методов оценка кригинга сопровождается оценкой ошибки интерполяции в каждой точке. Полученная ошибка позволяет охарактеризовать неопределенность




Рисунок 3.1.6 — График автокорреляционной функции

интерполяционной оценки данных при помощи доверительных интервалов.

В отличие от детерминированных методов, геостатистические оценки опираются на информацию о внутренней структуре данных, зависят от самих данных, т.е. являются адаптивными.

В различных геофизических явлениях выделяют свойство пространственной непрерывности: чем ближе две точки, тем ближе значение. Для оценки данного свойства построим диаграмму взаимного разброса пар точек (*h-scatterplot*), разделённых расстоянием h . Эта диаграмма позволяет увидеть пространственную непрерывность и проверить наличие корреляции в данных как качественно, так и количественно [?].

Построенная диаграмма (рисунок В.3, приложение В) отображает поведение данных с увеличением лага. Следует отметить, что в классическом случае присутствия зависимости, поведение должно было быть следующим: на начальных графиках сильная концентрация, и с увеличением лага эта концентрация уменьшается. В нашем случае такого не наблюдается. Напротив, на всех лагах присутствует слабая зависимость. Что, вообще говоря, вполне обосновано спецификой исследуемых данных: рассматривается температура воды за один определённый месяц в течение нескольких лет. Ко всему прочему, это подтверждается результатами проведённого ранее анализа остатков.

Центральная идея геостатистики состоит в использовании знаний о пространственной корреляции экспериментальных данных для построения пространственных оценок и интерполяций. Вариограмма — ключевой инструмент для оценки степени пространственной корреляции, имеющейся в данных, и для ее моделирования. Модель вариограммы является функцией, определяющей зависимость изменения исследуемой величины в пространстве от расстояния. Следовательно, интерполяционная модель, основанная на такой корреляционной функции, будет отражать реальные явления, которые лежат в основе данных измерений. Всевозможные пары точек могут быть рассортированы по классам в соответствии с разностью их координат $h = x_i - x_j$, называемой *лагом*. Для близких точек разность значений функции в них обычно меньше и растёт с увеличением расстояния между точками. Вычислив среднее значение квадратов разностей для каждого

значения лага h (для каждого собранного класса пар измерений), можно получить дискретную функцию, называемую *экспериментальной вариограммой*. Вариограмма обычно характеризуется тремя значениями: эффект самородков (*nugget*), ранг (*range*) и порог (*sill*). Эффект самородков характеризуется разрывом вариограммы около нуля. Порог характеризует предельное значение вариограммы, на некотором расстоянии, называемом рангом, за которым последующие значения вариограммы становятся некоррелированными.

Также при построении вариограммы следует учитывать параметр максимального расстояния, для которого вычисляется вариограмма. Первоначальным параметром было выбрано следующее значение: $2n/3 = 21$ [?].

Построим экспериментальную вариограмму с помощью пакета *gstat* и функции *variogram*. С помощью этой функции можно построить экспериментальную вариограмму, основанную на классической оценке вариограммы и робастной оценке Кресси [?]. Построим экспериментальную вариограмму с помощью классической оценки.

Построенная вариограмма отображена на рисунке В.5 в приложении В. На представленном рисунке можно заметить, что на промежутке $[0; 1]$ не происходит роста значений вариограммы. Наоборот, наблюдается разрыв: первое значение находится значительно выше 0. При этом вариограмма не сильно выходит за пределы дисперсии переменной, которая равна 4.07. Более того, первые значения уже достигли порога. Что говорит о том, что вариограмма на первых значениях выходит на предельное значение, и последующие значения некоррелированы. Это, на самом деле, согласуется с нашими исходными данными, так как при анализе остатков было выявлено отсутствие автокорреляций, и спецификой самих данных: наблюдение за каждый год, вообще говоря, не зависит от предшествующего.

На основе этого делаем вывод о наличии эффекта самородков и делаем первоначальное предположение о равенстве порога 3.9.

На основе экспериментальной вариограммы построим модель вариограммы для дальнейшего использования на этапе кригинга. Моделью вариограммы может служить не каждая функция, а только та, для которой выполнено условие положительной определенности. Положительная определенность модели вариограммы гарантирует, что уравнения кригинга, построенные с использованием данной модели, имеют единственное устойчивое решение. Поэтому при моделировании используются только те функции, для которых положительная определенность установлена, а также их взвешенные линейные комбинации с неотрицательными весами, которые тоже будут являться положительно определенными. Модель вариограммы строится как линейная комбинация подходящих базисных моделей [?].

Для построения моделей вариограммы существует два подхода: ручную, т.е. визуально с ручным подбором параметров, и автоматическим подбором параметров с помощью специальных методов. И на практике построение модели вариограммы представляет собой итеративный процесс, на каждом шаге которого следует наилучшим образом подобрать параметры очередного модельного приближения. В различной литературе рекомендуется строить модели вручную, так как исследователь лучше знает специфику данных, чем различные методы оценивания. Попробуем построить модель вариограммы визуально.

Ранее было отмечено присутствие эффекта самородков. Другой, часто встречающейся моделью, является сферическая:

$$\gamma(|h|) = cSph_a(|h|) = \begin{cases} c(1.5|h|/a - 0.5(|h|/a)^3) & , |h| \leq a, \\ c & , |h| > a. \end{cases} \quad (3.4)$$

Возьмём эту модель в качестве базовой с помощью функции *vgm*, в качестве начального параметра возьмём порог, указанный ранее: 3.9. Далее воспользуемся функцией *fit.variogram* для подбора более точных значений указанной модели. Таким образом окончательная модель:

	Модель	Порог	Ранг
1	Nug	3.99	0.00
2	Sph	0.62	4.56

Таблица 4 — Модель вариограммы

И график полученной модели на рисунке 3.2.7 (пунктиром). На графике можно проследить все указанные ранее особенности: эффект самородков и порог.




Рисунок 3.2.7 — Классические модели вариограммы

Задача геостатистики — оценить значения изучаемой пространственной переменной в произвольных точках области исследования на основе анализа ее значений, измеренных в ограниченном числе выборочных точек. По построенной модели вычислим оценки при помощи ординарного кригинга, реализованного функцией *krige*. Вычисленные значения отображены в таблице С.2 в приложении С. Оценку отклонения от истинных значений выразим с помощью среднеквадратической ошибки (*MSE*). В данном случае $MSE = 2.47$. Полученные значения оказались идентичными значению тренда, следовательно прогноз почти не изменился. Это говорит о том, что построенная модель не смогла уловить поведение исходных данных. По этой причине был использован второй вариант построения модели — с автоматическим подбором параметров.

Для построения модели вариограммы была реализована возможность автоматического подбора модели на основе функции *fit.variogram*. Суть этого подхода заключается в следующем: при заданных начальных условиях (эффект самородков, ранг, порог), для всех возможных базисных моделей подгонялись их параметры, для этих моделей вычислялись сумма квадратов ошибок, и на основе этого показателя выбиралась наиболее эффективная модель. Код программы представлен в листинге D.2.

На рисунке [DELETED] сплошной линией и в приложении В на рисунке В.4 показан результат выполнения представленной ранее функции. Таким образом, наилучшей моделью вариограммы, построенной по классической оценке, стала линейная комбинация двух:

эффект самородков с параметром 3.31 и модель с эффектом дыр (*Hole*) с параметрами: порог — 1.04, ранг — 0.379 изображенная в приложении В на рисунке В.5.

Методом простого кригинга в этом случае были построены прогнозные значения, отображенные в таблице 5. Полученные значения отличаются от предыдущих, в них появилось

	Год	Наблюдение	Прогноз	Тренд
1	2007	19.400	21.714	21.578
2	2008	21.800	21.578	21.687
3	2009	21.900	21.881	21.797
4	2010	24.300	21.876	21.906
5	2011	22.800	22.013	22.016
6	2012	20.200	22.171	22.126

Таблица 5 — Прогноз (классическая оценка)

некоторое поведение. Но в данном случае $MSE = 2.63$, что хуже предыдущего значения, а значит, прогноз ухудшился. Попробуем улучшить результат с помощью робастной оценки Кресси.

Модель вариограммы, представленная на рисунке В.6 в приложении В, является также линейной комбинацией двух базисных моделей: эффекта самородков с параметром 4.57 и волновая модель с параметрами: 0.559, 1.17. Заметим, что эмпирическая вариограмма, построенная по робастной оценке, отличается от соответствующей вариограмм, построенных по классической оценке. Появилось заметное поведение вариограммы, в отличие от предыдущей, где значения концентрировались около дисперсии выборки.

Результаты применения кригинга показали прогнозные значения, указанные в 6. Среднеквадратическая ошибка $MSE = 2.25$, таким образом это значение близко к значе-

	Год	Наблюдение	Прогноз	Тренд
1	2007	19.400	21.458	21.578
2	2008	21.800	21.748	21.687
3	2009	21.900	21.940	21.797
4	2010	24.300	22.027	21.906
5	2011	22.800	22.055	22.016
6	2012	20.200	22.089	22.126

Таблица 6 — Прогноз (робастная оценка)

нию, полученному вручную. Таким образом, использование робастной оценки улучшило результат применения кригинга.

Исследуем теперь поведение прогнозных значений, полученных с помощью кригинга, при различных параметрах максимального расстояния вариограммы. В качестве оценки качества полученного прогноза возьмем среднеквадратическую ошибку. Чем меньше ошибка — тем лучше прогноз. Для этих целей реализована функция *ComparePredictionParameters*. Результат её работы на рисунке 3.2.8. На этом графике отчетливо видно, что робастная оценка (пунктир-точка), в отличие от классической (пунктир) и модели, построенной вручную (сплошная), в большинстве случаев даёт более точные прогнозы. И наилучший при максимальном расстоянии равным 6. С этим параметром, наилучший прогноз составляют значения кригинга из 7. Среднеквадратическая ошибка оказалась равной $MSE = 1.95$. Что действительно является лучшим из полученных показателем.




Рисунок 3.2.8 — Зависимость ошибки от максимального расстояния

	Год	Наблюдение	Прогноз	Тренд
1	2007	19.400	21.154	21.578
2	2008	21.800	21.626	21.687
3	2009	21.900	22.046	21.797
4	2010	24.300	22.302	21.906
5	2011	22.800	22.365	22.016
6	2012	20.200	22.290	22.126

Таблица 7 — Наилучший прогноз (робастная оценка)

Сравнительный анализ полученного прогноза представлен на графике В.8 в приложении В.

Таким образом в результате вариограммного анализа были исследованы различные модели вариограмм, оценки, проведены два подхода по вычислению. В результате кригинга построена наилучшая модель прогнозных значений. Которая в свою очередь имеет погрешность в пределах стандартного отклонения. Следовательно данная модель является хорошим вариантом для построения прогнозных значений.

Заключение

В представленной работе бы проведён сравнительный анализ современных пакетов прикладных программ для статистического анализа. Из них как инструмент исследования был выбран язык программирования **R**, по причине его доступности и предоставления огромного числа пакетов. С помощью этого пакета была исследована важнейшая характеристика любого водоёма — температура воды. Исследование проводилось на основе данных, полученных из наблюдений за озером Баторино, в период с 1975 по 2012 год в июле месяце. Для этого были вычислены и проанализированы описательные статистики, проведена проверка на нормальность, проведён визуальный анализ. В результате указанной части работы было обнаружено, что распределение температуры воды в озере Баторино близко к нормальному закону распределения с параметрами $\mathcal{N}(20.08, 5.24)$. Отклонение от нормальности отмечается полученными коэффициентами асимметрии и эксцесса. Исследуемое распределение имеет небольшую скошенность вправо и более растянутую колоколообразную форму относительно нормального закона распределения. В результате проведённого корреляционного анализа была выявлена умеренная зависимость между температурой воды и временем: был обнаружен рост температуры с течением времени.

В работе был проведён регрессионный анализ, в процессе которого была построена аддитивная модель временного ряда, найдён тренд, и, как следствие удаления тренда из построенной модели, был получен ряд остатков. Построенная детерминированными методами линейная регрессионная модель оказалась значимой и адекватной, но при этом описывает поведение временного ряда лишь частично. В результате анализа ряда остатков было выявлено отклонение распределения от нормальности. Что говорит о наличии некоторых неучтённых данной моделью факторов, затрудняющих дальнейшее исследование классическими методами. Следует также отметить стационарность и отсутствие автокорреляций в ряде остатков. Эти результаты говорят о постоянстве вероятностных свойств с течением времени, а также об отсутствии зависимостей между наблюдениями.

Так как представленные в данной работе классические методы анализа временных рядов в этом случае оказались недостаточными для полноценного исследования, то следующим этапом стало использование современных геостатистических методов. В процессе чего были построены различные вариограммы, подобраны модели этих вариограмм. С помощью кригинга был осуществлён прогноз значений и их анализ. Найден наилучший прогноз для исходных данных.

	year	temperature
1	1975.00	20.20
2	1976.00	16.00
3	1977.00	17.70
4	1978.00	16.75
5	1979.00	17.50
6	1980.00	16.77
7	1981.00	19.80
8	1982.00	19.00
9	1983.00	21.40
10	1984.00	19.40
11	1985.00	20.40
12	1986.00	16.50
13	1987.00	17.10
14	1988.00	23.80
15	1989.00	19.90
16	1990.00	18.50
17	1991.00	23.00
18	1992.00	21.90
19	1993.00	18.00
20	1994.00	21.40
21	1995.00	18.90
22	1996.00	19.10
23	1997.00	21.00
24	1998.00	18.40
25	1999.00	23.50
26	2000.00	21.00
27	2001.00	24.20
28	2002.00	23.10
29	2003.00	18.00
30	2004.00	19.10
31	2005.00	20.00
32	2006.00	21.30
33	2007.00	19.40
34	2008.00	21.80
35	2009.00	21.90
36	2010.00	24.30
37	2011.00	22.80
38	2012.00	20.20

Таблица А.1 — Исходные данные.




Рисунок В.1 — График ряда остатков




Рисунок В.2 — Гистограмма остатков с кривой плотности нормального распределения $\mathcal{N}(19.88, 4.92)$




Рисунок В.3 — Диаграмма взаимного разброса




Рисунок В.4 — Экспериментальная и теоретическая вариограмма
(сферическая модель)




Рисунок В.5 — Экспериментальная и теоретическая вариограмма
(классическая оценка)




Рисунок В.6 — Экспериментальная и теоретическая вариограмма (робастная оценка)




Рисунок В.7 — Сравнение прогнозных значений (классическая оценка)




Рисунок В.8 — Сравнение прогнозных значений (робастная оценка)

	year	temperature
1	1975.00	2.05
2	1976.00	-2.25
3	1977.00	-0.66
4	1978.00	-1.71
5	1979.00	-1.06
6	1980.00	-1.89
7	1981.00	1.04
8	1982.00	0.14
9	1983.00	2.44
10	1984.00	0.33
11	1985.00	1.23
12	1986.00	-2.77
13	1987.00	-2.27
14	1988.00	4.33
15	1989.00	0.33
16	1990.00	-1.17
17	1991.00	3.22
18	1992.00	2.02
19	1993.00	-1.98
20	1994.00	1.32
21	1995.00	-1.28
22	1996.00	-1.18
23	1997.00	0.62
24	1998.00	-2.09
25	1999.00	2.91
26	2000.00	0.31
27	2001.00	3.41
28	2002.00	2.21
29	2003.00	-2.99
30	2004.00	-1.99
31	2005.00	-1.20
32	2006.00	0.00
33	2007.00	-2.00
34	2008.00	0.30
35	2009.00	0.30

Таблица С.1 — Временной ряд остатков.

	Год	Наблюдение	Прогноз	Тренд
1	2007	19.400	21.577	21.578
2	2008	21.800	21.688	21.687
3	2009	21.900	21.798	21.797
4	2010	24.300	21.907	21.906
5	2011	22.800	22.017	22.016
6	2012	20.200	22.126	22.126

Таблица С.2 — Прогноз (сферическая модель)

Приложение D Код программ

```

1 # Descriptive statistics
2
3 # Function for getting all descriptive statistics
4 dstats.describe <- function(data, type="", locale=FALSE, shiny=FALSE) {
5   cv <- dstats.coef.var(data)
6   stats <- c(dstats.mean(data), dstats.median(data), dstats.quartile.lower(data)
7     ,
8     dstats.quartile.upper(data), dstats.min(data), dstats.max(data),
9     dstats.range(data), dstats.quartile.range(data), dstats.variance(
10       data),
11     dstats.std.dev(data), if(!is.na(cv)){cv}, dstats.std.error(data),
12     dstats.skew(data), dstats.std.error.skew(data), dstats.kurtosis(
13       data),
14     dstats.std.error.kurtosis(data))
15
16   if(nchar(type)) {
17     dstats.write(data=data, type=type) ## TODO: need to improve — now it
18     computes two times the same things
19   }
20   if (locale) {
21     descr.row <- c("Среднее", "Медиана", "Нижний квартиль", "Верхний квартиль",
22       "Минимум", "Максимум", "Размах", "Квартильный размах",
23       "Дисперсия", "Стандартное отклонение", if(!is.na(cv)) {"Коэфф-
24         ициент вариации"},
25       "Стандартная ошибка", "Асимметрия", "Ошибка асимметрии",
26       "Экспесс", "Ошибка экспесса")
27     descr.col <- c("Значение")
28   } else {
29     descr.row <- c("Mean", "Median", "Lower Quartile", "Upper Quartile", "Range"
30       ,
31       "Minimum", "Maximum", "Quartile Range", "Variance", "Standard
32         Deviation",
33       if (!is.na(cv)) {"Coefficient of Variance"}, "Standard Error"
34       , "Skewness",
35       "Std. Error Skewness", "Kurtosis", "Std. Error Kurtosis")
36     descr.col <- c("Value")
37   }
38   if (!shiny) {
39     df <- data.frame(stats, row.names=descr.row)
40     colnames(df) <- descr.col
41   } else {
42     df <- data.frame(descr.row, sapply(stats, format, digits=2, scientific=FALSE
43       , nsmall=1))
44     colnames(df) <- c("Статистика", "Значение")
45   }
46 }

```

```

38   df
39 }
40
41 dstats.mean <- function(data, ...) {
42   m <- mean(data, ...)
43   if (m < .0000001) {
44     m <- 0
45   }
46   m
47 }
48
49 dstats.median <- function(data, ...) {
50   median(data, ...)
51 }
52
53 dstats.quartile.lower <- function(data, ...) {
54   quantile(data, ...) [[2]]
55 }
56
57 dstats.quartile.upper <- function(data, ...) {
58   quantile(data, ...) [[4]]
59 }
60
61 dstats.quartile.range <- function(data) {
62   dstats.quartile.upper(data) - dstats.quartile.lower(data)
63 }
64
65 dstats.min <- function(data, ...) {
66   min(data, ...)
67 }
68
69 dstats.max <- function(data, ...) {
70   max(data, ...)
71 }
72
73 dstats.range <- function(data) {
74   max(data) - min(data)
75 }
76
77 dstats.variance <- function(data, ...) {
78   var(data, ...)
79 }
80
81 dstats.std.dev <- function(data) {
82   sd(data)
83 }
84
85 dstats.coef.var <- function(data) {
86   mn <- mean(data)
87   if (abs(mn) > 1.987171e-15) {
88     (var(data) / mean(data)) * 100
89   } else
90     NA
91 }
92
93 dstats.std.error <- function(data) {
94   sd(data) / sqrt(length(data))
95 }
96
97 dstats.skew <- function(data) {

```

```

98   n <- length(data)
99   mean <- mean(data)
100   (n * sum(sapply(data, FUN=function(x){(x - mean)^3}))) /
101     ((n - 1) * (n - 2) * dstats.std.dev(data)^3)
102 }
103
104 dstats.std.error.skew <- function(data) {
105   n <- length(data)
106   sqrt((6 * n * (n - 1)) / ((n - 2) * (n + 1) * (n + 3)))
107 }
108
109 dstats.test.skew <- function(data) {
110   dstats.skew(data) / dstats.std.error.skew(data)
111 }
112
113 dstats.kurtosis <- function(data) {
114   n <- length(data)
115   mean <- mean(data)
116   (n * (n + 1) * sum(sapply(data, FUN=function(x){(x - mean)^4}))) - 3 * (sum(
117     sapply(data, FUN=function(x){(x - mean)^2})))^2 * (n - 1)) /
118     ((n - 1) * (n - 2) * (n - 3) * dstats.variance(data)^2)
119 }
120
121 dstats.std.error.kurtosis <- function(data) {
122   n <- length(data)
123   2 * dstats.std.error.skew(data) * sqrt((n^2 - 1) / ((n - 3) * (n + 5)))
124 }
125
126 dstats.test.kurtosis <- function(data) {
127   dstats.kurtosis(data) / dstats.std.error.kurtosis(data)
128 }
129
130 dstats.write <- function (data, type) {
131   WriteDescriptiveStatistic(expression=dstats.mean(data), type=type, name="mean"
132 )
133   WriteDescriptiveStatistic(expression=dstats.variance(data), type=type, name="
134     variance")
135   WriteDescriptiveStatistic(expression=paste(format(dstats.coef.var(data),
136     nsmall=2, digits=4), "\\%"), type=type, name="coef-var")
137   WriteDescriptiveStatistic(expression=dstats.skew(data), type=type, name="skew"
138 )
139   WriteDescriptiveStatistic(expression=dstats.kurtosis(data), type=type, name="
140     kurtosis")
141   WriteDescriptiveStatistic(expression=dstats.test.skew(data), type=type, name="
142     test-skew")
143   WriteDescriptiveStatistic(expression=dstats.test.kurtosis(data), type=type,
144     name="test-kurtosis")
145 }

```

Листинг D.1: Описательные статистики

```

1  ## Cleaning up the workspace
2  rm(list=ls(all=TRUE))
3
4  ## Dependencies
5  library(ggplot2) # eye-candy graphs
6  library(xtable) # convert data to latex tables
7  library(outliers) # tests for outliers
8  library(tseries) # adf test used
9  library(nortest) # tests for normality
10 library(sp) # spatial data

```

```

11 library(gstat)      # geostatistics
12 library(reshape2)  # will see
13
14 ## Import local modules
15 source("R/lib/plot.R")      # useful functions for more comfortable plotting
16 source("R/lib/dstats.R")    # descriptive statistics module
17 source("R/lib/misc.R")      # some useful global-use functions
18 source("R/lib/draw.R")      # helpers for drawing
19 source("R/lib/write.R")     # helpers for writing
20 source("R/lib/ntest.R")     # tests for normality
21 source("R/lib/measures.R")
22
23 ## Read the data / pattern: year;temperature
24 path.data <- "data/batorino_july.csv" # this for future shiny support and may be
    choosing multiple data sources
25 src.nrows <- 38
26 src.data <- read.csv(file=path.data, header=TRUE, sep=";", nrows=src.nrows,
    colClasses=c("numeric", "numeric"), stringsAsFactors=FALSE)
27
28 ## Global use constants
29 kDateBreaks <- seq(min(src.data$year) - 5, max(src.data$year) + 5, by=2) # date
    points for graphs
30
31 ## For the reason of prediction estimation and comparison, let cut observations
    number by 3
32 kObservationNum <- length(src.data[, 1]) - 3
33 WriteCharacteristic(expression=kObservationNum, type="original", name="n")
34
35 ## Source data as basic time series plot: points connected with line
36 plot.source <- DrawDataRepresentation(data=src.data, filename="source.png",
    datebreaks=kDateBreaks)
37
38 print(xtable(src.data, caption="Исходные данные.", label="table:source"), table
    .placement="H",
39       file="out/original/data.tex")
40
41 ## Form the data for research
42 research.data <- src.data[0:kObservationNum, ]
43
44 # Getting descriptive statistics for temperature in russian locale
45 research.data.dstats <- dstats.describe(research.data$temperature, type="
    original", locale=TRUE)
46 print(xtable(research.data.dstats, caption="Описательные статистики для наблюдае
    мых температур.", label="table:dstats"),
47       file="out/original/dstats.tex")
48
49 # Compute Sturges rule for output
50 WriteCharacteristic(expression=nclass.Sturges(research.data$temperature), type="
    original", name="sturges")
51
52 ## Basic histogram based on Sturges rule (by default) with pretty output (also
    by default)
53 plot.data.hist <- DrawHistogram(data=research.data, filename="original/histogram
    .png")
54
55 ## Tests for normality
56 research.data.shapiro <- ntest.ShapiroWilk(data=research.data$temperature, type="
    original", name="shapiro")
57 research.data.pearson <- ntest.PearsonChi2(data=research.data$temperature, type="
    original", name="pearson")

```

```

58 research.data.ks      <- ntest.KolmogorovSmirnov(data=research.data$temperature,
   type="original", name="ks")
59
60 ## Normal Quantile-Quantile plot // TODO: check when it appears in text
61 plot.data.qq <- DrawQuantileQuantile(data=research.data$temperature, filename="
   original/quantile.png")
62
63 ## Scatter plot with regression line
64 plot.data.scatter <- DrawScatterPlot(research.data, filename="original/
   scatterplot.png", kDateBreaks);
65
66 ## Grubbs test for outliers
67 research.data.grubbs <- grubbs.test(research.data$temperature)
68 WriteTest(research.data.grubbs$statistic, research.data.grubbs$sp.value, type="
   original", name="grubbs")
69
70 ## Compute correlation for output
71 research.data.correlation <- cor(x=research.data$year, y=research.data$
   temperature)
72 WriteCharacteristic(research.data.correlation, type="original", name="
   correlation")
73
74 ## Pearson's product-moment correlation test. Use time for y as numerical
75 research.data.ctest <- cor.test(research.data$temperature, c(1:kObservationNum),
   method="pearson")
76 WriteTest(research.data.ctest$statistic, research.data.ctest$sp.value, research.
   data.ctest$parameter[[1]], type="original", name="correlation")
77
78 ## Fitting linear model for researching data. It also compute residuals based on
   subtracted regression
79 research.data.fit <- lm(research.data$temperature ~ c(1:kObservationNum))
80
81 linear <- function(x, a, b) a * x + b
82 research.residuals.prediction.trend <- data.frame("Год"=src.data$year[(
   kObservationNum + 1):src.nrows],
83                                                     "Актуальное"=src.data$
   temperature[(
   kObservationNum + 1):src.
   nrows],
84                                                     "Прогнозное"=supply(X=
   ConvertYearsToNum(src.data$
   year[(kObservationNum + 1):
   src.nrows]), FUN=linear, a=
   research.data.fit$
   coefficients[[2]], b=
   research.data.fit$
   coefficients[[1]]))
85 print(xtable(research.residuals.prediction.trend, caption="Сравнение прогнозных
   значений", label="table:prediction_trend", digits=c(0, 0, 2, 2)),
86       file="out/residual/prediction-trend.tex")
87
88 ## Time series (which is by default is research data) with trend line based on
   linear module estimate (lm)
89 plot.data.ts <- DrawTimeSeries(data=research.data, filename="original/time-
   series.png", datebreaks=kDateBreaks)
90
91 ## Next step is research residuals computed few lines above
92 research.residuals <- data.frame("year"=research.data$year, "temperature"=
   research.data.fit$residuals)
93 print(xtable(research.residuals, caption="Временной ряд остатков.", label="table

```

```

:residuals"), table.placement="H",
94   file="out/residual/data.tex")
95
96 sign <- regr.significance(research.data$temperature, write=TRUE)
97 adeq <- regr.adequacy(research.data$temperature, write=TRUE)
98
99 ## Residuals time series (data have gotten on computing step: fitting linear
model)
100 plot.residuals.ts <- DrawTimeSeries(data=research.residuals, filename="residual/
time-series.png", datebreaks=kDateBreaks)
101
102 ## Descriptive statistics for residuals
103 research.residuals.dstats <- dstats.describe(research.residuals$temperature,
type="residual", locale=TRUE)
104 print(xtable(research.residuals.dstats, caption="Описательные статистики остатко
в", label="table:residuals_dstats"),
105   file="out/residual/dstats.tex")
106
107 ## Basic histogram for residuals / seems like the same as for non-residuals
108 plot.residuals.hist <- DrawHistogram(data=research.residuals, filename="residual
/histogram.png")
109
110 ## Tests for normality
111 research.data.shapiro <- ntest.ShapiroWilk(data=research.residuals$temperature,
type="residual", name="shapiro")
112 research.data.pearson <- ntest.PearsonChi2(data=research.residuals$temperature,
type="residual", name="pearson")
113 research.data.ks <- ntest.KolmogorovSmirnov(data=research.residuals$
temperature, type="residual", name="ks")
114
115 ## Normal Quantile-Quantile plot for residuals
116 plot.residuals.qq <- DrawQuantileQuantile(data=research.residuals$temperature,
filename="residual/quantile.png")
117
118 ## Auto Correlation Function plot
119 plot.residuals.acf <- DrawAutoCorrelationFunction(data=research.data$temperature
, filename="residual/acf.png")
120
121 ## Box-Ljung and adf tests (some kind of stationarity and independence tests) //
TODO: need to know exactly in theory what it is
122 research.residuals.box <- Box.test(research.residuals$temperature, type="Ljung-
Box")
123 WriteTest(research.residuals.box$statistic, research.residuals.box$sp.value,
research.residuals.box$parameter[[1]], type="residual", name="ljung-box")
124
125 research.residuals.adf <- adf.test(research.residuals$temperature)
126 WriteTest(research.residuals.adf$statistic, research.residuals.adf$sp.value, type
="residual", name="stationarity")
127
128 source("R/predictor.R")

```

Листинг D.2: Основной код программы

```

1 source("R/lib/afv.R")
2 source("R/lib/variogram.R")
3 source("R/lib/kriging.R")
4
5 ## Function definition: need to be moved into isolated place
6 # Completes trend values up to source observation number
7 computeTrend <- function (fit, future=0) {
8   c(sapply(c(1 : (src.nrows + future)), FUN=function(x) fit$coefficients[[1]] +

```

```

      x * fit$coefficients[[2]])
9 }
10
11 # Computes prediction with passed parameters and saves all needed info and plots
12 processPrediction <- function (data, year, variog=ComputeVariogram, cressie,
13   cutoff, name, caption) {
14   variogram <- variog(data, x=ConvertYearsToNum(year), cressie=cressie, cutoff=
15     cutoff, name=name, observations=kObservationNum)
16
17   WriteCharacteristic(variogram$var_model[[2]][1], type="variogram", name=paste0
18     (name, "-nug"))
19   WriteCharacteristic(variogram$var_model[[2]][2], type="variogram", name=paste0
20     (name, "-psill"))
21   WriteCharacteristic(variogram$var_model[[3]][2], type="variogram", name=paste0
22     (name, "-range"))
23
24   prediction <- PredictWithKriging(data, x=ConvertYearsToNum(year), observations
25     =kObservationNum, variogram_model=variogram$var_model, nrows=src.nrows)
26   CrossPrediction(src.data$temperature, src.data$year, research.data.trend,
27     prediction, name, observations=kObservationNum, nrows=src.nrows)
28   residual <- ComputeKrigingResiduals(src.data$temperature, research.data.trend,
29     prediction, observations=kObservationNum, nrows=src.nrows)
30   mse <- MSE(residual)
31
32   prediction.compare <- data.frame("Год"=src.data$year[(kObservationNum + 1):src
33     .nrows],
34     "Наблюдение"=src.data$temperature[(kObservationNum + 1):src.nrows],
35     "Прогноз"=prediction$var1.pred+research.data.trend[(kObservationNum + 1):src
36       .nrows],
37     "Тренд"=research.data.trend[(kObservationNum + 1):src.nrows])
38   print(xtable(prediction.compare, caption=caption, label=paste0("table:", name,
39     "-prediction"), digits=c(0, 0, 3, 3, 3)),
40     file=paste0("out/variogram/", name, "-prediction.tex"))
41
42   WriteCharacteristic(mse, type="variogram", name=paste0(name, "-mse"))
43
44   list(variogram=variogram, prediction=prediction, residual=residual, mse=mse)
45 }
46
47 kObservationNum <- 32
48
49 ## Form the data for research again
50 research.data <- src.data[0:kObservationNum, ]
51
52 research.data.fit <- lm(research.data$temperature ~ ConvertYearsToNum(research.
53   data$year))
54 research.data$residuals <- research.data.fit$residuals
55 research.data.trend <- computeTrend(research.data.fit)
56
57 cutoff <- trunc(2 * kObservationNum / 3) # let it be "classical" value
58
59 # Draw H-Scatterplot
60 research.data.hscat <- DrawHScatterplot(research.data$residuals[1:
61   kObservationNum], cutoff)
62
63 # Compute prediction manually with choosed model ("best" what i found)
64 manual <- processPrediction(data=research.data$residuals, year=research.data$
65   year, variog=ComputeManualVariogram, cressie=FALSE, cutoff=cutoff, name="
66   manual", caption="Прогноз (сферическая модель)")

```



```

53 # Compute prediction with auto fit model using classical estimation
54 classical <- processPrediction(data=research.data.residuals, year=research.data$
    year, cressie=FALSE, cutoff=cutoff, name="classical", caption="Прогноз (классическая оценка)")
55
56 # Compute prediction with auto fit model using robust (cressie) estimation
57 robust <- processPrediction(data=research.data.residuals, year=research.data$
    year, cressie=TRUE, cutoff=cutoff, name="robust", caption="Прогноз (робастная оценка)")
58
59 models.comparison <- CompareClassicalModels(manual$variogram, classical$
    variogram, filename="figures/variogram/models-comparison.png")
60
61 # Find best cutoff parameters
62 cutoff <- ComparePredictionParameters(research.data.residuals, research.data.
    trend, ConvertYearsToNum(research.data$year), filename="figures/variogram/
    parameter-comparison.png", observations=kObservationNum, nrows=src.nrows)
63
64 manual.best <- processPrediction(data=research.data.residuals, year=research.
    data$year, variog=ComputeManualVariogram, cressie=FALSE, cutoff=cutoff$manual
    , name="manual-best", caption="Наилучший прогноз (сферическая модель)")
65 classcial.best <- processPrediction(data=research.data.residuals, year=research.
    data$year, cressie=FALSE, cutoff=cutoff$classical, name="classical-best",
    caption="Наилучший прогноз (классическая оценка)")
66 robust.best <- processPrediction(data=research.data.residuals, year=research.
    data$year, cressie=TRUE, cutoff=cutoff$robust, name="robust-best", caption="Н
    аилучший прогноз (робастная оценка)")

```

Листинг D.3: Вариограммный анализ