Le VIH-SIDA et les IST

Le VIH et le SIDA

- Le VIH (virus de l'immunodéficience humaine) attaque surtout les lymphocytes T4, qui coordonnent les défenses.
- Les défenses s'affaiblissent peu à peu. Au stade SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise), des maladies dites opportunistes apparaissent (tuberculose, diarrhées graves, infections de la peau…).
- Une personne séropositive a des anticorps anti-VIH dans le sang : elle est porteuse du virus, même si elle n'a aucun signe.

Comment le VIH se transmet

- Par voie sexuelle (rapports non protégés).
- Par le sang (seringues, lames, objets tranchants partagés, transfusion non contrôlée).
- De la mère à l'enfant (pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement).

Le VIH ne se transmet PAS par la poignée de main, les repas partagés, la piqûre de moustique, la toux ou les toilettes.

Dépistage et traitement

- Seul un test de dépistage permet de savoir si on est infecté. Il est confidentiel.
- Après une prise de risque, il faut attendre quelques semaines (la « fenêtre sérologique ») pour qu'un test soit fiable.
- Les médicaments antirétroviraux (ARV) ne guérissent pas, mais empêchent le virus de se multiplier : la personne vit longtemps et transmet beaucoup moins le virus.
- Le traitement de la mère pendant la grossesse protège le bébé.

Les autres IST (infections sexuellement transmissibles)

- Gonococcie (« chaude-pisse ») et syphilis : dues à des bactéries, se soignent avec des antibiotiques.
- Hépatite B : due à un virus ; il existe un vaccin.

Une IST non soignée peut rendre stérile. Un écoulement ou une plaie aux organes génitaux doit faire consulter.

Se protéger

Abstinence, fidélité réciproque après dépistage, préservatif, pas de partage d'objets tranchants.

Les personnes vivant avec le VIH ont droit au respect : on ne doit pas les rejeter.

Pièges à éviter

- Séropositif ne veut pas dire malade du SIDA.
- Le moustique ne transmet pas le VIH.

Teste-toi

1. Une personne séropositive au VIH :

A. ne peut pas transmettre le virus
B. est guérie
C. a des anticorps anti-VIH : elle porte le virus
D. est forcément au stade SIDA

2. Les maladies qui profitent de l'affaiblissement des défenses sont dites :

A. chroniques
B. héréditaires
C. opportunistes
D. vaccinables

3. Pour savoir si l'on est infecté par le VIH, il faut :

A. observer ses symptômes
B. attendre de tomber malade
C. faire un test de dépistage
D. prendre sa température

4. La gonococcie et la syphilis sont dues à :

A. des bactéries
B. des champignons
C. des virus
D. des protozoaires

Corrigé

1. C : Elle peut n'avoir aucun signe pendant des années, tout en étant porteuse.
2. C : Exemples : tuberculose, diarrhées graves, infections de la peau.
3. C : Une personne infectée peut se sentir en parfaite santé.
4. A : Elles se soignent avec des antibiotiques prescrits par un médecin.