

Схема 5. Пищевая и физическая реабилитация после операции

пять последовательных этапов расширения рациона и сквозные требования к режиму

Этап I 0–2-е сутки	Этап II 3-и сутки — 2 недели	Этап III 2–4 недели	Этап IV 4–8 недель	Этап V с 8-й недели
Прозрачные жидкости	Жидкое питание	Пюреобразное питание	Мягкая пища	Обычная плотная пища
вода, несладкий отвар, бульон без жира 30 мл каждые 15 минут	кисломолочные напитки, белковые смеси, жидкие каши 50–100 мл на приём	протёртые овощи, творог, рыбное и мясное суфле 100–120 мл на приём	тушёные овощи, яйцо, мягкое мясо, рыба 120–150 мл на приём	рацион с приоритетом белка, дробно, 5–6 раз 150–200 мл на приём

Белок	не менее 60 г в сутки; при шунтирующих операциях 80–90 г; при недостижении цели — специализированные белковые смеси
Жидкость	не менее 1,5 л в сутки малыми глотками; не пить за 30 минут до еды и в течение 30 минут после еды
Витамины и минералы	поливитаминный комплекс для бариатрических пациентов пожизненно; кальций, витамин D, витамин B12, железо — по схеме и результатам лабораторного контроля
Физическая активность	ходьба с первых суток; 30 минут в день со 2-й недели; аэробная нагрузка с 4-й недели; силовые нагрузки и подъём тяжестей — не ранее 6–8 недель
Лекарственная терапия	ингибиторы протонной помпы 1–3 месяца; урсодезоксихолевая кислота до 6 месяцев для профилактики желчнокаменной болезни; пересмотр доз препаратов по коморбидности
Что исключается	газированные напитки, алкоголь не менее 12 месяцев, крупные куски пищи, приём жидкости во время еды, НПВС без согласования с врачом