

Задача 1.

Построить матрицу поворота на угол ϕ вокруг точки $A(a, b)$ на плоскости.

Ответ: $\begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$.

Задача 2.

Построить матрицу поворота на угол ϕ вокруг прямой L в $3D$ - пространстве проходящей через точку $A = (a, b, c)$ и имеющей направляющий вектор (l, m, n) с модулем, равным единице.

Чтобы выполнить поворот на угол ϕ вокруг прямой, проходящей через точку $A(a, b, c)$ и направляющим вектором (l, m, n) , надо:

- выполнить перенос так, чтобы точка $A(a, b, c)$ находилась в начале системы координат;
- выполнить соответствующие повороты так, чтобы ось вращения совпала с осью z ;
- выполнить поворот на угол ϕ вокруг оси z ;
- выполнить преобразование, обратное тому, что позволило совместить ось вращения с осью z ;
- выполнить обратный перенос;

1. Выполним перенос точки $A(a, b, c)$ в начало координат:

$$\begin{cases} 0 = a + x \\ 0 = b + y \\ 0 = c + z \end{cases}$$

Такой перенос может быть записан в матричной форме: $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c & 1 \end{bmatrix} T$, где

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -a & -b & -c & 1 \end{bmatrix}, \text{ здесь первая, вторая и третья строки матрицы } T \text{ соответствуют}$$


отображениям бесконечно удаленных точек, а четвертая - отображению точки $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

2. Сделаем так, чтобы ось вращения совпала с осью z :

В общем случае для того, чтобы произвольная ось проходящая через начало координат, совпала с одной из координатных осей, необходимо сделать два последовательных поворота вокруг двух других координатных осей. Для совмещения нашей оси с осью z сначала выполним поворот вокруг оси x , а затем вокруг оси y .

Чтобы определить угол поворота α вокруг оси x , используемый для перевода произвольной оси в плоскость xz , спроецируем сначала на плоскость yz направляющий

единичный вектор этой оси.



Из рисунка получаем, что $\cos \alpha = \frac{n}{\sqrt{n^2 + m^2}}$, $\sin \alpha = \frac{m}{\sqrt{n^2 + m^2}}$.

Тогда с помощью матрицы поворота вокруг оси x $[R_x] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

переходим в плоскость xz , причем теперь z -компонента вектора будет равна $\sqrt{n^2 + m^2}$.

Из рисунка получаем, что $\cos \beta = \frac{\sqrt{n^2 + m^2}}{1}$, $\sin \beta = \frac{l}{1}$.

Тогда с помощью матрицы поворота вокруг оси y $[R_y] = \begin{bmatrix} \cos(-\beta) & 0 & -\sin(-\beta) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin(-\beta) & 0 & \cos(-\beta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ось

вращения совпадает с осью z .

3. Выполним поворот на угол ϕ вокруг оси z с помощью матрицы поворота

$$[R_z] = \begin{bmatrix} -\cos \phi & \sin \phi & 0 & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ответ: $[R] = [T]^{-1}[R_x]^{-1}[R_y]^{-1}[R_z][R_y][R_x][T]$, где

$$[T] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -a & -b & -c & 1 \end{bmatrix}, [R_x] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{n}{\sqrt{n^2+m^2}} & \frac{m}{\sqrt{n^2+m^2}} & 0 \\ 0 & -\frac{m}{\sqrt{n^2+m^2}} & \frac{n}{\sqrt{n^2+m^2}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$[R_y] = \begin{bmatrix} \sqrt{n^2+m^2} & 0 & l & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -l & 0 & \sqrt{n^2+m^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, [R_z] = \begin{bmatrix} -\cos \phi & \sin \phi & 0 & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Задача 3.

Пусть первый поворот совершается вокруг оси x на угол $\pi/2$, а второй - вокруг оси y на тот же угол. Найдите результирующий поворот.

Сначала рассмотрим общий случай поворота на угол ψ_1 вокруг оси с направляющим вектором v_1 , затем поворота на угол ψ_2 вокруг оси с направляющим вектором v_2 .

При первом повороте произвольный вектор $w \in \mathbb{R}^3$ перейдет в $w_1 = q_1 w q_1^{-1}$,

где $q_1 = \cos(\psi_1/2) + v_1 \cdot \sin(\psi_1/2)$.

При втором повороте w_1 перейдет в $w_2 = q_2 w_1 q_2^{-1} = q_2 q_1 w q_1^{-1} q_2^{-1}$,

где $q_2 = \cos(\psi_2/2) + v_2 \cdot \sin(\psi_2/2)$.

Тогда вычислив произведение $q_2 q_1$ и представив его в виде $q_2 q_1 = \cos \psi + v \cdot \sin \psi$, заключаем, что результирующий поворот есть поворот вокруг оси v на угол 2ψ .

$$\begin{aligned} q_2 q_1 &= (\cos(\psi_2/2) + v_2 \cdot \sin(\psi_2/2)) \cdot (\cos(\psi_1/2) + v_1 \cdot \sin(\psi_1/2)) = \\ &= (1/2 + v_2 \cdot 1/2) \cdot (1/2 + v_1 \cdot 1/2) = \\ &= \left(\cos \frac{\psi_2}{2} \cos \frac{\psi_1}{2} - \sin \frac{\psi_2}{2} \sin \frac{\psi_1}{2} \langle v_2, v_1 \rangle \right) + \\ &+ \left(\sin \frac{\psi_2}{2} \cos \frac{\psi_1}{2} v_2 + \sin \frac{\psi_1}{2} \cos \frac{\psi_2}{2} v_1 + \sin \frac{\psi_2}{2} \sin \frac{\psi_1}{2} [v_2, v_1] \right) \end{aligned}$$

Отсюда можно получить следующие равенства для нахождения ψ , v :

$$\cos \psi = \cos \frac{\psi_2}{2} \cos \frac{\psi_1}{2} - \sin \frac{\psi_2}{2} \sin \frac{\psi_1}{2} \langle v_2, v_1 \rangle$$

$$\tan \psi \cdot v = \frac{\tan \frac{\psi_2}{2} v_2 + \tan \frac{\psi_1}{2} v_1 + \tan \frac{\psi_2}{2} \tan \frac{\psi_1}{2} [v_2, v_1]}{1 - \tan \frac{\psi_2}{2} \tan \frac{\psi_1}{2} \langle v_2, v_1 \rangle}$$

Подставим значения из нашей задачи

$$v_1 = (1, 0, 0), \psi_1 = \pi/2, v_2 = (0, 1, 0), \psi_2 = \pi/2:$$

$$\cos \psi = \cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{4} \cdot 0 = \frac{1}{4} \implies \sin \psi = \sqrt{1 - \frac{1}{16}} = \frac{\sqrt{15}}{4}, \tan \psi = \sqrt{15}$$

$$\begin{aligned} \sqrt{15} \cdot v &= \frac{\tan \frac{\pi}{4} v_2 + \tan \frac{\pi}{4} v_1 + \tan \frac{\pi}{4} \tan \frac{\pi}{4} [v_2, v_1]}{1 - \tan \frac{\pi}{4} \tan \frac{\pi}{4} \cdot 0} = v_2 + v_1 + (0, 0, -1) = \\ &= (0, 1, 0) + (1, 0, 0) + (0, 0, -1) = (1, 1, -1) \\ v &= \left(\frac{1}{\sqrt{15}}, \frac{1}{\sqrt{15}}, -\frac{1}{\sqrt{15}} \right) \end{aligned}$$

$$\text{Ответ: } \psi = \arccos\left(\frac{1}{4}\right), v = \left(\frac{1}{\sqrt{15}}, \frac{1}{\sqrt{15}}, -\frac{1}{\sqrt{15}} \right).$$