Nom _____

Grup _____

Data _____

Laboratori · La llei de Hooke

Sessió 10. Demostració a la pissarra i treball per parelles. Com podem mesurar una força pel que deforma un objecte?

Recorda. El pes d'un cos és $P = m \cdot g$, amb $g = 9{,}8\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ i la massa en kg. Un cos elàstic recupera la forma quan deixem d'aplicar-hi la força.

1 **Dades de la demostració.** Copia les masses penjades i els allargaments que anotem a la pissarra. Calcula el pes de cada massa.

Massa (g)	Massa (kg)	Pes, F (N)	Longitud de la molla (cm)	Allargament, Δx (cm)	Δx (m)
0					
50					
100					
150					
200					
250					

2 **La gràfica.** Representa la força (eix vertical) en funció de l'allargament (eix horitzontal). Posa magnitud i unitats als eixos.



3 **La constant elàstica.** Quina forma té la gràfica? Calcula'n el pendent: és la constant elàstica k de la molla, en $\frac{\text{N}}{\text{m}}$. Escriu la llei de Hooke amb el valor de k.

Llei de Hooke. En un cos elàstic, la força i la deformació són directament proporcionals: $F = k \cdot \Delta x$. La constant k indica la rigidesa: com més gran és, més força cal per deformar-lo.

4 **Una força desconeguda.** Pengem un objecte a la molla i s'allarga _____ cm. Quin pes té? Quina massa?

5 **Límits.** Què passaria si hi pengéssim una massa molt gran? La llei de Hooke es compliria sempre?

6 **Cap a la sessió 11.** Si posem una cèl·lula damunt d'un gel molt tou que es comporta com un conjunt de molles, com podríem saber quina força fa la cèl·lula?