Nom _____

Grup _____

Data _____

Laboratori 3 · El llevat fa pujar la massa

Sessió 7 · mig grup. En grups de 4 amb rols. S'avalua amb la rúbrica (criteris 1.1 i 1.2).

Seguretat.

- L'aigua calenta la serveix el professor.
- Les ampolles no es tapen mai amb tap: només amb el globus.

El **llevat** de forner està format per éssers vius microscòpics (fongs). Quan tenen sucre i humitat, fan una **fermentació**: **sucre → alcohol + diòxid de carboni**. Les bombolles de diòxid de carboni queden atrapades a la massa i la fan pujar. Al forn, l'alcohol s'evapora.


Procediment. Quatre ampolles amb 100 mL d'aigua, una cullerada de sucre i un sobre (o 10 g) de llevat, excepte la de control. Poseu un globus al coll de cada ampolla. Mesureu el perímetre dels globus cada 5 minuts.

1 **Variables.** Quina variable canviem? Quina mesurem? Quines mantenim iguals? Per què serveix l'ampolla 4?

2 **Resultats** (perímetre del globus, en cm).

Ampolla	Condicions	0 min	5 min	10 min	15 min	20 min
1	aigua freda (≈ 10 °C) + sucre + llevat					
2	aigua tèbia (≈ 35 °C) + sucre + llevat					
3	aigua molt calenta (≈ 70 °C) + sucre + llevat					
4	aigua tèbia + sucre, sense llevat					

3 **Gràfica.** Representa el perímetre de cada globus en funció del temps (quatre línies de colors).



4 **Interpreta.** En quina ampolla ha anat més de pressa la reacció? Per què a l'ampolla 3 gairebé no passa res? Per què la massa de la coca es deixa reposar en un lloc tebi?