Biologia

Dossier de teoria · 2n de Batxillerat · PAU Catalunya.

Índex

1. Biomolècules
2. La cèl·lula
3. Metabolisme
4. Genètica mendeliana
5. Genètica molecular i biotecnologia
6. Evolució
7. Microbiologia
8. Immunologia
9. Disseny experimental

1. Biomolècules

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU

Del bloc «Les biomolècules i el metabolisme» entren aquí la identificació del grup (glúcid, lípid, pròtid o àcid nucleic) a partir de l'estructura, la relació entre estructura i funció, i la classificació per funcions: energètica, estructural, reguladora i portadora d'informació. Les orientacions diuen que no cal reconèixer el subtipus concret d'un glúcid o d'un lípid si l'enunciat només demana el grup; tot i això, les estructures d'aquest tema són les que permeten decidir el grup sense dubtar.

De les proteïnes entra tot el que és de batxillerat: aminoàcids, enllaç peptídic, quatre nivells d'estructura, relació amb la funció, i els enzims (especificitat i factors: substrat, temperatura, pH i inhibidors). L'aigua i les sals són saber de 1r, imbricat: sense elles no s'entén la membrana ni l'osmosi.

Els àcids nucleics es reprenen al tema 5, on les orientacions situen la funció i l'expressió. Aquí n'hi ha prou amb la composició química.

1.1 Aigua i sals minerals

L'aigua és una molècula angular, H–O–H. L'oxigen és més electronegatiu que l'hidrogen i estira els electrons dels enllaços: sobre l'oxigen queda una càrrega parcial negativa (δ−) i sobre cada hidrogen una càrrega parcial positiva

(δ+). La molècula és polar. Entre l'hidrogen d'una molècula i l'oxigen d'una altra s'estableix un enllaç d'hidrogen, feble si se'n mira un de sol i decisiu quan n'hi ha milions.




Figura 1.1. L'aigua és polar. Els ponts d'hidrogen (línia discontínua) uneixen el δ+ d'un hidrogen amb el δ− d'un oxigen veí.

D'aquesta estructura en surten les propietats que la biologia fa servir. És un bon dissolvent de substàncies iòniques i polars (sals, sucres, aminoàcids) i un mal dissolvent de les apolars (greixos). Té una calor específica alta: costa canviar-ne la temperatura, i per això esmorteeix els canvis tèrmics. La calor de vaporització també és alta: evaporar aigua a la superfície d'un organisme en treu molta calor. Les molècules se subjecten entre si (cohesió) i a altres superfícies polars (adhesió); així puja la saba bruta pel xilema. La densitat màxima és a 4 °C i el gel, amb els ponts d'hidrogen ordenats, és menys dens que l'aigua líquida i hi sura: a l'hivern el fons d'un llac no es congela del tot. L'aigua també és reactiu: entra a la hidròlisi i en surt a la condensació, i és el substrat de la fotòlisi.

Idea clau

Polar no vol dir iònica. L'aigua no està feta d'ions H^+ i OH^- lliures. A 25 °C, només una fracció molt petita està dissociada: $[H^+][OH^-] = 10^{-14}$. El pH és $-\log[H^+]$. A pH 7, $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol·L^{-1}. Un tampó (bicarbonat, fosfat, proteïnes) esmorteix l'addició d'àcid o de base.

Les sals minerals es troben dissoltes, com ions (Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, Cl^-, HCO_3^-, HPO_4^{2-}), o precipitades (carbonat de calci a closques i ossos, fosfat de calci a l'os, sílice a algunes algues). Dissoltes, mantenen la pressió osmòtica, participen en el potencial de membrana (Na^+ i K^+) i en la contracció (Ca^{2+}), i són cofactors (Mg^{2+} de la clorofil·la i de molts enzims, Fe^{2+} de l'hemoglobina i dels citocroms, Zn^{2+} d'algunes polimerases). No són «aliment energètic»: no es catabolitzen per obtenir ATP.

Exemple resolt

Un problema diu que el pH d'un medi passa de 7 a 5. Quantes vegades ha canviat $[H^+]$?

$[H^+]$ a pH 7 és 10^{-7}; a pH 5 és 10^{-5}. El quocient és $10^{-5} / 10^{-7} = 10^2$. La concentració de protons és 100 vegades més gran. No és «dos punts més àcid» com si el pH fos una escala lineal.

De la polaritat a cada propietat

El pont d'hidrogen no és un enllaç covalent. És una atracció entre el δ+ d'un hidrogen ja unit a un àtom electronegatiu (O o N) i un parell d'electrons d'un altre O o N. A l'aigua, cada molècula en pot fer fins a quatre. Per això el gel és una xarxa oberta, menys densa que el líquid, i per això fondre gel o evaporar aigua demana molta energia: cal trencar molts ponts, no només separar molècules apolars.

Propietat	Què la causa	On es nota
Dissolvent de iònics i polars	envolta els ions i els grups polars	citosol, sang, saba
Mal dissolvent d'apolars	els ponts entre aigües són més forts que l'atracció per un greix	els lípids fan gotes o bicapes
Calor específica alta	part de l'energia es gasta en trencar ponts, no en accelerar molècules	la temperatura d'un organisme canvia a poc a poc
Calor de vaporització alta	cal separar del tot les molècules	la suor refreda
Cohesió i adhesió	ponts entre molècules d'aigua i amb superfícies polars	ascens de la saba al xilema
Gel menys dens que el líquid	xarxa hexagonal oberta	el gel sura i aïlla l'aigua de sota

Les sals dissoltes són ions. No tenen calories: no es poden oxidar per fer ATP. El que fan és elèctric i osmòtic. El Na^+ i el K^+ mantenen el potencial de membrana. El Ca^{2+} és el senyal de la contracció i de moltes exocitosis. El Mg^{2+} entra a la clorofil·la i al complex de l'ATP amb l'enzim. El Fe^{2+} és al grup hemo i als centres ferro-sofre de la cadena. Precipitades, les sals són esquelet: $CaCO_3$ a les closques, hidroxiapatita (fosfat de calci) a l'os.

Exemple resolt

El pH d'un suc gàstric és 2 i el del citosol, 7. Quantes vegades és més gran $[H^+]$ a l'estómac?

A pH 2, $[H^+] = 10^{-2}$ mol·L^{-1}. A pH 7, $[H^+] = 10^{-7}$. El quocient és $10^{-2} / 10^{-7} = 10^5$. Cent mil vegades, no «cinc vegades». El pH és logarítmic: un punt són deu vegades.

Mini-PAU resolt

Una dissolució de glucosa 0,30 mol·L^{-1} i una de NaCl 0,15 mol·L^{-1} es posen en contacte a través d'una membrana permeable només a l'aigua. Cap a on va l'aigua, aproximadament?

La glucosa no es dissocia: 0,30 mol de partícules per litre. El NaCl es dissocia en Na^+ i Cl^-: 0,15 × 2 = 0,30 mol de partícules per litre. Les dues cares tenen una concentració osmòtica semblant i el flux net és proper a zero. Si s'hagués comparat amb NaCl 0,30 mol·L^{-1}, l'aigua aniria cap a la sal, que té el doble de partícules.

Exemple resolt

Per què un llac es glaça per dalt i no sencer, i què hi té a veure el fet que la densitat màxima de l'aigua sigui a 4 °C?

En refredar-se fins a 4 °C l'aigua es fa més densa i baixa al fons. Per sota de 4 °C es fa menys densa i es queda a la superfície, on acaba glaçant-se. El gel, encara menys dens, sura i aïlla. El fons pot continuar líquid i amb vida. Si el gel fos més dens, s'enfonsaria i el llac es congelaria de baix a dalt.

Un tampó no impedeix que el pH canviï: en redueix el canvi. El parell bicarbonat / àcid carbònic de la sang n'és l'exemple. Si s'afegeix un àcid, el H^+ es combina amb HCO_3^- i no queda lliure. Si s'afegeix una base, l'àcid carbònic cedeix H^+. El pH es mou poc mentre quedi parell. Fora del rang del parell, el tampó s'esgota i el pH cau o puja de cop. Les proteïnes també tamponen, pels grups laterals ionitzables.

Mini-PAU resolt

Es compara la pujada de temperatura de 100 g d'aigua i de 100 g d'oli en aportar la mateixa energia. L'aigua puja menys. Quina propietat és, i per què no es diu «calor de vaporització»?

És la calor específica: energia per pujar un grau, sense canvi d'estat. La calor de vaporització és l'energia per evaporar, a temperatura constant. Aquí no hi ha evaporació; hi ha escalfament. La causa, en l'aigua, és que part de l'energia trenca ponts d'hidrogen en lloc d'accelerar molècules.

Exemple resolt

Una cèl·lula té [K^+] interior alt i [Na^+] interior baix. Aquests ions són sals precipitades o dissoltes, i aporten energia química?

Dissoltes. No estan en un cristall. No s'oxiden per fer ATP: l'energia del gradient és potencial electroquímic, que la cèl·lula ha pagat abans amb la bomba, no una reserva com el glicogen. Confondre el gradient amb un nutrient és l'error.

1.2 Glúcids

Els glúcids (hidrats de carboni, sucres) responen aproximadament a $C_n(H_2O)_n$. Porten diversos grups hidroxil i un grup carbonil: aldehid (aldoses) o cetona (cetoses). Es classifiquen pel nombre de monosacàrids units.

Els monosacàrids de més pes a la PAU són les pentoses (5 carbonis: ribosa i desoxiribosa, als àcids nucleics) i les hexoses (6 carbonis: glucosa, fructosa, galactosa). En dissolució, les pentoses i les hexoses tanquen un anell. La glucosa forma un anell de sis (piranosa). El carboni que era el carbonil passa a ser el carboni anomèric, el C1. Si l'OH d'aquest carboni queda cap avall a la representació de Haworth de la D-glucosa, l'isòmer és l'alfa; si queda cap amunt, és el beta. Els altres substituents de la D-glucosa no canvien: OH del C2 avall, del C3 amunt, del C4 avall, i el CH_2OH del C5 amunt.




Figura 1.2. α-D-glucopiranosa i β-D-glucopiranosa (NEUROtiker, domini públic). L'única diferència és l'OH del C1: avall és α i amunt és β. El traç gruixut és l'aresta de davant (C2–C3). L'hidrogen de cada carboni, no escrit, queda al costat oposat del substituent.

Dos monosacàrids s'uneixen per un enllaç glicosídic, amb pèrdua d'aigua. L'enllaç es descriu amb dues dades: l'anòmer (α o β) i quins carbonis queden lligats. La maltosa és α-D-glucosa-(1→4)-D-glucosa. La lactosa és β-D-galactosa-(1→4)-D-glucosa: la galactosa és l'epímer en C4 de la glucosa, i per això l'OH del C4 mira cap amunt. La sacarosa és α-D-glucosa-(1→2)-β-D-fructosa: els dos carbonis anomèrics queden ocupats i la sacarosa no és reductora. Maltosa i lactosa sí que ho són, perquè conserven un anomèric lliure. La fructosa del disacàrid és la β-D-fructofuranosa, un anell de cinc.




Figura 1.11. β-D-fructofuranosa (NEUROtiker, domini públic), la forma de la fructosa dins la sacarosa. Anell de cinc, amb el CH_2OH de l'anomèric i el de la cadena lateral.




Figura 1.9. Lactosa (NEUROtiker, domini públic): β-D-galactopiranosa unida per l'anomèric al C4 d'una glucosa. L'OH del C4 de la galactosa és amunt. L'anomèric de la glucosa queda lliure.




Figura 1.10. Sacarosa (Vaccinationist, domini públic). L'enllaç uneix el C1 α de la glucosa amb el C2 β de la fructosa. No queda cap anomèric lliure: no és reductora.




Figura 1.3. Maltosa en projecció de Haworth (NEUROtiker, domini públic). L'enllaç α(1→4) surt cap avall del C1 de l'esquerra i arriba al C4 de la dreta. L'anomèric de la dreta queda lliure: la maltosa és reductora. El mateix enllaç fa l'amilosa i el tram lineal del glicogen.

Els polisacàrids de reserva són l'amilosa i l'amilopectina (el midó vegetal) i el glicogen (animals i fongs). L'amilosa és una cadena d'$\alpha(1\rightarrow4)$, helicoïdal. L'amilopectina i el glicogen hi afegeixen ramificacions $\alpha(1\rightarrow6)$; el glicogen en porta més. La cel·lulosa és $\beta(1\rightarrow4)$: les cadenes queden estirades, s'enllacen per ponts d'hidrogen i formen la paret vegetal. La quitina, a la paret dels fongs i a l'exosquelet dels artròpodes, és un polímer de N-acetilglucosamina amb enllaços β.

Idea clau

La funció depèn de l'enllaç, no només de la fórmula $C_6H_{12}O_6$. $\alpha(1\rightarrow4)$ es pot mobilitzar (reserva). $\beta(1\rightarrow4)$ fa fibres (estructura). Els enzims que trenquen l'un no trenquen l'altre: nosaltres digerim el midó i no la cel·lulosa.

Funcions que cal saber assignar: energètica (glucosa, midó, glicogen), estructural (cel·lulosa, quitina, ribosa dins l'RNA) i de reconeixement (oligosacàrids del glicocàlix). Els glúcids no són el material genètic.

Mini-PAU resolt

Us donen tres molècules. La A és una cadena llarga de glucoses unides per $\beta(1\rightarrow4)$. La B és glicerol esterificat amb tres àcids grassos. La C és una cadena d'aminoàcids. Digueu a quin grup pertany cadascuna i quina és de reserva energètica en animals.

A és un glúcid (cel·lulosa): estructural, no de reserva animal. B és un lípid saponificable (triacilglicerol): reserva, però típica del teixit adipós, no «la» reserva glucídica. C és un pròtid. Cap de les tres és el glicogen. Si la pregunta hagués estat «quina pot ser reserva en animals», el triacilglicerol sí que ho és; la cel·lulosa, no. Cal llegir el verb de l'enunciat.

Reserva i estructura no són el mateix enllaç

Polisacàrid	Enllaç	On	Funció
Amilosa	$\alpha(1\rightarrow4)$	midó vegetal	reserva
Amilopectina i glicogen	$\alpha(1\rightarrow4)$ i ramificacions $\alpha(1\rightarrow6)$	plantes / animals i fongs	reserva; el glicogen és més ramificat
Cel·lulosa	$\beta(1\rightarrow4)$	paret vegetal	estructura

La maltosa és el disacàrid de dues glucoses amb $\alpha(1\rightarrow4)$. La sacarosa uneix glucosa i fructosa pels dos carbonis anomèrics ($\alpha1\rightarrow\beta2$) i per això no redueix. La lactosa és galactosa $\beta(1\rightarrow4)$ glucosa i sí que redueix. A la prova n'hi ha prou amb decidir el grup i, si l'enunciat dona l'enllaç, la funció.

Exemple resolt

Una cadena de glucoses amb enllaços $\beta(1\rightarrow4)$ es pot fer servir com a reserva muscular?

No. És cel·lulosa. La reserva animal és el glicogen, amb enllaços α. Els enzims que trenquen l'α no trenquen el β.

Com es classifica un glúcid a la prova

Molècula	Unitats	Enllaç	Redueix?	Funció que cal dir
Glucosa, fructosa, galactosa	1 hexosa	—	sí	energia; la glucosa és el combustible de la glucòlisi
Ribosa / desoxiribosa	1 pentosa	—	sí	dins l'RNA / el DNA
Maltosa	2 glucoses	$\alpha(1\rightarrow4)$	sí	producte de la digestió del midó
Lactosa	galactosa + glucosa	$\beta(1\rightarrow4)$	sí	sucre de la llet
Sacarosa	glucosa + fructosa	$\alpha1\leftrightarrow\beta2$	no	transport a la saba elaborada
Amilosa	moltes glucoses	$\alpha(1\rightarrow4)$	—	reserva vegetal, sense ramificar
Amilopectina, glicogen	moltes glucoses	$\alpha(1\rightarrow4)$ i $\alpha(1\rightarrow6)$	—	reserva; el glicogen és més ramificat
Cel·lulosa	moltes glucoses	$\beta(1\rightarrow4)$	—	paret vegetal
Quitina	N-acetilglucosamina	β	—	paret fúngica i exosquelet

Un sucre redueix el reactiu de Fehling (o de Tollens) si té un carboni anomèric lliure, capaç d'obrir-se i mostrar el carbonil. A la sacarosa els dos anomèrics estan ocupats en l'enllaç: no redueix. A la maltosa i a la lactosa en queda un de lliure: sí que redueixen. A la PAU n'hi ha prou amb aquest criteri; no cal memoritzar el color del precipitat si l'enunciat no el dona.

A la Haworth de la D-glucopiranosa el CH_2OH del C5 va sempre cap amunt. Això no decideix α o β. El que ho decideix és l'OH del C1: avall és α (trans respecte del CH_2OH), amunt és β (cis). L'oxigen de l'anell és un vèrtex, entre el C5 i el C1, no un àtom al centre de l'hexàgon.

Mini-PAU resolt

Us donen una cadena de glucoses amb enllaços $\beta(1\to4)$ i una altra amb $\alpha(1\to4)$ i ramificacions $\alpha(1\to6)$. Digueu el nom de cadascuna, on es troba i si un humà la pot fer servir com a nutrient.

La primera és cel·lulosa: paret de les cèl·lules vegetals. Els nostres enzims digestius no trenquen el $\beta(1\to4)$; no és nutrient per a nosaltres (els remugants se'n surten amb microorganismes). La segona, si és molt ramificada i animal, és glicogen; si ho és menys i vegetal, amilopectina. Les dues són reserva i sí que les digerim, perquè l'amilasa trenca l'$\alpha(1\to4)$.

Exemple resolt

Per què el glicogen és més ramificat que l'amilopectina, si tots dos són reserva de glucosa?

Cada ramificació és un extrem no reductor per on la glucogen fosforilasa pot començar a alliberar glucosa-1-fosfat. Més ramificacions volen dir més extrems alhora i una mobilització més ràpida, que és el que necessita el múscul. La planta no té tanta pressa i l'amilopectina en porta menys. La funció de reserva és la mateixa; la velocitat, no.

Exemple resolt

Una molècula té fórmula aproximada $C_n(H_2O)_n$, diversos OH i un grup aldehid. És un lípid, un monosacàrid o un aminoàcid?

Monosacàrid (una aldosa). Un aminoàcid portaria N. Un lípid seria pobre en oxigen i insoluble en aigua. La fórmula «hidrat de carboni» és una pista, no una definició estricta: la desoxiribosa en té un oxigen menys i continua sent un glúcid.

La prova sovint dona tres fórmules i demana el grup, no el nom. El criteri curt és: diversos OH i un carbonil, glúcid; cadenes llargues d'hidrocarbur, lípid; un N en un grup amino i un carboxil, aminoàcid o pèptid; una base, un sucre i un fosfat, nucleòtid. Dins dels glúcids, el nombre d'unitats separa mono, di i poli, i l'enllaç α o β separa reserva i estructura.

Mini-PAU resolt

La sacarosa no dóna positiu amb Fehling i la maltosa sí. Les dues són disacàrids de mida semblant. On és la diferència estructural?

A la sacarosa l'enllaç ocupa el carboni anomèric de la glucosa i el de la fructosa. No queda cap anomèric lliure que pugui obrir-se i mostrar el carbonil. A la maltosa l'enllaç és $\alpha(1\to4)$: el C1 d'una glucosa queda lliure. El test no mesura la mida; mesura aquest carboni.

Exemple resolt

Per què la cel·lulosa fa fibres rectes i l'amilosa una hèlix, si totes dues són cadenes de glucosa?

Per la geometria de l'enllaç. El $\beta(1\rightarrow4)$ gira cada glucosa 180° respecte de l'anterior i la cadena queda estirada, bona per fer ponts d'hidrogen amb la cadena veïna. L'$\alpha(1\rightarrow4)$ corba la cadena i en surt una hèlix, bona per empaquetar reserva i dolenta per fer una fibra. L'enzim que encaixa en una geometria no encaixa en l'altra.

Mini-PAU resolt

Es donen tres polisacàrids de glucosa. Un no el digerim, un és la reserva de les plantes i un és la reserva del múscul. Poseu el nom, l'enllaç decisiu i el compartiment o el teixit.

El que no digerim és la cel·lulosa, $\beta(1\rightarrow4)$, a la paret vegetal. La reserva de les plantes és el midó (amilosa i amilopectina), $\alpha(1\rightarrow4)$ i, en l'amilopectina, ramificacions $\alpha(1\rightarrow6)$, als plastidis. La reserva del múscul és el glicogen, els mateixos enllaços amb més ramificacions, al citosol. El fet de ser glucosa no decideix la funció. La decideix l'enllaç i el lloc.

1.3 Lípids

Els lípids no es defineixen per un monòmer únic sinó per ser insolubles en aigua i solubles en dissolvents orgànics. Es parteixen en dos grups. Els saponificables porten àcids grassos i, amb una base forta, fan sabó (una sal de l'àcid gras). Els insaponificables no en porten.

Un àcid gras és una cadena hidrocarbonada amb un grup carboxil. Si només té enllaços simples, és saturat i la cadena queda recta; si té un o més dobles enllaços *cis*, és insaturat i fa un colze. A temperatura ambient, els saturats llargs tendeixen a ser sòlids (molts greixos animals) i els insaturats, líquids (molts olis vegetals). Això és una tendència, no una llei absoluta.

El triacilglicerol (triglicèrid) és glicerol amb tres àcids grassos units per enllaços èster. És apolar, es guarda en vacúols o en el teixit adipós i rendeix més del doble d'energia per gram que el glicogen, a més de no retenir aigua. No forma membranes.

El fosfolípid és glicerol amb dos àcids grassos i, al tercer carboni, un fosfat que sovint porta un grup polar (colina, serina, etanolamina). El cap (glicerol + fosfat + grup) és hidròfil; les cues, hidròfobes. La molècula és amfipàtica. En aigua les cues fugen de l'aigua i els caps hi contacten: es forma una bicapa, la base de les membranes. Les ceres són èsters d'un àcid gras i un alcohol llarg; impermeabilitzen fulles, plomes i pèl.




Figura 1.4. Triacilglicerol (tres cues, reserva, apolar) i fosfolípid (dues cues i un cap polar, amfipàtic).

Entre els insaponificables, els esteroides tenen quatre anells fusionats. El colesterol modula la fluïdesa de la membrana animal i és precursor de sals biliars, vitamina D i hormones esteroides (sexuals, cortisol). Els terpens, derivats de l'isoprè, inclouen pigments com el carotè. Ni el colesterol ni els terpens es saponifiquen.

> **Error típic**
>
> Dir que «tots els lípids fan membranes» o que «el colesterol és un greix». El colesterol és un esteroide insaponificable. Qui fa la bicapa són els fosfolípids (i, en arqueus, altres lípids de membrana).

Saponificables i insaponificables

	Porta àcids grassos?	Exemples	Funció a batxillerat
Àcids grassos	ells mateixos	palmític (saturat), oleic (insaturat)	peces dels lípids saponificables; combustible
Triacilglicerols	tres	greixos i olis	reserva. No fan membranes
Fosfolípids	dos, més un fosfat	fosfatidilcolina	bicapa
Ceres	un, unit a un alcohol llarg	cutícula de la fulla	impermeabilitzar

	Porta àcids grassos?	Exemples	Funció a batxillerat
Esteroides	no	colesterol, hormones sexuals, cortisol	membrana i senyal
Terpens	no	carotens, algunes vitamines liposolubles	pigments, precursors

Saponificar és hidrolitzar els èsters amb una base forta i obtenir la sal de l'àcid gras, que és el sabó. Si no hi ha àcid gras, no hi ha sabó: el colesterol és insaponificable encara que sigui un lípid de membrana. Dir «greix» del colesterol és l'error de nomenclatura més habitual.

La fluïdesa de la bicapa puja amb la temperatura i amb els dobles enllaços *cis*, que fan un colze i impedeixen que les cues s'empaquetin. El colesterol fa de tampó: a temperatura alta limita el moviment de les cues i a temperatura baixa evita que es rigiditzin del tot. No és ni «sempre fluidifica» ni «sempre endureix».

Mini-PAU resolt

Tres molècules: A, glicerol amb tres cues saturades; B, glicerol amb dues cues i un fosfat unit a colina; C, quatre anells i una cadena curta, sense àcid gras. Quina fa bicapes, quina és reserva i quina és insaponificable?

B fa bicapes: és un fosfolípid, amfipàtic. A és un triacilglicerol, reserva, apolar, saponificable. C és un esteroide (el colesterol encaixa en aquesta descripció), insaponificable. C modula la membrana però no en forma la bicapa.

Exemple resolt

Per què un gram de triacilglicerol dona més energia que un gram de glicogen, i per què a més no arrossega aigua?

Les cues són hidrocarburs molt reduïts: en oxidar-les s'alliberen més electrons per gram que oxidant un sucre, ja parcialment oxidat. I com que són apolars, no s'hidraten. El glicogen, ple d'OH, reté uns dos grams d'aigua per gram de polisacàrid. La reserva grassa és més lleugera per a la mateixa energia, que és el que li convé a un animal que s'ha de moure.

Exemple resolt

Un oli es posa al frigorífic i es torna tèrbol, mentre un altre continua líquid. Quina diferència d'àcids grassos ho explica, sense convertir-ho en una llei absoluta?

El que es tèrbola té més proporció de cadenes saturades i llargues, que s'empaqueten i solidifiquen abans. El que continua líquid té més insaturacions *cis*. És una tendència: la longitud també hi compta, i una sola mostra no identifica l'espècie vegetal.

Mini-PAU resolt

Un experiment escalfa una membrana i mesura la fluïdesa. Després se'n treu el colesterol i es repeteix a la mateixa temperatura alta. La fluïdesa puja. Quina funció del colesterol, de les dues que té, s'ha vist aquí?

La de limitar el moviment quan la temperatura és alta. L'altra funció, evitar la rigidificació a baixa temperatura, aquest experiment no la mesura: només hi ha una temperatura, i és alta. No es pot concloure que el colesterol «sempre endureix» ni «sempre fluidifica».

Exemple resolt

Un sabó es fa bullint greix amb NaOH. Quines molècules del greix reaccionen, i per què un esteroide de la mateixa mostra no en faria?

Reaccionen els èsters dels triacilglicerols: s'hidrolitzen i l'àcid gras queda com a sal sòdica, el sabó. L'esteroide no té àcid gras esterificat. Es queda a la fracció que no saponifica. La prova fa servir aquest fet per classificar, no per demanar el protocol industrial.

1.4 Proteïnes i l'enllaç peptídic

Els pròtids inclouen aminoàcids, pèptids i proteïnes. Un aminoàcid proteic té un carboni α unit a un H, un grup carboxil, un grup amino i una cadena lateral R. N'hi ha vint de codificats. A pH proper a 7 el carboxil està desprotonat (COO^-, pK_a al voltant de 2) i l'amino protonat (NH_3^+, pK_a al voltant de 9–10): la forma és un zwitterió, amb càrrega neta que depèn també de R. No és correcte dibuixar-los com a NH_2–CHR–COOH a pH fisiològic.




Figura 1.5. Zwitterió d'un aminoàcid i enllaç peptídic. La cadena s'escriu de l'extrem amino a l'extrem carboxil.

L'enllaç peptídic es forma per condensació entre el carboxil d'un aminoàcid i l'amino del següent, i es perd aigua. És un enllaç amida, pla, amb caràcter parcial de doble enllaç: no gira lliurement i el més habitual és la forma trans. La cadena té un extrem N (amino lliure) i un extrem C (carboxil lliure). Per conveni s'escriu N → C. Un oligopèptid té pocs residus; a partir d'unes desenes es parla de polipèptid. «Proteïna» es reserva per a la cadena o el conjunt de cadenes amb estructura tridimensional i funció.

L'estructura primària és la seqüència. La secundària és el plegament local de l'esquelet, estabilitzat per ponts d'hidrogen entre N–H i C=O de l'enllaç peptídic, no entre les cadenes R. A l'hèlix α, el pont uneix el residu i amb el i+4 i la cadena fa una hèlix dextrogira. Al full β, els ponts uneixen trams veïns, paral·lels o antiparal·lels. La terciària és el plegament global d'una cadena: interaccions hidròfobes de les R apolars cap a l'interior (en medi aquós), ponts d'hidrogen, ponts iònics i, si hi ha cisteïnes, ponts disulfur (covalent, –S–S–). La quaternària és l'associació de dues o més cadenes (l'hemoglobina en té quatre). Moltes proteïnes no en tenen.




Figura 1.6. Quatre nivells. Desnaturalitzar desfà el plegament (2a, 3a, 4a). La seqüència es conserva.

La funció depèn de la forma. L'hemoglobina transporta O_2 perquè l'hemo, amb Fe^{2+}, queda col·locat dins el plegament. Els anticossos reconeixen un epítop perquè la regió variable encaixa. El col·lagen fa fibres. Una mutació d'un sol residu pot desfer el plegament o el centre actiu. La desnaturalització (calor, pH extrem,

detergents) perd la funció sense trencar els enllaços peptídics. De vegades, si es treu l'agent, la cadena es replega sola: la informació del plegament és a la seqüència.

Exemple resolt

Una proteïna perd l'activitat a 70 °C i, en refredar-se, no la recupera. S'ha hidrolitzat?

No. La hidròlisi trencaria enllaços peptídics i faria aminoàcids lliures; caldria un enzim o un àcid fort una estona llarga. Aquí s'ha desnaturalitzat. Que no es renaturalitzi només vol dir que el replegament no ha estat espontani en aquelles condicions, no que la primària hagi canviat.

Quin enllaç aguanta cada nivell

Nivell	Què és	Enllaços que el mantenen	Es perd en desnaturalitzar?
Primària	seqüència, escrita N → C	enllaç peptídic (amida, covalent)	no
Secundària	hèlix α i full β	ponts d'hidrogen de l'esquelet, no de les cadenes R	sí
Terciària	plegament d'una cadena	hidròfobs, ponts d'hidrogen i iònics de les R, ponts disulfur	sí; el disulfur només si es redueix
Quaternària	dues o més cadenes	les mateixes interaccions febles, i de vegades disulfur	sí

L'enllaç peptídic és pla perquè el nitrogen i el carbonil comparteixen electrons: té caràcter parcial de doble enllaç i gairebé no gira. El gir del plegament és als enllaços del carboni α. Per això una cadena no és un fil flexible a cada àtom. A pH 7 els extrems són NH_3^+ i COO^-, no NH_2 i COOH. Dibuixar la forma neutra és un error de pH, no de connectivitat.

Entre dos aminoàcids es perd una molècula d'aigua. Un pèptid de n residus té $n - 1$ enllaços peptídics i, en formar-se, ha perdut $n - 1$ aigües. Hidrolitzar-lo les torna. La desnaturalització no hidrolitza: la cadena continua sencera i, si les condicions ho permeten, es pot replegar perquè la informació és a la seqüència.

Mini-PAU resolt

Una proteïna de 100 aminoàcids es bull. Després es mesura i continua essent una sola cadena de 100 residus, però ja no uneix el substrat. Què s'ha trencat i què no?

No s'han trencat els enllaços peptídics: la primària és la mateixa i no han aparegut pèptids petits. S'ha perdut el plegament (secundària, terciària i, si n'hi havia, quaternària) i, amb ell, la forma del centre actiu. És desnaturalització, no hidròlisi.

Exemple resolt

L'hemoglobina té quatre cadenes i un grup hemo amb Fe^{2+} a cadascuna. Quins nivells d'estructura hi són, i el ferro és un aminoàcid?

Hi ha primària, secundària i terciària de cada cadena, i quaternària perquè n'hi ha quatre. El ferro no és un aminoàcid: és part del grup prostètic hemo, no proteic. Sense el Fe^{2+} no uneix O_2, encara que la globina estigui ben plegada. Si el ferro passa a Fe^{3+} (metahemoglobina) tampoc no transporta bé l'oxigen.

Exemple resolt

Dos residus de cisteïna formen un pont disulfur. És un pont d'hidrogen? Es desfà escalfant suaument?

No. És un enllaç covalent –S–S–. Els ponts d'hidrogen es trenquen amb calor moderada o amb urea. El disulfur demana un reductor. Per això algunes proteïnes extracel·lulars, riques en disulfurs, aguanten millor el medi de fora que una proteïna només plegada amb interaccions febles.

Mini-PAU resolt

Un pèptid té 12 aminoàcids. Quants enllaços peptídics té, quantes molècules d'aigua s'han perdut en formar-lo, i quin extrem s'escriu a l'esquerra?

11 enllaços i 11 aigües: sempre un menys que el nombre de residus, perquè cada enllaç uneix dos residus i el primer no s'uneix a un de previ. A l'esquerra, l'extrem amino (N). A la dreta, el carboxil (C). Escriure'l al revés canvia quin residu es considera el primer.

Exemple resolt

La cisteïna i la serina tenen totes dues un grup que pot fer ponts. Per què només les cisteïnes fan un enllaç covalent entre cadenes laterals?

Perquè el grup tiol (–SH) de dues cisteïnes es pot oxidar a disulfur (–S–S–), covalent. El OH de la serina fa ponts d'hidrogen, febles, no un enllaç covalent equivalent en les condicions de la cèl·lula. Per això una proteïna rica en cisteïna pot aguantar condicions que en desfan una de plegada només amb ponts d'hidrogen.

1.5 Enzims

Els enzims són proteïnes (o, en alguns casos, RNA catalític: ribozims) que acceleren una reacció abaixant l'energia d'activació. No desplacen l'equilibri i no es consumeixen: en surten igual que hi han entrat. El substrat es fixa al centre actiu, una butxaca amb una forma i una càrrega complementàries. L'ajust induït precisa la imatge de «clau i pany»: el centre es tanca una mica sobre el substrat. L'especificitat pot ser d'un sol substrat o d'un grup (l'hexocinasa admet diverses hexoses; la glucocinasa, pràcticament només glucosa).

La velocitat creix amb la concentració de substrat fins que els centres estan ocupats: s'arriba a V_{max}. La K_m és la concentració de substrat a la qual la velocitat és la meitat de V_{max}. Una K_m baixa vol dir que l'enzim treballa de pressa ja amb poc substrat; no és «l'afinitat» en sentit estricte en tots els mecanismes, però a batxillerat es llegeix així. La temperatura accelera la reacció fins a l'òptim; per damunt, desnaturalitza. Cada enzim té un pH òptim (la pepsina, àcid; la tripsina, bàsic; molts enzims cel·lulars, prop de 7).

Un inhibidor competitiu s'assembla al substrat i ocupa el centre actiu. Es venç pujant el substrat: V_{max} no canvia i la K_m aparent puja. Un inhibidor no competitiu es lliga a un altre lloc, deforma el centre i baixa V_{max}; el substrat no el desplaça. Els cofactors són ions o molècules no proteiques necessàries per a l'activitat. Si la molècula orgànica queda forta unida, se'n diu grup prostètic (l'hemo). Les vitamines del complex B són, en bona part, precursors de coenzims (la niacina, de NAD^+; la riboflavina, de FAD).

= Idea clau

Regular el metabolisme, a la pràctica, és regular enzims: canviar-ne la quantitat (expressió gènica) o l'activitat (inhibidors, activadors, modificació covalent, efecte al·lostèric). L'al·lostèria, en què una molècula es lliga fora del centre actiu i canvia l'afinitat, és el nivell just de batxillerat; no cal el model de Monod.

+ Per ampliar · no és matèria d'examen

La cinètica de Michaelis-Menten i el gràfic de Lineweaver-Burk no es demanen. Sí que es demana llegir un gràfic velocitat-substrat o velocitat-temperatura i dir què passa amb V_{max} i, si l'enunciat en parla, amb la K_m.

Mini-PAU resolt

Un gràfic mostra la velocitat d'un enzim en funció de la concentració de substrat, i una segona corba obtinguda amb el mateix enzim en presència d'un fàrmac. Les dues corbes arriben al mateix sostre, però la segona necessita més substrat per assolir la meitat d'aquella velocitat màxima. De quin tipus d'inhibició es tracta? Justifiqueu-ho amb el que es llegeix al gràfic.

És una inhibició competitiva. El sostre comú vol dir que la velocitat màxima, V_{max}, no ha canviat: amb prou substrat, l'enzim arriba a la mateixa velocitat que sense fàrmac. El fet que calgui més substrat per arribar a $V_{max}/2$ vol dir que la K_m aparent ha pujat. Això encaixa amb un fàrmac que ocupa el centre actiu i que el substrat pot desplaçar. Si el sostre hagués baixat i no es recuperés en augmentar el substrat, la inhibició no seria competitiva.

Quan llegiu un gràfic, mireu primer si les corbes arriben al mateix sostre. Si la corba amb inhibidor assoleix la mateixa V_{max} però més tard, l'inhibidor és competitiu: ocupa el centre actiu i el substrat el desplaça. Si el sostre

baixa i no es recupera, no és competitiu. La temperatura té un òptim; per damunt, la proteïna es desnaturalitza i la velocitat cau. Això no és una inhibició competitiva.

Mini-PAU resolt

Un enzim digestiu treballa a pH 2 i deixa de fer-ho a pH 8. N'hi ha prou per dir que s'ha desnaturalitzat?

No del tot. A pH 8 pot estar fora de l'òptim i recuperar-se si es torna a pH 2. La desnaturalització implica pèrdua del plegament, sovint irreversible. L'enunciat només diu que a pH 8 no treballa. La pepsina té l'òptim àcid: a pH 8 no és el seu medi.

Tres maneres de fer baixar la velocitat

	On es lliga	V_{max}	K_m aparent	Es reverteix pujant el substrat?
Inhibidor competitiu	centre actiu	igual	puja	sí
Inhibidor no competitiu	un altre lloc	baixa	no canvia, en el model simple	no
Temperatura per damunt de l'òptim	no és un inhibidor: desnaturalitza	cau	—	no; baixar la temperatura no sempre replega la proteïna
pH lluny de l'òptim	canvia càrregues del centre	cau	—	tornar al pH òptim sovint sí, si no s'ha desnaturalitzat

Llegiu el gràfic abans d'escriure el nom. Eix horitzontal: concentració de substrat. Eix vertical: velocitat inicial. Si les dues corbes (amb i sense fàrmac) arriben al mateix sostre, la V_{max} es conserva i l'inhibidor és competitiu. Si el sostre de la corba amb fàrmac és més baix, no ho és. La temperatura no es representa en aquest gràfic: un eix de temperatura dona una campana, amb pujada (més xocs) i caiguda (desnaturalització).

La K_m es llegeix a l'eix horitzontal, a l'altura $V_{max}/2$. No és una velocitat. Una K_m alta vol dir que cal molt substrat per anar a mitja velocitat: a batxillerat es diu que l'afinitat aparent és baixa. L'enzim no «prefereix» res en sentit psicològic; simplement el complex es forma menys a igualtat de concentració.

Mini-PAU resolt

Un enzim té V_{max} = 20 µmol/min. Amb un fàrmac, la corba arriba a 20 però la meitat d'aquesta velocitat s'assoleix a una concentració de substrat triple. De quin tipus és el fàrmac, i què ha passat amb la K_m?

Competitiu. La V_{max} no ha canviat. La K_m aparent s'ha multiplicat per tres, perquè la meitat de V_{max} ara demana el triple de substrat. Pujar encara més el substrat acabaria desplaçant el fàrmac del centre actiu.

Exemple resolt

La pepsina treballa a pH 2 i la tripsina a pH 8. Es pot concloure que a pH 8 la pepsina s'ha hidrolitzat?

No. A pH 8 està fora de l'òptim: les càrregues del centre actiu no són les que reconeixen el substrat. Pot continuar sencera. La hidròlisi seria trencar enllaços peptídics, que no és el que fa un canvi de pH d'un experiment curt. Si en tornar a pH 2 recupera l'activitat, no s'havia desnaturalitzat de manera irreversible.

Exemple resolt

El NAD^+ és un coenzim de moltes deshidrogenases i prové de la niacina. És una proteïna? Es consumeix a la reacció?

No és una proteïna: és un dinucleòtid, una molècula orgànica petita. La deshidrogenasa sí que és la proteïna. El NAD^+ no es consumeix en el sentit d'un substrat que desaparegui del metabolisme: es redueix a NADH i una altra reacció el torna a oxidar. Dins d'una sola reacció, sí que és un substrat secundari; al cicle, es regenera. Per això se'n diu coenzim i no aliment.

Mini-PAU resolt

Dues corbes de velocitat contra temperatura arriben al màxim a 37 °C i cauen a 60 °C. Una és amb inhibidor competitiu i l'altra sense, a la mateixa concentració de substrat, no saturant. La corba amb inhibidor queda per sota, però totes dues cauen a 60 °C. La caiguda a 60 °C és inhibició competitiva?

No. La caiguda per sobre de l'òptim és desnaturalització: es perd el plegament. Li passa a les dues corbes. L'inhibidor competitiu explica que, a 37 °C i substrat no saturant, la velocitat sigui més baixa; no explica la caiguda tèrmica. Són dues causes en el mateix gràfic i s'han de separar.

Exemple resolt

Un enzim amb una K_m de 2 mmol/L i un altre amb una K_m de 0,1 mmol/L treballen a 0,1 mmol/L de substrat. Quin va més a prop de la meitat de la seva V_{max}?

El de K_m 0,1: a una concentració igual a la K_m, la velocitat és la meitat de V_{max}. L'altre, amb el substrat vint vegades per sota de la seva K_m, va molt per sota de la meitat. «K_m baixa» vol dir que n'hi ha prou amb poc substrat, no que l'enzim sigui més ràpid en valor absolut: això ho diu la V_{max}.

Mini-PAU resolt

Sense inhibidor, la V_{max} és 100 i la K_m és 5 mmol/L. Amb un inhibidor, la V_{max} continua essent 100 i la concentració que dona velocitat 50 passa a 20 mmol/L. De quin tipus és, i què ha passat amb l'afinitat aparent?

Competitiu. La K_m aparent ha passat de 5 a 20, quatre vegades més alta: cal més substrat per arribar a la meitat de la velocitat, que és la definició operativa de menys afinitat aparent. La V_{max} no ha canviat, de manera que a substrat molt alt el fàrmac es desplaça. Si la V_{max} hagués baixat a 40, no seria competitiu.


1.6 Àcids nucleics: estructura

Un nucleòtid és tres peces: una pentosa, una base nitrogenada i un, dos o tres fosfats. La pentosa del DNA és la desoxiribosa (sense OH al carboni 2′); la de l'RNA és la ribosa. Les bases púriques són adenina (A) i guanina (G), de dos anells. Les pirimidíniques són citosina (C), timina (T, pròpia del DNA) i uracil (U, propi de l'RNA). El nucleòsid és pentosa + base, sense fosfat. Els nucleòtids s'uneixen per enllaços fosfodièster entre el C3′ d'un sucre i el fosfat del C5′ del següent. La cadena té polaritat: un extrem 5′ (fosfat lliure) i un extrem 3′ (OH lliure).

El DNA cel·lular és una doble hèlix (forma B, la habitual). Les cadenes són antiparal·leles: una va 5′→3′ i l'altra 3′→5′. Les bases s'aparellen per complementarietat i ponts d'hidrogen: A amb T (dos ponts) i G amb C (tres ponts). Per això, en un DNA de doble cadena, A = T i G = C (regles de Chargaff), i el percentatge de G+C no té per què ser el 50 %. L'hèlix és dextrogira, fa uns 10–10,5 parells per volta, el pas entre bases és d'uns 0,34 nm i el diàmetre, d'uns 2 nm. Les bases hidròfobes queden a l'interior; els fosfats, carregats negatius, a l'exterior.

Nucleòtid i aparellament

dAMP: desoxiadenosina 5′-monofosfat



Aparellament

5′– A ⋯ T –3′

dos ponts d'hidrogen

3′– T ⋯ A –5′

5′– G ≡ C –3′

tres ponts d'hidrogen

3′– C ≡ G –5′

Figura 1.7. Nucleòtid i doble hèlix antiparal·lela. A–T fa dos ponts d'hidrogen; G–C, tres.

L'RNA sol ser de cadena simple, amb ribosa i U en lloc de T. Es pot plegar sobre si mateix (l'RNAt en fa una forma de trèvol, amb un anticodó). Els tipus que cal distingir —missatger, de transferència i ribosòmic— es tracten al tema 5. Aquí n'hi ha prou per reconèixer la molècula: si veieu desoxiribosa i timina, és DNA; si veieu ribosa i uracil, és RNA.

Exemple resolt

Un DNA de doble cadena té un 22 % d'adenina. Quin percentatge de guanina té? Escriviu el raonament.

En una doble cadena, l'adenina s'aparella amb la timina i la guanina amb la citosina, de manera que A = T i G = C. Si A és el 22 %, T també és el 22 %, i entre les dues sumen el 44 %. El 56 % restant correspon a G i C a parts iguals, i per tant G = 28 % i C = 28 %. No es pot respondre 22 %: això seria confondre la parella A–T amb la parella G–C. El càlcul no valdria si la dada fos d'una sola cadena o d'un RNA.

Què hi ha en un nucleòtid, i què no

Un nucleòtid és tres peces unides per enllaços covalents: una base nitrogenada, un sucre de cinc carbonis i un, dos o tres fosfats. Al DNA el sucre és la desoxiribosa (li falta l'OH del carboni 2′) i les bases són A, T, G i C. A l'RNA el sucre és la ribosa i la base T se substitueix per U. La base es lliga al C1′ del sucre i el fosfat al C5′. L'enllaç entre nucleòtids de la cadena és fosfodièster: el fosfat del C5′ d'un nucleòtid amb l'OH del C3′ de l'anterior. Per això la cadena té un extrem 5′ (fosfat lliure) i un extrem 3′ (OH lliure), i creix afegint nucleòtids al 3′.

Les dues cadenes del DNA són antiparal·leles. Si una va 5′→3′ d'esquerra a dreta, l'altra va 5′→3′ de dreta a esquerra. Les bases s'aparellen per ponts d'hidrogen: A–T en fa dos, G–C en fa tres. Per això un DNA ric en G–C costa més de separar. Les regles de Chargaff en un DNA de doble cadena diuen A = T i G = C, i A + G = T + C = 50 %. En un RNA o en una cadena sola, això no s'ha de complir.

	DNA	RNA
Sucre	desoxiribosa	ribosa
Bases	A, T, G, C	A, U, G, C
Cadenes, en general	dues, antiparal·leles	una
Funció	arxiu	còpia de treball (RNAm), adaptador (RNAt), ribosoma (RNAr)

Mini-PAU resolt

En un DNA de doble cadena, l'adenina és el 22 % de les bases. Calculeu el percentatge de T, de G i de C.

T = A = 22 %. A + T = 44 %. El 56 % restant es reparteix a parts iguals entre G i C, perquè G = C. G = 28 % i C = 28 %. La comprovació: 22 + 22 + 28 + 28 = 100. Si l'enunciat hagués dit «una cadena» i no «el DNA», no es podria fer aquest càlcul.

Exemple resolt

La cadena motlle d'un tram és 3′–TAGC–5′. Escriviu la cadena complementària de DNA i digueu en quin sentit la llegiu.

La complementària és 5′–ATCG–3′. S'escriu en el sentit 5′ → 3′, que és com creix. A amb T, G amb C, i els extrems invertits perquè les cadenes són antiparal·leles. Si es demana l'RNA copiat d'aquest motlle, seria 5′–AUCG–3′: igual que la complementària de DNA però amb U en lloc de T.

Exemple resolt

L'ATP i un nucleòtid del DNA comparteixen l'adenina. Per què l'ATP no és una peça del DNA?

Perquè el sucre de l'ATP és ribosa, no desoxiribosa, i perquè porta tres fosfats. El nucleòtid que s'incorpora al DNA és un desoxiribonucleòtid trifosfat (dATP, dTTP, dGTP o dCTP): en entrar-hi perd dos fosfats i queda un sol fosfat a l'esquelet. L'ATP del metabolisme és ribonucleòtid i la cèl·lula el fa servir per la hidròlisi dels fosfats, no com a lletra del DNA.

Mini-PAU resolt

Un DNA de doble cadena té un 30 % de guanina. Sense cap altra dada, es pot saber el percentatge d'adenina? I si la dada fos d'un RNA missatger?

Sí per al DNA: G = C = 30 %, A + T = 40 %, i A = T, de manera que A = 20 % i T = 20 %. No per a l'RNAm: és una sola cadena i Chargaff no s'hi aplica. Un 30 % de G en un RNA no diu res de l'A.

Exemple resolt

Per què un DNA ric en parelles G–C es desnaturalitza a una temperatura més alta que un de ric en A–T?

Perquè G–C fa tres ponts d'hidrogen i A–T en fa dos. Separar les cadenes costa més com més ponts hi ha. La PCR ho aprofita: la temperatura d'hibridació es tria segons la seqüència dels encebadors. No és que l'enllaç fosfodièster sigui diferent; els covalents de l'esquelet no es trenquen en desnaturalitzar el DNA.

Un problema de composició es resol sempre en el mateix ordre, i només si el DNA és de doble cadena. Es escriu A = T i G = C. Si donen un percentatge, el de la parella és el mateix, i el que queda es parteix per la meitat entre l'altra parella. La comprovació és que els quatre sumin 100. Si donen una cadena sola, o un RNA, no es fa aquest càlcul: es diu que no es pot, i això ja és la resposta.

Mini-PAU resolt

Cadena 5′–ATCCG–3′ d'un DNA. Escriviu la complementària en 5′→3′, i l'RNAm si aquesta cadena fos la codificant.

La complementària, antiparal·lela, és 3′–TAGGC–5′, que en el sentit 5′→3′ s'escriu 5′–GGCTA–3′. Si la cadena donada és la codificant, l'RNAm s'hi assembla: 5′–AUCCG–3′. Si fos el motlle, l'RNAm seria el complement amb U: 5′–CGGAU–3′. La pregunta decideix quin dels dos papers té la cadena. No es pot contestar sense llegir la paraula «codificant» o «motlle».

1.7 Mapa del tema




Figura 1.8. Les quatre funcions que les orientacions demanen de relacionar amb els grups: energia, estructura, regulació i informació.

Resum

Grup	Peça clau	Enllaç típic	Funció que cal saber dir
Aigua i sals	H_2O polar; ions	pont d'hidrogen; iònic	dissolvent, tèrmica, osmòtica; cofactors
Glúcids	monosacàrid (glucosa)	glicosídic α o β	energia (midó, glicogen); estructura (cel·lulosa)
Lípids saponificables	àcid gras + glicerol	èster	reserva (triacilglicerol); membrana (fosfolípid)
Esteroides	quatre anells	no saponificable	membrana animal, hormones
Proteïnes	aminoàcid	peptídic	enzims, transport, estructura, defensa

Grup	Peça clau	Enllaç típic	Funció que cal saber dir
Àcids nucleics	nucleòtid	fosfodièster; ponts d'H	informació (DNA) i expressió (RNA)

Errors típics a la PAU

- Dibuixar l'aminoàcid sense càrregues a pH 7, o posar el mateix nombre de ponts d'hidrogen a A–T i a G–C.
- Confondre desnaturalització (es perd el plegament) amb hidròlisi (es trenquen enllaços peptídics).
- Dir que l'enzim es gasta o que canvia l'equilibri de la reacció.
- Assignar la cel·lulosa a la reserva o el glicogen a la paret vegetal.
- Anomenar «greix» el colesterol, o dir que tots els lípids són amfipàtics.
- Llegir el pH com una escala lineal.

Glossari

Amfipàtic
: Molècula amb una part hidròfila i una part hidròfoba, com el fosfolípid.

Carboni anomèric
: Carboni del monosacàrid cíclic que prové del carbonil; defineix l'anòmer α o β.

Enllaç glicosídic
: Enllaç èter entre monosacàrids, format per condensació.

Enllaç peptídic
: Enllaç amida entre el carboxil d'un aminoàcid i l'amino del següent.

Zwitterió
: Forma de l'aminoàcid amb COO^- i NH_3^+ alhora.

K_m
: Concentració de substrat a la qual la velocitat és $V_{max}/2$.

Inhibidor competitiu
: Competeix pel centre actiu; no baixa la V_{max} si el substrat és prou alt.

Fosfodièster
: Enllaç entre el C3′ d'un nucleòtid i el fosfat unit al C5′ del següent.

Autoavaluació

1. El gel sura sobre l'aigua líquida d'un llac. Expliqueu, a partir de l'estructura de la molècula d'aigua, per què la densitat del gel és menor que la del líquid, i quina conseqüència té aquest fet per als organismes que viuen al llac a l'hivern.

   L'aigua és una molècula angular i polar: l'oxigen, més electronegatiu, queda amb càrrega parcial negativa ($\delta-$) i cada hidrogen amb càrrega parcial positiva ($\delta+$). Entre l'hidrogen d'una molècula i l'oxigen d'una altra s'estableixen ponts d'hidrogen. En el gel aquests ponts s'ordenen en una xarxa oberta, amb més espai buit entre molècules que en el líquid, on els ponts es trenquen i es refan i les molècules s'acosten més. Per això el gel és menys dens i sura. La capa de gel queda a la superfície, aïlla l'aigua de sota i en frena el refredament, de manera que el fons del llac pot continuar líquid i habitable.

2. Una molècula està formada per glicerol, dos àcids grassos i un grup fosfat. A quin grup de biomolècules pertany? Justifiqueu-ho i digueu quina estructura cel·lular pot formar i per què.

   És un fosfolípid, és a dir un lípid saponificable, perquè conté àcids grassos units per enllaços èster. És amfipàtic: les dues cues hidrocarbonades són hidròfobes i el cap, format pel glicerol i el fosfat, és hidròfil. En medi aquós les cues s'amaguen de l'aigua i els caps hi contacten, i el resultat estable és una bicapa. Aquesta bicapa és la base estructural de les membranes cel·lulars. No és un triacilglicerol, que porta tres àcids grassos, és apolar i serveix de reserva, no de membrana.

3. Per què la sacarosa no redueix el reactiu de Fehling i la maltosa sí? Raoneu-ho a partir de l'enllaç glicosídic de cadascuna, sense limitar-vos a dir el nom del disacàrid.

   Un sucre redueix el reactiu de Fehling si conserva un carboni anomèric lliure, capaç d'obrir l'anell i mostrar el grup carbonil. A la sacarosa l'enllaç glicosídic uneix el carboni anomèric de la glucosa amb el de la fructosa (enllaç $\alpha1\leftrightarrow\beta2$): els dos anomèrics queden ocupats i la molècula no pot obrir-se, de manera que no redueix. A la maltosa l'enllaç és $\alpha(1\rightarrow4)$: el C1 d'una glucosa queda unit al C4 de l'altra, però l'anomèric de la segona glucosa continua lliure. Aquest carboni pot obrir l'anell i reduir el reactiu. La diferència no és la mida del disacàrid, sinó quin carboni queda lliure.


4. Quan es desnaturalitza una proteïna, quines interaccions es perden i quina es conserva? Distingiu la desnaturalització de la hidròlisi i relacioneu-ho amb els nivells d'estructura.

   La desnaturalització desfà el plegament: es perden els ponts d'hidrogen de l'estructura secundària i les interaccions de la terciària i, si n'hi ha, de la quaternària (ponts d'hidrogen, interaccions iòniques i hidròfobes entre cadenes laterals; els ponts disulfur només es trenquen si el tractament és reductor). La seqüència, és a dir l'estructura primària, es conserva, perquè els enllaços peptídics són covalents i no es trenquen amb calor o amb un canvi de pH moderat. La hidròlisi seria una altra cosa: trencaria els enllaços peptídics i alliberaria aminoàcids o pèptids curts. Una proteïna desnaturalitzada pot haver perdut la funció sense que la cadena s'hagi tallat.

5. Un DNA de doble cadena té un 30 % de guanina. Calculeu el percentatge d'adenina, de timina i de citosina. Escriviu el raonament, no només el resultat.

   En una doble cadena, les bases s'aparellen: l'adenina amb la timina i la guanina amb la citosina. Per les regles de Chargaff, A = T i G = C. Si la guanina és el 30 %, la citosina també és el 30 %, i entre les dues sumen el 60 %. El 40 % restant correspon a la parella A–T i es reparteix a parts iguals, de manera que A = 20 % i T = 20 %. La comprovació és 20 + 20 + 30 + 30 = 100. Aquest càlcul només val per a DNA de doble cadena. En un RNA d'una sola cadena, el percentatge d'una base no determina el de les altres.

6. S'ha mesurat la velocitat de reacció d'un enzim en funció de la concentració de substrat, en absència i en presència d'un fàrmac (gràfic). D'entre els tipus d'inhibició enzimàtica que coneixeu, quin podria ser el que provoca aquest fàrmac? Justifiqueu la resposta a partir del gràfic.



El fàrmac provoca una inhibició no competitiva. Al gràfic, la corba sense fàrmac s'acosta a un sostre alt: aquesta és la velocitat màxima, V_{max}, que s'assoleix quan el centre actiu està saturat de substrat. La corba amb fàrmac també s'aplana, però el sostre és clarament més baix, i afegir més substrat no el fa pujar fins al de la corba verda. Això vol dir que el fàrmac no es desplaça del tot augmentant el substrat. Un inhibidor competitiu ocuparia el centre actiu i es podria desplaçar amb prou substrat: la V_{max} es conservaria i només caldria més substrat per arribar-hi. Aquí la V_{max} baixa, de manera que una part de les molècules d'enzim queden inactives encara que hi hagi substrat de sobres. Això encaixa amb un inhibidor que es lliga fora del centre actiu i deforma el catalitzador. No es tracta de desnaturalització per temperatura: el gràfic no és una campana en funció de la temperatura, sinó dues hipèrboles en funció del substrat.

2. La cèl·lula

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU

El cicle cel·lular, la mitosi, la meiosi i la comparació de les dues divisions són saber de 2n, al bloc de genètica i cicle cel·lular. També ho és la reproducció dels procariotes per bipartició, i el lligament i la recombinació (es lliguen amb el tema 4).

La teoria cel·lular, la membrana, el transport, l'osmosi i els orgànuls són saber de 1r. Les orientacions avisen que estan imbricats amb els de 2n: gairebé cada pregunta de metabolisme demana «on» passa la via, i això és un orgànul. Aquí es tracten al nivell que la prova fa servir, no com un catàleg de microscòpia.

2.1 Teoria cel·lular i microscòpia

La teoria cel·lular, tancada al segle XIX, diu tres coses: tot ésser viu està fet d'una o més cèl·lules; la cèl·lula és la unitat estructural i funcional de la vida; tota cèl·lula prové d'una altra cèl·lula. Els virus, els viroides i els prions queden fora: no tenen estructura cel·lular ni metabolisme propi.

El microscopi òptic fa servir llum i lents. El poder de resolució —la distància mínima per veure dos punts separats— és, en la pràctica, d'uns 0,2 µm. N'hi ha prou per a cèl·lules i bacteris grans, no per a virus ni per a la bicapa. El microscopi electrònic fa servir un feix d'electrons i resol nanòmetres: permet la ultraestructura (membranes, ribosomes). Les mostres d'electrons van fixades, deshidratades i, si cal, contrastades amb metalls pesants; no s'hi veu una cèl·lula viva. Confondre «més augments» amb «més resolució» és un error: els augments buits no separen dos punts que l'instrument no pot distingir.

Exemple resolt · augments

Un bacteri fa 8 mm a la fotografia i la barra d'escala diu que 5 mm corresponen a 1 µm. Quina mida real té?

Millor no fiar-se dels mil·límetres de la pantalla i usar l'escala: 8 mm de foto / 5 mm per µm = 1,6 µm. Si l'enunciat dona els augments (per exemple ×4000) i la mida a la foto (8 mm), la mida real és 8 mm / 4000 = 0,002 mm = 2 µm. Unitats: 1 mm = 10^3 µm = 10^6 nm; 1 Å = 0,1 nm.

La teoria cel·lular, en la forma que es demana, té tres afirmacions i no s'han de barrejar amb la teoria endosimbiòtica. Primera: tot ésser viu està fet d'una o més cèl·lules. Segona: la cèl·lula és la unitat mínima amb les propietats de la vida (nutrició, relació, reproducció). Tercera: tota cèl·lula ve d'una altra cèl·lula. La tercera tomba la generació espontània. No diu res, encara, de mitocondris ni de cloroplasts.

El microscopi òptic fa servir llum i arriba, en la pràctica de batxillerat, a uns 0,2 µm: s'hi veu el nucli, la paret, els cloroplasts i el contorn d'un bacteri, no la bicapa ni els ribosomes. L'electrònic fa servir electrons i resol membranes, ribosomes i virus. Augmentar (els augments) no és el mateix que resoldre (distingir dos punts pròxims). Una foto borrosa molt ampliada continua sense mostrar el ribosoma.

	Òptic	Electrònic
Radiació	llum visible	feix d'electrons
Límit orientatiu	~0,2 µm	nanòmetres
Es veu	nucli, mitosi, cloroplasts, bacteris	membranes, ribosomes, virus, porus
Mostra	pot ser viva (contrast de fase)	fixada i al buit, en el microscopi de transmissió clàssic

Exemple resolt

Un virus de 100 nm es pot veure amb l'òptic de l'institut, que resol 0,2 µm?

No. 0,2 µm són 200 nm. El virus és més petit que el límit. Es veu amb l'electrònic. Un bacteri de 2 µm = 2000 nm sí que entra a l'òptic, com un punt o un bastonet, sense detalls interns.

Mini-PAU resolt

Una micrografia mostra membranes internes, una doble membrana externa i uns grànuls foscos d'uns 20 nm enganxats a una membrana. Quin microscopi és, i què són els grànuls?

Electrònic: l'òptic no resol 20 nm ni el gruix d'una membrana. Els grànuls enganxats a una membrana són ribosomes, i la membrana amb ribosomes és el reticle rugós. Si la doble membrana envolta un orgànul amb crestes, és un mitocondri; si envolta el material genètic, és el nucli.

Mini-PAU resolt

Es diu que «la cèl·lula és la unitat anatòmica, fisiològica i d'origen». Traduïu cada adjectiu a una frase que no sigui un eslògan.

Anatòmica: tot viu està fet de cèl·lules. Fisiològica: les funcions vitals es fan en una cèl·lula o en un conjunt de cèl·lules, i no hi ha res de viu més simple. D'origen: tota cèl·lula ve d'una altra. Les tres juntes són la teoria cel·lular. Cap no diu que tots els orgànuls tinguin membrana.

Exemple resolt

Una foto d'un nucli està feta a 1.000 augments amb un òptic i es veu borrós el límit. Pujar a 5.000 augments amb el mateix aparell mostrarà els porus nuclears?

No. Els augments amplien la imatge que l'objectiu ja ha resolt. El límit de l'òptic és al voltant de 0,2 µm, i un porus és més petit. Cal un electrònic. Més zoom sobre una imatge borrosa continua sent borrosa.

2.2 Procariotes i eucariotes

Els procariotes (bacteris i arqueus) no tenen nucli: el DNA és circular, està al nucleoide i no va dins un embolcall. No tenen orgànuls limitats per membrana. Els ribosomes són 70S. La paret dels bacteris porta peptidoglicà; la dels arqueus, no. Poden tenir càpsula, fímbries, pilus i flagel de tubulina diferent de l'eucariota. El DNA extra pot anar en plasmidis. Es divideixen per bipartició: el DNA es replica, la cèl·lula s'allarga i es parteix. No hi ha mitosi ni fus.

Els eucariotes tenen nucli amb DNA lineal associat a histones, ribosomes 80S al citosol i un sistema d'endomembranes. La paret, si n'hi ha, és de cel·lulosa (plantes), quitina (fongs) o altres polímers; els animals no en tenen. Dins el grup eucariota cal separar la cèl·lula animal de la vegetal.




Figura 2.1. Procariota: nucleoide, sense orgànuls membranosos. Eucariota: nucli delimitat i compartiments.

Idea clau

«Procariota» no vol dir «bacteri». Els arqueus també són procariotes i filogenèticament queden més a prop dels eucariotes que dels bacteris en la maquinària de replicació i transcripció. El detall és al tema 7.

Procariota i eucariota, costat a costat

	Procariota	Eucariota
Nucli	no: DNA al nucleoide	sí, amb embolcall i porus
DNA	circular, un cromosoma principal	lineal, diversos cromosomes, amb histones
Orgànuls amb membrana	no	sí (mitocondri, reticle, Golgi…)
Ribosomes	70S	80S al citosol; 70S a mitocondris i cloroplasts
Paret	peptidoglicà (bacteris); sense, en arqueus	cel·lulosa, quitina o cap (animals)
Divisió	bipartició	mitosi; meiosi per als gàmetes

Un bacteri de 2 µm i una cèl·lula hepàtica de 20 µm no es diferencien només per la mida. La cèl·lula eucariota compartimenta: la cadena respiratòria no neda pel citosol, és a la membrana interna del mitocondri. Per això les preguntes de la PAU que demanen «on» són preguntes de biologia cel·lular, no un detall opcional.

Exemple resolt

Una cèl·lula té DNA circular, ribosomes 70S i paret sense peptidoglicà. És un bacteri?

No necessàriament. Encaixa amb un arqueu: procariota, però sense peptidoglicà. Un bacteri típic sí que en porta. Els mitocondris també tenen DNA circular i ribosomes 70S, però no són cèl·lules lliures ni tenen paret.

La diferència que la prova vol no és «el bacteri és petit». És la compartimentació. Sense embolcall nuclear, la transcripció i la traducció poden anar alhora al mateix lloc. Amb nucli, l'RNA s'ha de madurar i sortir. Sense mitocondri, la cadena respiratòria dels bacteris és a la membrana plasmàtica, no en un orgànul. Els ribosomes 70S (subunitats 50S i 30S) són els del bacteri, del mitocondri i del cloroplast. Els 80S (60S i 40S) són els del citosol eucariota. Els números no se sumen: 50 + 30 no fan 80 perquè el nom és un coeficient de sedimentació, no una massa que s'addicioni així.

La teoria endosimbiòtica explica per què el mitocondri i el cloroplast semblen bacteris per dins: doble membrana, DNA circular propi, ribosomes 70S i divisió autònoma. Un bacteri aerobi seria l'origen del mitocondri; un cianobacteri, el del cloroplast. No explica l'origen del nucli ni del reticle. I no vol dir que un mitocondri actual sigui un bacteri lliure: ha perdut la majoria dels gens, que són al nucli.

Mini-PAU resolt

Una cèl·lula té DNA lineal amb histones, ribosomes 80S al citosol i també orgànuls amb DNA circular i ribosomes 70S. És un bacteri?

No. El DNA lineal amb histones i els ribosomes 80S són d'eucariota. Els orgànuls amb DNA circular i ribosomes 70S són mitocondris o cloroplasts, la resta de l'endosimbiosi. Un bacteri no té alhora ribosomes 80S i orgànuls membranosos.

Exemple resolt

Per què un antibiòtic que bloqueja el ribosoma 70S pot matar un bacteri i, a dosis altes o amb mala entrada, també fer malbé mitocondris, però no atura directament el ribosoma del citosol humà?

Perquè el ribosoma citosòlic humà és 80S i l'antibiòtic no l'encaixa. El del mitocondri sí que és 70S, hereu bacterià. El efecte útil és sobre el bacteri; el efecte tòxic, si n'hi ha, s'explica pels mitocondris, no perquè «totes les cèl·lules tenen el mateix ribosoma».

Mini-PAU resolt

Ordeneu de petit a gran, amb un motiu: ribosoma 80S, virus típic, bacteri, mitocondri, cèl·lula animal. Qui es veu amb l'òptic?

Virus (desenes o un centenar de nm), ribosoma (uns 20–30 nm), mitocondri (al voltant d'1 µm, el límit), bacteri (1–5 µm), cèl·lula animal (10–30 µm és un ordre habitual). Amb l'òptic es veuen la cèl·lula, el bacteri i, just, el mitocondri com un gràsnul. El virus i el ribosoma, no.

Exemple resolt

Un llibre diu que els arqueus són bacteris antics. Quina correcció de domini cal fer?

Són procariotes, no bacteris. El domini Archaea és a part de Bacteria. Comparteixen l'absència de nucli i se separen per la paret, els lípids i la maquinària genètica, més propera a la dels eucariotes. «Bacteri» per a tot el que no té nucli és l'error que les orientacions volen evitar.

2.3 La membrana: mosaic fluid

Singer i Nicolson (1972) van descriure la membrana com un mosaic fluid. La base és una bicapa de fosfolípids: caps polars cap a l'aigua (citosol i medi extern), cues d'àcid gras cap a l'interior. Les proteïnes integrals travessen la bicapa; les perifèriques s'hi adhereixen per una cara. Els lípids i bona part de les proteïnes es desplacen de costat: la membrana no és una paret rígida. El moviment flip-flop (passar d'una capa a l'altra) és rar sense enzims.

A les membranes animals el colesterol s'intercala entre les cues i n'esmorteeix la fluïdesa: l'abaixa si fa calor i evita que la membrana es geli si fa fred. El glicocàlix —oligosacàrids units a lípids i a proteïnes de la cara externa — intervé en el reconeixement (grups sanguinis, identitat cel·lular). La cara externa i la interna no són iguals: la membrana és asimètrica.




Figura 2.2. Mosaic fluid. Dalt, el medi extracel·lular; baix, el citoplasma. Bicapa de fosfolípids, proteïnes integrals, perifèriques i en hèlix α, glicoproteïnes, glicolípids, colesterol i filaments del citoesquelet.

El mosaic fluid, tal com es demana, té una bicapa de fosfolípids i proteïnes que s'hi mouen de costat, no una paret rígida de proteïna coberta de lípid. Els lípids fan la barrera. Les proteïnes fan gairebé totes les feines: canals, transportadors, receptors, enzims, unions. El glicocàlix (cadenes de sucre de glicoproteïnes i glicolípids, cap a fora) és reconeixement. El colesterol, a les cèl·lules animals, modula la fluïdesa. El citoesquelet, per dins, ancora algunes proteïnes i dona forma.

Integral vol dir que travessa la bicapa o hi està enfonsada: per treure-la cal desfer la membrana amb detergent. Perifèrica vol dir que és a una cara, unida per interaccions febles a un cap de fosfolípid o a una proteïna integral, i se'n va amb un canvi de sal. Les dues són proteïnes de membrana. No són «una de lípid i una de proteïna».

Peça	On és al dibuix	Funció
Cues dels fosfolípids	interior de la bicapa	barrera hidròfoba
Caps polars	les dues cares	contacte amb l'aigua
Proteïna integral	travessa la bicapa	canal o transportador
Proteïna perifèrica	una cara	suport, senyal, citoesquelet
Glicolípid i glicoproteïna	cara externa	identitat de la cèl·lula
Colesterol	entre les cues, en animals	tampó de fluïdesa

Exemple resolt

Una cèl·lula es posa a 10 °C i la membrana es torna massa rígida. Quins dos canvis de composició, no de temperatura, la farien més fluida?

Més àcids grassos insaturats (els colzes *cis* impedeixen l'empaquetament) i cues més curtes. El colesterol, a baixa temperatura, també evita la gelificació, però a la resposta de batxillerat el que es valora primer és la insaturació. Pujar la temperatura també fluidifica, però l'enunciat demana composició.

Mini-PAU resolt

Per què la glucosa no travessa sola la bicapa, si és una molècula petita, i l'O_2 sí?

L'O_2 és apolar i petit: es dissol a les cues i passa per difusió simple. La glucosa té molts OH, és polar, i les cues hidròfobes la frenen. Necessita un transportador (GLUT, difusió facilitada, a favor de gradient). Que sigui petita no basta: el criteri és la polaritat.

Mini-PAU resolt

Es renta una membrana amb una dissolució salina i se'n desprenen unes proteïnes. Després cal un detergent per desprendre'n unes altres. Quines són perifèriques i quines integrals?

Les que surten amb sal són perifèriques: estaven unides per interaccions iòniques o ponts d'hidrogen. Les que necessiten detergent són integrals: travessen o s'enfonsen a la bicapa, i el detergent dissol les cues. El detergent no «talla» la proteïna; li treu l'entorn lipídic.

Exemple resolt

El glicocàlix es troba a la cara externa, no a la citosòlica. Quina conseqüència té això per al reconeixement entre cèl·lules?

Els sucres que identifiquen la cèl·lula miren cap a les altres cèl·lules i cap al medi, que és on hi ha els receptors que els han de llegir. A la cara de dins no servirien per a aquest diàleg. La asimetria de la membrana és funcional, no decorativa.

2.4 Transport i osmosi

La bicapa deixa passar per difusió simple les molècules petites i apolars (O_2, CO_2, N_2) i, poc, l'aigua. No deixa passar ions ni molècules polars grans com la glucosa. La difusió facilitada fa servir canals o transportadors i va a favor de gradient: no gasta ATP. La glucosa entra a moltes cèl·lules per transportadors GLUT, a favor de gradient.

El transport actiu va en contra de gradient i gasta energia, gairebé sempre ATP. La bomba Na^+/K^+ ATPasa treu 3 Na^+ i entra 2 K^+ per cada ATP. Manté el potencial de membrana i el gradient que després fan servir altres transportadors (el simport de glucosa a l'intestí, que aprofita l'entrada de Na^+).

Les partícules grosses no travessen la bicapa. L'endocitosi tanca un tros de membrana cap endins: fagocitosi (sòlids, com un macròfag), pinocitosi (gotes) o endocitosi mediada per receptor (específica, com la del colesterol-LDL). L'exocitosi fusiona una vesícula amb la membrana i aboca el contingut a fora. Totes dues gasten energia i mouen tros de membrana.

L'osmosi és la difusió neta d'aigua a través d'una membrana semipermeable, cap al costat on la concentració de solut és més alta (on el potencial hídric és més baix). En un medi hipotònic (poc solut fora) l'aigua entra: la cèl·lula animal s'infla i pot lisar-se; la vegetal es posa turgent i la paret n'atura el trencament. En un medi hipertònic l'aigua surt: l'animal es crenela; la vegetal es plasmolitza (la membrana se separa de la paret). En un medi isotònic no hi ha flux net. Els procariotes amb paret es comporten, davant l'osmosi, més com la vegetal que com l'animal: la paret limita l'entrada d'aigua.

Mini-PAU resolt

Una cèl·lula vegetal es plasmolitza. El medi extern és hipotònic o hipertònic? Per on ha circulat l'aigua?

Hipertònic: hi ha més solut fora, l'aigua surt de la cèl·lula i el protoplast es desenganxa de la paret. Si el medi fos hipotònic, la cèl·lula es posaria turgent.

Cada transport, amb el seu gradient

Tipus	Proteïna?	Gradient	ATP directe?	Exemple
Difusió simple	no	a favor	no	O_2, CO_2, N_2, etanol
Difusió facilitada	canal o transportador	a favor	no	glucosa per GLUT, ions per un canal obert
Actiu primari	bomba	en contra	sí	bomba Na^+/K^+
Actiu secundari	cotransportador	un solut en contra, pagat pel gradient d'un altre	no en el mateix pas; la bomba sí que n'ha gastat abans	glucosa amb Na^+ a l'intestí
Endocitosi i exocitosi	vesícules	—	sí, en el conjunt	fagocitosi, secreció

L'osmosi és el pas d'aigua a través d'una membrana semipermeable, cap al costat on la concentració d'osmolits és més alta. No és el pas del solut. Hipotònic vol dir que el medi de fora té menys osmolits que la cèl·lula: l'aigua entra. Hipertònic: l'aigua surt. Isotònic: no hi ha flux net. Una cèl·lula animal en aigua destil·lada s'infla i pot esclatar (lisis). Una vegetal, amb paret, s'infla i es posa turgent; no esclata. En medi hipertònic la vegetal es

plasmolitza: la membrana se separa de la paret. La paret no és la membrana i no fa el control osmòtic; només limita el volum.

Mini-PAU resolt

Un eritròcit i una cèl·lula de fulla es posen en aigua destil·lada. Descriviu què li passa a cadascun i quina estructura explica la diferència.

L'eritròcit s'infla i es lisa: no té paret. La cèl·lula de fulla s'infla fins que la paret de cel·lulosa ho atura i queda turgent. Totes dues són en un medi hipotònic i l'aigua hi entra. La diferència no és el sentit de l'osmosi, és la paret.

Exemple resolt

La bomba Na^+/K^+ treu 3 Na^+ i entra 2 K^+ per cada ATP. Per què es diu que el transport és en contra de gradient, si a la cèl·lula ja hi ha molt K^+?

Precisament perquè ja n'hi ha molt. El K^+ entra contra el seu gradient de concentració (fora n'hi ha poc) i el Na^+ surt contra el seu (fora n'hi ha molt). L'ATP paga aquests dos gradients. El desequilibri de càrregues (surt una càrrega neta positiva) contribueix al potencial de membrana, negatiu per dins.

Exemple resolt

Un canal iònic obert deixa passar K^+ a favor de gradient. És transport actiu, perquè hi ha una proteïna?

No. La proteïna no decideix si és actiu: ho decideix el sentit respecte del gradient i la despesa d'energia. Un canal obert és difusió facilitada. Actiu és anar en contra, amb bomba o amb cotransport.

Mini-PAU resolt

Una cèl·lula vegetal es posa en un medi hipertònic. Es descriu plasmòlisi. Dibuixeu amb paraules on queda la membrana respecte de la paret, i per on ha sortit l'aigua.

L'aigua surt de la cèl·lula cap al medi, on hi ha més osmolits. El vacúol es buida, el volum del protoplast baixa i la membrana es desenganxa de la paret. La paret es queda on era: és rígida. Entre paret i membrana queda el medi que ha entrat per la paret, que és porosa. La paret no és semipermeable; la membrana sí.

Exemple resolt

La glucosa entra a l'eritròcit per GLUT, a favor de gradient, sense ATP. Entra a l'epiteli intestinal contra gradient, amb Na^+. Per què no és una contradicció?

Són dues proteïnes i dos contexts. Al glòbul vermell hi ha més glucosa fora que dins just després d'un àpat, i GLUT és difusió facilitada. A l'intestí la cèl·lula l'ha d'acumular: el cotransportador fa servir el gradient de Na^+, que la bomba Na^+/K^+ manté gastant ATP. El mateix solut pot travessar de les dues maneres segons la cèl·lula.

Mini-PAU resolt

Tres casos. A: O_2 entra sense proteïna. B: glucosa entra a favor de gradient amb una proteïna, sense ATP. C: Na^+ surt contra de gradient gastant ATP. Poseu el nom de cada transport i digueu quin es pararia primer si no hi hagués ATP, i quin no se'n ressentiria.

A és difusió simple. B, difusió facilitada. C, transport actiu primari. Sense ATP es para C de seguida. B continua mentre duri el gradient de glucosa. A no depèn ni de proteïna ni d'ATP. A la llarga, els gradients que mantenen algunes difusions facilitades els ha creat una bomba, i també cauran; però el que es para de manera directa és l'actiu.

2.5 Orgànuls

El nucli guarda el DNA lineal, separat del citosol per una doble membrana amb porus. El nucleòl és la regió on es transcriu l'RNA ribosòmic i es munten les subunitats dels ribosomes. El reticle endoplasmàtic rugós, amb ribosomes a la cara citosòlica, sintetitza proteïnes que aniran a la secreció, a la membrana o als lisosomes. El reticle llis sintetitza lípids, detoxifica i, al múscul, emmagatzema Ca^{2+}. L'aparell de Golgi rep vesícules del reticle, madura les proteïnes (glicosilació), les classifica i les envia. Els lisosomes porten hidrolases àcides. Els peroxisomes oxiden substrats i generen, i després desfan, peròxid d'hidrogen.

El mitocondri té dues membranes. La externa és permeable a molècules petites; la interna, plegada en crestes, és on hi ha la cadena respiratòria i l'ATP-sintasa. L'espai entre membranes acumula protons. A la matriu hi ha el cicle de Krebs, la descarboxilació del piruvat i la β-oxidació, a més de DNA circular propi i ribosomes 70S. El cloroplast, també amb doble membrana, DNA propi i ribosomes 70S, té tilacoides apilats en grana: a la membrana del tilacoide hi ha la fase lluminosa, i a l'estroma el cicle de Calvin.




Figura 2.4. Mitocondri. Membrana externa, espai intermembranós, membrana interna amb crestes i matriu, amb DNA i ribosomes propis. Krebs i β-oxidació a la matriu; cadena respiratòria i ATP-sintasa a la membrana interna.



Figura 2.5. Cloroplast (Kelvinsong, CC BY 3.0). La fase lluminosa és a la membrana del tilacoide i el cicle de Calvin, a l'estroma. L'O_2 surt de l'aigua.

La cèl·lula vegetal afegeix paret de cel·lulosa, vacúol gran (turgència, reserva, pigments) i cloroplasts, i es comunica per plasmodesmes. No té centríols: el fus de la mitosi es munta igualment. La cèl·lula animal té centríols,

lisosomes ben desenvolupats i, en general, vacúols petits. Totes dues tenen citoesquelet (microtúbuls, filaments d'actina, filaments intermedis), que dona forma, mou vesícules i forma el fus.




Figura 2.3. Cèl·lula animal (LadyofHats, adaptació al català de Gerard Duenas, domini públic). Sense paret; hi ha centríols, lisosomes i els orgànuls membranosos comuns.




Figura 2.3b. Cèl·lula vegetal. Paret de cel·lulosa per fora, membrana plasmàtica, vacúol gran amb tonoplast, cloroplasts, mitocondris i nucli. No hi ha centríols.

Idea clau

Mitocondris i cloroplasts s'assemblen a procariotes (DNA circular, ribosomes 70S, doble membrana). És la base de l'endosimbiosi, al tema 6. No són «la prova» tots sols, però encaixen amb la filogènia dels seus genomes.

On és cada cosa (eucariota)

Glucòlisi i fermentació: citosol. Piruvat, Krebs i β-oxidació: matriu mitocondrial. Cadena i ATP-sintasa: membrana interna. Fotosíntesi lluminosa: tilacoide. Calvin: estroma. Transcripció del DNA nuclear: nucli. Traducció de proteïnes citosòliques: ribosomes 80S lliures. Proteïnes de secreció: reticle rugós i després Golgi.

Cèl·lula animal i cèl·lula vegetal

	Animal	Vegetal
Paret	no	sí, de cel·lulosa, per fora de la membrana
Cloroplasts	no	sí, a les cèl·lules fotosintètiques
Vacúol	petits, si n'hi ha	un de gran, amb turgència
Centríols	sí	no, i el fus es munta igualment
Lisosomes	evidents	menys habituals; el vacúol fa part d'aquest paper
Nutrició	heteròtrofa	autòtrofa si hi ha cloroplasts

El nucli, el reticle, el Golgi, els mitocondris i els ribosomes 80S són comuns. El reticle rugós fabrica proteïnes que aniran a la secreció o a la membrana; el llis, lípids i destoxificació. El Golgi madura i classifica. Confondre Golgi i reticle és un error de dibuix: el reticle és una xarxa contínua amb el nucli; el Golgi és una pila de sacs separada.

Mini-PAU resolt

Una micrografia mostra una cèl·lula amb paret, un vacúol que ocupa gran part del volum i orgànuls verds amb membranes internes apilades. És animal o vegetal? On és el Calvin?

Vegetal. Els orgànuls verds són cloroplasts. El Calvin és a l'estroma, no als tilacoides.

On és cada procés

La pregunta «on» de la PAU es contesta amb aquesta taula, no amb un sinònim. El reticle rugós és continu amb l'embolcall nuclear i porta ribosomes: proteïnes de secreció, de membrana i dels lisosomes. El reticle llis no en

porta: lípids, destoxificació, reserva de Ca^{2+} al múscul. El Golgi és una pila de sacs separada: rep vesícules del reticle, madura les proteïnes (glicosilació) i les classifica. Confondre la pila del Golgi amb la xarxa del reticle és un error de forma, no només de nom.

Procés	Lloc, en un eucariota animal
Glucòlisi	citosol
Cicle de Krebs i β-oxidació	matriu mitocondrial
Cadena respiratòria i ATP-sintasa	membrana interna del mitocondri
Transcripció i replicació del genoma nuclear	nucli
Traducció de proteïnes citosòliques	ribosomes lliures
Traducció de proteïnes de secreció	ribosomes del reticle rugós
Fase lluminosa	membrana del tilacoide
Cicle de Calvin	estroma del cloroplast
Digestió intracel·lular	lisosomes

El mitocondri té dues membranes. L'externa és permeable a molècules petites. La interna és la barrera de debò i es plega en crestes per cabre-hi més cadena. Entre les dues, l'espai intermembranós, on s'acumulen els protons. La matriu és el compartiment de dins. El cloroplast en té tres espais: entre les dues membranes de l'embolcall, l'estroma, i el lumen del tilacoide. Els protons de la fase lluminosa s'acumulen al lumen, no a l'estroma. L'ATP-sintasa del cloroplast deixa sortir aquests protons cap a l'estroma, que és on el Calvin gasta l'ATP.

Mini-PAU resolt

Una cèl·lula vegetal de la fulla fa fotosíntesi i respira. En quin orgànul és el Calvin, en quin la cadena respiratòria, i l'oxigen que desprèn d'on surt?

El Calvin és a l'estroma del cloroplast. La cadena respiratòria és a la membrana interna del mitocondri, no al cloroplast. L'oxigen de la fotosíntesi surt de la fotòlisi de l'aigua al fotosistema II, al lumen del tilacoide, no del CO_2. El CO_2 es fixa al Calvin i els seus oxígens acaben en sucre i en aigua, no com a O_2 lliure.

Exemple resolt

El nucleòl es veu dins el nucli i desapareix durant la mitosi. Què s'hi fabrica?

Les subunitats ribosòmiques: s'hi transcriu l'RNAr i s'hi munten amb proteïnes que han entrat del citosol. No és el lloc de la traducció. Quan el nucli es desmunta a la mitosi, el nucleòl també, i es refà a la telofase.

Exemple resolt

Per què un lisosoma no es menja la pròpia cèl·lula mentre és intacte?

Perquè els enzims hidrolítics estan tancats per una membrana i treballen a pH àcid, que la bomba de protons del lisosoma manté. Al citosol, a pH proper a 7, aquells enzims anirien molt més lents. Si la membrana es trenca massivament, sí que hi ha autòlisi. L'apoptosi no és això: és un programa ordenat, no un vessament.

Mini-PAU resolt

Una proteïna de secreció es marca amb un aminoàcid radioactiu. Al cap de pocs minuts la marca és al reticle rugós; més tard, al Golgi; després, fora de la cèl·lula. Què demostra l'ordre, i per què no apareix primer al Golgi?

Demostra el camí secretor: es sintetitza als ribosomes del rugós, es transporta en vesícules al Golgi, que la madura i l'envasa, i surt per exocitosi. No pot aparèixer primer al Golgi perquè el Golgi no tradueix: no té ribosomes enganxats. Si la marca sortís al citosol i prou, seria una proteïna citosòlica, feta en ribosomes lliures.

Exemple resolt

Els protons de la respiració s'acumulen a l'espai intermembranós, i els de la fotosíntesi al lumen del tilacoide. Quin error de localització es fa si es diu que en tots dos casos «s'acumulen a la matriu»?

La matriu és el compartiment intern del mitocondri, que és on els protons tornen, no on s'acumulen. Al cloroplast l'equivalent de la matriu, pel que fa al retorn, és l'estroma. El lumen del tilacoide és l'espai de concentració, com l'intermembranós. Dir matriu per a tots dos esborra la diferència i posa el gradient al revés.

Mini-PAU resolt

Ompliu el lloc, en una cèl·lula vegetal: fotòlisi, Calvin, Krebs, cadena respiratòria, síntesi de proteïnes de secreció.

Fotòlisi: lumen del tilacoide, al fotosistema II. Calvin: estroma. Krebs: matriu del mitocondri. Cadena respiratòria: membrana interna del mitocondri. Proteïnes de secreció: es comencen al reticle rugós i es maduren al Golgi. Cap d'aquests llocs no es pot intercanviar. El mitocondri no fa el Calvin i el cloroplast no fa el Krebs.

2.6 Cicle cel·lular

El cicle es parteix en interfase i fase M. La interfase no és «repòs»: a G1 la cèl·lula creix i fa el que li toca; a S replica el DNA (cada cromosoma passa a tenir dues cromàtides germanes, unides pel centròmer); a G2 es prepara la mitosi. Una cèl·lula que no es divideix es queda en G0. La fase M és la mitosi més la citocinesi.

Hi ha punts de control. A final de G1 es comprova la mida, els nutrients i que el DNA no estigui danyat abans de replicar. A final de G2, que la replicació s'hagi acabat. A la mitosi, que els cromosomes estiguin units al fus abans de separar les cromàtides. Els complexos ciclina-CDK obren i tanquen aquests passos. Si el dany no es repara, la cèl·lula pot entrar en apoptosi. Quan els controls fallen i la cèl·lula es divideix sense fre, el risc és un tumor: el lligam amb oncogens i gens supressors és al tema 5.

> **Per ampliar · no és matèria d'examen**
>
> El nom de cada ciclina (D, E, A, B) i de cada CDK no es demana. N'hi ha prou amb «ciclines i CDK» i amb els tres controls.

La interfase no és un descans. És G1, S i G2. A G1 la cèl·lula creix i fa el que la seva funció demana; el DNA és en forma de cromatina, amb la quantitat 2C si la cèl·lula és diploide (una còpia de cada cromosoma, encara no duplicada: en realitat 2C vol dir el contingut diploide, i després de S és 4C). A S es replica tot el genoma. A G2 ja hi ha dues cromàtides per cromosoma, encara descondensades, i la cèl·lula comprova que la replicació s'ha acabat abans d'entrar a la mitosi. Un cromosoma a G2 és una peça amb dues cromàtides; es compta com un cromosoma fins que les cromàtides se separen a l'anafase.

Els punts de control aturen el cicle si el DNA està malmès (a G1 i a G2) o si un cromosoma no està enganxat al fus (a la metafase). Saltar-se'ls és part del que fan moltes cèl·lules tumorals. No cal el nom de cada cinasa; sí que cal dir que el cicle no és un rellotge cec.

Moment	DNA (cèl·lula 2n)	Cromosomes visibles?	Cromàtides per cromosoma
G1	2C	no, cromatina	1
Després de S, i a G2	4C	no	2
Metafase	4C	sí, al pla equatorial	2
Després de l'anafase, cada nucli fill	2C	es descondensen	1

Mini-PAU resolt

Una cèl·lula 2n = 46 acaba la fase S. Quants cromosomes té, quantes cromàtides i quant DNA respecte de G1?

Continua tenint 46 cromosomes. Cada un té 2 cromàtides, o sigui 92 cromàtides. El DNA és el doble que a G1 (4C en lloc de 2C). L'error és dir que té 92 cromosomes ja a la fase S: això només passa, i un instant, quan les cromàtides se separen a l'anafase i cada una compta com un cromosoma. Abans de la citocinesi n'hi ha 92 al conjunt, i cada nucli fill en torna a tenir 46.

Exemple resolt

Un gràfic de quantitat de DNA al llarg del temps és pla, puja suaument fins al doble, es manté, i cau a la meitat de cop. Quines fases són cada tram?

El pla inicial és G1. La pujada és S (replicació, no és instantània). El pla de dalt és G2 i la mitosi fins a l'anafase. La caiguda a la meitat és la divisió: cada filla se'n queda la meitat. Si el gràfic caigués a la quarta part, no seria una mitosi.

Mini-PAU resolt

Un fàrmac impedeix la replicació del DNA però no afecta l'ensamblatge del fus. En quina fase s'atura el cicle, i les cèl·lules que ja eren a G2 es divideixen?

S'atura a l'entrada de S, o dins de S, les que encara no han copiat el DNA. Les que ja han acabat S i són a G2 tenen el DNA duplicat: el punt de control de G2 les pot deixar passar si no detecta dany, i es divideixen. El fàrmac no és un inhibidor de la mitosi. Un inhibidor del fus aturaria a la metafase, que és un altre punt.

Exemple resolt

Per què una cèl·lula que passa el control de la metafase amb un cromosoma sense cinetocor enganxat arrisca una filla amb un cromosoma de més i una altra amb un de menys?

Perquè la separació de les cromàtides no queda assegurada si el fus no estira les dues bandes. Una filla es queda les dues cromàtides d'aquell cromosoma, o cap. És una aneuploïdia. El control existeix per impedir l'anafase fins que tots els cinetocors noten tensió.

2.7 Mitosi

La mitosi reparteix una còpia idèntica del DNA a dues cèl·lules filles. El nombre de cromosomes es manté: d'una cèl·lula 2n en surten dues de 2n. En humans, 46 cromosomes abans i 46 després. No genera varietat genètica, més enllà d'alguna errada rara.

A la profase els cromosomes es condensen i es veuen les dues cromàtides; es forma el fus i, a la prometafase, es trenca l'embolcall nuclear i els microtúbuls s'ancoren al cinetocor. A la metafase els cromosomes s'alineen a la placa equatorial. A l'anafase es trenquen les cohesines del centròmer i cada cromàtide germana, que a partir d'ara ja és un cromosoma, marxa cap a un pol. A la telofase es refà l'embolcall i els cromosomes es descondensen. La citocinesi parteix el citoplasma: en animals, per un anell d'actina; en vegetals, per una placa cel·lular que esdevé paret.




Figura 2.6. Mitosi (Jpablo cad i Juliana Osorio, CC BY-SA 3.0). A l'anafase se separen les cromàtides germanes. En surten dues cèl·lules diploides.

La funció és créixer, renovar teixits i, en molts organismes, reproduir-se asexualment. Una ferida que cicatritza ho fa per mitosi, no per meiosi.

Convé fixar què es veu a cada fase, perquè la PAU ho demana sobre un esquema. A la interfase el nucli sembla homogeni: el DNA ja s'ha replicat a la fase S, però les cromàtides encara no es distingeixen. A la profase es condensen. A la prometafase desapareix l'embolcall i els microtúbuls enganxen el cinetocor. A la metafase tots els centròmers són al pla equatorial. A l'anafase cada pol rep una cromàtide de cada cromosoma, que a partir d'ara ja compta com un cromosoma. A la telofase es refan dos nuclis. La citocinesi no és una fase de la mitosi en sentit estricte, però és el que parteix el citoplasma.

Fase	Què es veu	Què no s'ha de dir
Profase	la cromatina es condensa, el nuclèol desapareix, el fus comença	que els cromosomes ja són a l'equador
Prometafase	l'embolcall es fragmenta i els microtúbuls enganxen el cinetocor	que és un sinònim de metafase

Fase	Què es veu	Què no s'ha de dir
Metafase	tots els centròmers al pla equatorial	que les cromàtides ja s'han separat
Anafase	se separen les cromàtides germanes i cada pol en rep una de cada cromosoma	que se separen homòlegs (això és l'anafase I de la meiosi)
Telofase	es refan dos embolcalls i la cromatina es descondensa	que ja hi ha dues cèl·lules: això és la citocinesi

La citocinesi animal és un anell d'actina i miosina que estreny la membrana. La vegetal és una placa cel·lular que creix des del centre, feta amb vesícules de Golgi, i acaba essent paret. Les dues parteixen el citoplasma. Cap de les dues és una fase de la mitosi en sentit estricte, però la prova les demana juntes.

Compte amb el recompte. Una cèl·lula 2n = 4 entra en mitosi. A la metafase es veuen 4 cromosomes, cadascun amb 2 cromàtides. A l'anafase se'n veuen 8 peces (cada cromàtide ja és un cromosoma) repartides cap als dos pols, 4 i 4. Cada filla en té 4, igual que la mare. La mitosi conserva n.

Mini-PAU resolt

Un esquema mostra cromosomes de dues cromàtides alineats a l'equador i l'embolcall ja absent. És metafase o anafase? Què passarà al pas següent amb les cromàtides germanes?

És metafase: alineats i encara amb dues cromàtides. Al pas següent, l'anafase, el centròmer es parteix i les germanes se separen cap a pols oposats. Si les peces que migressin fossin cromosomes sencers de dues cromàtides, seria anafase I de meiosi, no anafase de mitosi.

Exemple resolt

Per què la profase de la mitosi no té entrecreuament, si els cromosomes també es condensen?

Perquè no hi ha aparellament d'homòlegs. L'entrecreuament demana el complex sinaptonemal de la profase I, que ajunta el cromosoma matern i el patern. A la mitosi cada cromosoma es condensa pel seu compte. Condensar no és recombinar.

Mini-PAU resolt

Una cèl·lula 2n = 8 és a l'anafase de la mitosi. Quants cromosomes es compten en aquell moment al conjunt de la cèl·lula, i quants en tindrà cada filla?

16 al conjunt: les cromàtides ja s'han separat i cadascuna compta com un cromosoma, 8 cap a cada pol. Cada filla, un cop feta la citocinesi, en té 8. El nombre de la mare es conserva. Dir 8 cromosomes durant tota l'anafase, sense distingir el moment de la separació, és el que fa perdre el punt.

Exemple resolt

La citocinesi vegetal no estreny la membrana. D’on surt la placa que parteix la cèl·lula?

De vesícules del Golgi, carregades de polisacàrids de paret, que s’alineen al pla equatorial i es fusionen. La placa creix de dins cap a fora fins a trobar la paret antiga. No és un anell d’actina, que és el mecanisme animal. Les dues coses es diuen citocinesi i no són el mateix dibuix.

2.8 Meiosi

La meiosi redueix a la meitat el nombre de cromosomes i produeix quatre nuclis haploides, genèticament diferents. En animals dona gàmetes. Sense aquesta reducció, la fecundació duplicaria el nombre de cromosomes a cada generació.

La meiosi I és reduccional. A la profase I els homòlegs s’aparellen (sinapsi) i formen tètrades. Al paquitè es produeix l’entrecreuament: bescanvi de fragments entre cromàtides no germanes. És la recombinació. Després, a l’anafase I, se separen els cromosomes homòlegs, no les cromàtides germanes. Cada pol rep un homòleg de cada parell, triat a l’atzar (repartiment independent, la base de la segona llei de Mendel quan els gens són en cromosomes diferents). Les dues cèl·lules que en surten són haploides, però cada cromosoma encara té dues cromàtides.

La meiosi II és equacional i s’assembla a una mitosi: se separen les cromàtides germanes. El resultat són quatre cèl·lules n. En la espermatogènesi humana, quatre espermatozoides. En l’ovogènesi, un òvul i cossos polars.




Figura 2.7. Meiosi. A la profase I hi ha entrecreuament. A l'anafase I se separen els cromosomes homòlegs. A l'anafase II se separen les cromàtides germanes. En surten quatre nuclis haploides.

Idea clau

	Mitosi	Meiosi
Divisions	una	dues
Aparellament d'homòlegs	no	sí, a la profase I
Què se separa primer	cromàtides germanes	homòlegs (anafase I)
Cèl·lules filles	2, idèntiques, 2n	4, diferents, n
Funció	creixement, renovació, reproducció asexual	gàmetes o espores; variació

Dos gens situats al mateix cromosoma estan lligats: no s'hereten amb independència, llevat que un entrecreuament els separi. Com més lluny són, més probabilitat de recombinació. Una freqüència de recombinació del 50 % els fa indistingibles de gens de cromosomes diferents. El càlcul de problemes és al tema 4.

Mini-PAU resolt

Un esquema mostra cromosomes homòlegs separant-se, encara amb dues cromàtides cadascun. És anafase de mitosi o anafase I de meiosi? Quina és la ploïdia de cada pol si la cèl·lula mare era 2n = 6?

És anafase I: se separen homòlegs sencers. Cada pol rep 3 cromosomes (n = 3), encara duplicats. A l'anafase de la mitosi es veurien cromàtides soltes marxant cap als pols i cada pol acabaria amb 6 cromosomes.

Mitosi i meiosi

	Mitosi	Meiosi
Nombre de divisions	1	2
Entrecreuament	no	sí, a la profase I
Què se separa a la primera anafase	cromàtides germanes	cromosomes homòlegs
Cèl·lules que en surten	2, diploides, idèntiques	4, haploides, diferents
Funció	créixer, renovar, reproduir-se sense gàmetes	fer gàmetes o espores i generar variació

Si l'esquema mostra parelles de cromosomes (un de cada color, per exemple) que se separen encara amb dues cromàtides, és anafase I. Si mostra cromàtides soltes marxant cap als pols, pot ser anafase de mitosi o anafase II. El context (si abans hi ha hagut aparellament) ho decideix.

Exemple resolt

Una cèl·lula 2n = 8 entra en meiosi. Quants cromosomes hi ha a cada pol al final de l'anafase I, i quants a cada gàmeta al final de la meiosi II?

A l'anafase I cada pol rep 4 cromosomes (n = 4), encara duplicats. Després de la meiosi II, cada nucli té 4 cromosomes d'una sola cromàtide.

La meiosi fa quatre nuclis haploides a partir d'un diploide, i els fa diferents. La reducció de veritat és a la meiosi I: els homòlegs se separen i cada nucli es queda amb n cromosomes, encara duplicats (dues cromàtides). La meiosi II és semblant a una mitosi d'una cèl·lula haploide: se separen les cromàtides i els quatre nuclis queden amb n cromosomes d'una sola cromàtide. No hi ha fase S entre la meiosi I i la II. Si n'hi hagués, es perdria la reducció.

	Què s'aparella	Què se separa a l'anafase	n de cada nucli al final	Entrecreuament
Meiosi I	homòlegs (bivalent)	els homòlegs, sencers	n, cromosomes encara duplicats	sí, a la profase I
Meiosi II	res	les cromàtides germanes	n, d'una cromàtide	no
Mitosi	res	les cromàtides germanes	2n	no

L'entrecreuament és un intercanvi de fragments entre cromàtides no germanes d'un bivalent. Passa a la profase I i es veu, més tard, com un quiasma. Fa que un cromosoma que arriba a un gàmeta no sigui una còpia intacta del matern o del patern. L'altra font de variació, independent d'aquesta, és el repartiment a l'atzar: cada pol de l'anafase I es queda amb una barreja de cromosomes materns i paterns. Amb n parells, hi ha 2^n combinacions sense comptar l'entrecreuament. En humans, 2^{23}, més d'un milió, i l'entrecreuament ho multiplica.

Mini-PAU resolt

Una cèl·lula 2n = 6 entra en meiosi. Quants cromosomes hi ha a cada pol al final de l'anafase I? I al final de la meiosi II, a cada nucli? I quants bivalents s'han format a la profase I?

Tres parells, o sigui 3 bivalents. A l'anafase I cada pol rep 3 cromosomes (n = 3), cadascun amb dues cromàtides. Al final de la meiosi II cada nucli té 3 cromosomes d'una cromàtide. L'error típic és dir que a l'anafase I cada pol en rep 6, o que els gàmetes en tenen 1,5.

Exemple resolt

Un esquema de meiosi mostra, a l'anafase, cromàtides soltes marxant cap als pols i cap parella d'homòlegs. Pot ser anafase I?

No. A l'anafase I el que marxa és un cromosoma sencer, amb dues cromàtides, perquè les germanes encara estan unides. Cromàtides soltes són anafase II o anafase de mitosi. Si a la cèl·lula no hi ha parells i el nombre ja és haploide, és anafase II.

Exemple resolt

Per què un gàmeta humà té 23 cromosomes i no 23 parells, i què passaria en la fecundació si la meiosi no reduís?

Els 23 parells són el 2n del cos. El gàmeta en porta un de cada parell: 23, n. A la fecundació 23 + 23 = 46. Si els gàmetes fossin diploides, el zigot en tindria 92 i el nombre es doblaria cada generació. La meiosi és el que ho impedeix.

Mini-PAU resolt

Sense entrecreuament, un individu AaBb amb els dos gens en cromosomes diferents fa gàmetes. Quins genotips i en quina proporció? I si els dos gens estiguessin completament lligats, en acoblament (AB al mateix cromosoma)?

Independents: AB, Ab, aB i ab, un 25 % cadascun. Lligats del tot, sense entrecreuament: només AB i ab, 50 % i 50 %. Els recombinants Ab i aB no apareixen. La diferència és el que mesura un encreuament prova. L'entrecreuament, si n'hi ha, fa aparèixer els recombinants en una proporció igual a la distància.

Exemple resolt

Per què entre la meiosi I i la meiosi II no hi ha fase S, i què passaria amb n si n'hi hagués?

Perquè la reducció s'ha de conservar. Després de la meiosi I els cromosomes ja tenen dues cromàtides: n'hi ha prou per a la meiosi II. Una fase S hi tornaria a duplicar el DNA i els gàmetes no serien haploides en contingut, o el nombre es desquadraria. La meiosi II separa el que ja estava duplicat des d'abans de la meiosi I.

El recompte de la meiosi es fa per fases, no de memòria. S'escriu 2n. A la profase I es formen n bivalents. A l'anafase I cada pol rep n cromosomes de dues cromàtides. No hi ha S. A l'anafase II cada un d'aquests cromosomes se separa en dues cromàtides, i cada pol en rep n d'una sola peça. Al final, quatre nuclis, cadascun amb n cromosomes. Si en algun pas el nombre es dobla sense una anafase, el recompte està malament.

Mini-PAU resolt

2n = 46. Quants bivalents a la profase I, quants cromosomes a un nucli al final de la telofase I, i quants a un gàmeta al final de la meiosi II?

23 bivalents. Al final de la telofase I, 23 cromosomes, encara amb dues cromàtides cadascun: el DNA d'aquell nucli és 2C, no 1C. Al gàmeta, 23 cromosomes d'una cromàtide, 1C. La fecundació torna a 46. Dir 23 parells al gàmeta és tornar al 2n.

2.9 Mapa del tema




Figura 2.8. De la cèl·lula a les dues divisions. La localització de les vies metabòliques és al tema 3.

Resum

Estructura	On és la funció que la PAU pregunta
Membrana	bicapa, transport, reconeixement
Nucli	DNA, transcripció
Ribosoma 80S / 70S	traducció al citosol / a procariotes, mitocondris i cloroplasts
Mitocondri	respiració aeròbica (després de la glucòlisi)
Cloroplast	fotosíntesi
Mitosi	2 cèl·lules 2n
Meiosi	4 cèl·lules n, amb recombinació a la profase I

Errors típics a la PAU

- Dir que a l'anafase de la mitosi se separen cromosomes homòlegs.
- Dir que la meiosi produeix dues cèl·lules, o que les filles són diploides.
- Situar el cicle de Krebs a la membrana interna, o la cadena a la matriu.
- Situar el Calvin al tilacoide i la fase lluminosa a l'estroma.
- Confondre hipotònic i hipertònic quan es parla de plasmòlisi.
- Dir que els procariotes fan mitosi.

Glossari

Mosaic fluid
: Model de membrana: bicapa lipídica amb proteïnes que s'hi desplacen.

Difusió facilitada
: Pas a favor de gradient per un canal o un transportador, sense ATP.

Transport actiu
: Pas en contra de gradient, amb despesa d'energia.

Osmosi
: Difusió neta d'aigua cap al costat de més concentració de solut.

Cromàtides germanes
: Les dues còpies idèntiques d'un cromosoma després de la fase S, unides pel centròmer.

Homòlegs
: Parella de cromosomes, un de cada progenitor, amb els mateixos gens i possiblement al·lels diferents.

Entrecreuament
: Bescanvi de fragments entre cromàtides no germanes a la profase I.

Bipartició
: Divisió dels procariotes, sense fus ni mitosi.

Autoavaluació

1. L'oxigen travessa la bicapa lipídica per difusió simple i la glucosa no. Expliqueu la diferència a partir de les propietats de cada molècula i digueu quin tipus de transport necessita la glucosa.

   L'interior de la bicapa és hidròfob, format per les cues dels fosfolípids. L'O_2 és una molècula petita i apolar, de manera que es dissol en aquestes cues i travessa la membrana sense proteïna i a favor del seu gradient: és difusió simple. La glucosa, en canvi, té diversos grups hidroxil i és polar; les cues la frenen i no pot creuar sola, per petita que sigui en comparació amb una proteïna. Necessita una proteïna de membrana. Si entra a favor de gradient, com fa a l'eritròcit pel transportador GLUT, és difusió facilitada i no gasta ATP. En alguns epitelis entra contra gradient, acoblada al sodi: llavors és transport actiu secundari. La mida, tota sola, no decideix el pas; el decideix la polaritat i el sentit respecte del gradient.

2. Situeu, dins el mitocondri, el cicle de Krebs i l'ATP-sintasa. Justifiqueu per què no es poden intercanviar aquests dos llocs.

   El cicle de Krebs ocorre a la matriu, el compartiment intern delimitat per la membrana interna. L'ATP-sintasa és a la membrana interna: el canal de protons travessa aquesta membrana i el cap catalític, on es forma l'ATP, mira cap a la matriu. No es poden intercanviar perquè fan feines diferents. El Krebs oxida l'acetil-CoA i redueix NAD^+ i FAD dins la matriu, sense fer servir la membrana. L'ATP-sintasa aprofita el retorn dels protons des de l'espai intermembranós cap a la matriu. Si estigués a la membrana externa, no hi hauria el gradient que la fa funcionar, perquè la membrana externa és permeable a molècules petites i no acumula protons.

3. Una cèl·lula somàtica humana, 2n = 46, es divideix per mitosi. Quants cromosomes tindrà cadascuna de les dues cèl·lules filles? Argumenteu-ho amb el que passa a l'anafase, no només amb el resultat.

   Cada filla tindrà 46 cromosomes. Abans de la mitosi, a la fase S, el DNA s'ha replicat i cada cromosoma té dues cromàtides, però el nombre de cromosomes continua essent 46. A l'anafase el centròmer es divideix i les cromàtides germanes se separen cap a pols oposats: cada pol en rep una de cada cromosoma, és a dir 46. La citocinesi reparteix aquests dos nuclis en dues cèl·lules. La mitosi conserva la diploidia. Si se n'obtinguessin 23, seria una divisió reduccional, que és la meiosi, no la mitosi.

4. En quin moment de la meiosi es produeix l'entrecreuament, entre quines cromàtides, i què se separa a l'anafase I? Per què aquest últim fet redueix el nombre cromosòmic?

   L'entrecreuament es produeix a la profase I, quan els cromosomes homòlegs estan aparellats formant bivalents. L'intercanvi és entre cromàtides no germanes, una de cada homòleg. A l'anafase I se separen els cromosomes homòlegs sencers, encara amb les dues cromàtides unides, i cada pol es queda amb un cromosoma de cada parell. El nombre passa de 2n a n. La reducció és aquesta separació dels homòlegs, no la separació de les cromàtides germanes, que no arriba fins a l'anafase II.

5. Els mitocondris i els cloroplasts tenen DNA circular propi i ribosomes 70S. Quina hipòtesi evolutiva explica aquestes semblances amb els bacteris, i què no explica?

   La teoria endosimbiòtica. Proposa que aquests orgànuls deriven de procariotes que van ser incorporats per una cèl·lula hoste i no van ser digerits: un bacteri aerobi en el cas del mitocondri i un cianobacteri en el cas del cloroplast. Per això conserven una doble membrana, un genoma circular i ribosomes 70S, del tipus bacterià, i es divideixen de manera autònoma. No explica l'origen del nucli ni del reticle endoplasmàtic. Tampoc no vol dir que un mitocondri actual sigui un bacteri lliure: ha transferit la majoria dels gens al nucli.

6. En una micrografia obtinguda amb 600 augments, una cèl·lula mesura 12 mm sobre la fotografia. Calculeu la mida real i expresseu-la en micròmetres, indicant la conversió d'unitats.

   La mida real és la mida de la imatge dividida pels augments: 12 mm / 600 = 0,02 mm. Un mil·límetre són 1 000 µm, de manera que 0,02 mm = 20 µm. No es multiplica per 600: els augments fan la imatge més gran que l'objecte, i per recuperar la mida real cal dividir. 20 µm és una mida pròpia d'una cèl·lula eucariota, visible amb el microscopi òptic.

3. Metabolisme

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU

De cada via cal saber el nom, on passa (orgànul i, si escau, el subcompartiment), el substrat, el producte, el balanç energètic i si els coenzims s'oxiden o es redueixen. Cal comparar catabolisme i anabolisme, via i reacció, respiració aeròbica i fermentació, i fotosíntesi i respiració.

Les orientacions agrupen glucòlisi i fermentació sota «respiració cel·lular anaeròbica». Al text es fa servir el terme precís: la fermentació no té cadena de transport. La respiració anaeròbica bacteriana, que sí que en té, es distingeix en un requadre curt perquè els enunciats de vegades les barregen.

La síntesi d'aminoàcids i la lipogènesi només es demanen per situar-les a l'esquema. La síntesi de proteïnes, com a mecanisme, és al tema 5. El rendiment es dona amb el valor actual, uns 30–32 ATP per glucosa, i es recorda el balanç escolar de 36–38.

3.1 Visió general

El metabolisme és el conjunt de reaccions d'un ésser viu. Una reacció és un sol pas, catalitzat per un enzim. Una via és una seqüència de passos amb un substrat inicial i un producte final. El catabolisme degrada molècules, les oxida i allibera energia, que queda en ATP i en coenzims reduïts. L'anabolisme construeix molècules, les redueix i gasta ATP i poder reductor.

L'ATP és la moneda d'energia a curt termini. La hidròlisi ATP → ADP + P_i és exergònica i s'acobla a processos que no ho serien sols (transport actiu, síntesi, contracció). No és un magatzem: una cèl·lula en té pocs segons de reserva i el recicla contínuament. El NADH, el NADPH i el $FADH_2$ transporten electrons, és a dir, poder reductor. NADH i $FADH_2$ alimenten sobretot la cadena respiratòria. El NADPH alimenta sobretot les biosíntesis (Calvin, lipogènesi). No són intercanviables als enunciats: escriure «NADH de la fotosíntesi» és un error.




Figura 3.9. ATP: adenina, ribosa i tres fosfats. L'enllaç que la cèl·lula fa servir és el dels fosfats, no l'esquelet del nucleòtid.




Figura 3.1. Catabolisme i anabolisme queden lligats per l'ATP i pels coenzims. Una via no és una reacció.

Catabolisme és trencar molècules i oxidar-les: els electrons van a coenzims (NAD^+ i FAD passen a NADH i $FADH_2$) i, a la respiració, acaben a l'oxigen. L'energia es guarda en ATP. Anabolisme és construir: gasta ATP i, sovint, NADPH. No són la mateixa via al revés. Una via és una seqüència d'enzims, amb passos irreversibles que són els que es regulen. Una reacció aïllada no és una via.

L'ATP és ribosa, adenina i tres fosfats. El que la cèl·lula fa servir és la hidròlisi de l'enllaç entre fosfats (ATP → ADP + Pi, o ATP → AMP + PPi), no «trencar l'adenina». Es regenera constantment. Dir que l'ATP és un magatzem com el glicogen és fals: n'hi ha pocs segons de reserva. El magatzem són el glicogen i els triacilglicerols; l'ATP és la moneda.

	Catabolisme	Anabolisme
Molècules	es fan petites i s'oxiden	es fan grans i es redueixen
Coenzims	NADH, $FADH_2$	NADPH, sobretot
ATP	se'n produeix	se'n gasta
Exemple	glucosa → CO_2	CO_2 → sucre, al Calvin

Exemple resolt

Per què el NADPH i el NADH no es consideren intercanviables, si tots dos porten electrons?

Perquè la cèl·lula els fa servir en llocs diferents. El NADH cedeix electrons a la cadena respiratòria. El NADPH cedeix electrons a les biosíntesis (Calvin, àcids grassos, colesterol). Els enzims distingeixen el fosfat de més del NADPH. Barrejar-los en un esquema és un error de funció, no de fórmula.

Mini-PAU resolt

Una cèl·lula muscular en repòs té poc ATP i molt glicogen. Està «sense energia»?

No. Està sense moneda circulant, no sense reserva. El glicogen es pot mobilitzar en segons i la glucòlisi i la respiració regeneren l'ATP. L'ATP no s'acumula: es fa quan es gasta. El que indicaria una reserva buida seria el glicogen i el greix esgotats, no un valor baix d'ATP, que és el normal.

Mini-PAU resolt

Una via produeix NADH i ATP, i el carboni surt com a CO_2. Una altra gasta ATP i NADPH, i el carboni entra com a CO_2. Classifiqueu-les i digueu quina no pot anar sense l'altra en una planta a la llum.

La primera és catabòlica (respiració). La segona és anabòlica (Calvin). A la llum la planta fa les dues. El Calvin no pot anar sense la fase lluminosa, que li fabrica l'ATP i el NADPH; la respiració sí que pot anar a les fosques, perquè el NADH el fa ella mateixa. No són la mateixa via en sentit oposat: els coenzims ni tan sols són els mateixos.

Exemple resolt

Per què es diu que l'ATP no és una reserva i el glicogen sí, si tots dos es poden gastar?

Per la quantitat i el temps. L'ATP cel·lular es renova en segons: no n'hi ha per aguantar un minut d'exercici. El glicogen del múscul i del fetge aguanta minuts o hores, i el greix, dies. L'ATP és l'intermediari. Tractar-lo com un magatzem porta a dir que «la cèl·lula acumula ATP», que no és el que fa.

3.2 Glucòlisi

La glucòlisi (també escrita glicòlisi en alguns enunciats; la forma normativa és glucòlisi) parteix la glucosa en dos piruvats al citosol. No necessita oxigen ni mitocondri: també la fan els procariotes. Té una fase de despesa i una de guany.

A la despesa es gasten 2 ATP: la hexocinasa (o glucocinasa, al fetge) fosforila la glucosa, i la fosfofructocinasa fosforila la fructosa-6-fosfat. La molècula de sis carbonis es talla en dues trioses. Al guany, cada triosa s'oxida: el

NAD^+ passa a NADH (2 NADH per glucosa) i, per fosforilació a nivell de substrat, es formen 4 ATP. El producte són 2 piruvats.

Balanç net per glucosa:

$$\text{glucosa} + 2\ NAD^+ + 2\ ADP + 2\ P_i \rightarrow 2\ \text{piruvat} + 2\ NADH + 2\ ATP + 2\ H^+ + 2\ H_2O$$

Els passos irreversibles, i per tant regulats, són els de l'hexocinasa, la fosfofructocinasa i la piruvat-cinasa. La fosfofructocinasa és el punt principal: l'ATP abundant la frena.




Figura 3.2. Glucòlisi: es paguen 2 ATP i se'n cobren 4. Net: 2 ATP i 2 NADH, al citosol.

Per ampliar · no cal memoritzar-ho

Els deu enzims, per ordre: hexocinasa, fosfoglucosa-isomerasa, fosfofructocinasa, aldolasa, triosa-fosfat-isomerasa, gliceraldehid-3-fosfat-deshidrogenasa, fosfoglicerat-cinasa, fosfoglicerat-mutasa, enolasa, piruvat-cinasa. A la PAU en teniu prou amb el balanç i els tres passos de control.

La glucòlisi és al citosol, anaeròbica en el sentit que no hi entra O_2, i la fan gairebé totes les cèl·lules. La glucosa es fosforila (això gasta ATP i impedeix que surti de la cèl·lula), s'isomeritza a fructosa i es torna a fosforilar (segon ATP). La fructosa-1,6-bisfosfat es parteix en dues trioses. A partir d'aquí tot va per dos. Cada triosa s'oxida: el NAD^+ passa a NADH i, més endavant, el substrat fosforila ADP. Són 2 ATP per triosa, 4 en total, menys els 2 de l'entrada: net 2 ATP i 2 NADH per glucosa. El producte són 2 piruvats.

Els passos que es regulen són els irreversibles, sobretot la fosfofructocinasa. L'ATP abundant la frena: si ja hi ha moneda, no cal cremar més glucosa. L'AMP, senyal que l'ATP s'ha gastat, l'activa. No cal el nom de tots els intermedis; sí el balanç, el lloc i el fet que el NADH s'ha de reoxidar, o la glucòlisi s'atura per falta de NAD^+.

Mini-PAU resolt

Una cèl·lula consumeix 3 glucoses per glucòlisi. Quants piruvats, quants ATP nets i quants NADH se'n fan, i on?

Al citosol: 6 piruvats, 6 ATP nets i 6 NADH. El càlcul per glucosa és 2, 2 i 2. No s'hi ha de sumar el Krebs: l'enunciat diu glucòlisi. I no són 38.

Exemple resolt

Per què la glucòlisi gasta ATP al començament, si l'objectiu és fabricar-ne?

Perquè les primeres fosforilacions fan que la glucosa no pugui tornar a sortir pel transportador i preparen el trencament en dues trioses, que després rendeixen més ATP del que s'ha pagat. Sense aquesta inversió la via no és favorable. El balanç net continua essent positiu: 4 de cobrats menys 2 de pagats.

Mini-PAU resolt

En anaerobiosi la glucòlisi s'atura si no hi ha fermentació, tot i que la glucòlisi no fa servir oxigen. Expliqueu el coll d'ampolla amb el nom del coenzim.

El NAD^+. La glucòlisi el redueix a NADH. Sense cadena i sense fermentació, no hi ha manera de tornar-lo a NAD^+. Quan tot és NADH, el pas d'oxidació de la triosa no té acceptor i la via s'atura, encara que quedin glucosa i ADP. La fermentació existeix per aquest motiu, no per fer més ATP.

Exemple resolt

Es bloquegen els dos primers passos de la glucòlisi, els que gasten ATP. El resta de la via, en un extracte, funciona si s'hi afegeix el producte d'aquells passos. Per què el balanç d'ATP de la glucòlisi sencera no es pot calcular només amb els ATP de la segona meitat?

Perquè la segona meitat en produeix 4 per glucosa i la primera en gasta 2. Comptar només els 4 ignora la inversió. El net és 2. Un extracte al qual ja se li dona el producte fosforilat no ha pagat aquella inversió, i el número que se'n mesura no és el de la cèl·lula.

Val la pena saber el balanç sense memoritzar els deu enzims. Glucosa a glucosa-6-fosfat gasta un ATP. Fructosa-6-fosfat a fructosa-1,6-bisfosfat en gasta un altre. Aquest segon pas és el principal punt de regulació: l'ATP el frena i l'AMP l'activa. La molècula de sis es parteix en dues de tres. A partir d'aquí es multiplica per dos. Cada triosa s'oxida (un NAD^+ per triosa, dos per glucosa) i el fosfat que s'hi enganxa acaba a l'ATP. Dues vegades per triosa, quatre ATP bruts, dos nets. El producte és piruvat, no etanol ni lactat: això ja és fermentació, un pas de més.

Mini-PAU resolt

Una cèl·lula transforma 5 glucoses per glucòlisi i després fermenta a lactat. Quants ATP nets, quants NADH queden acumulats i quants lactats?

10 ATP nets. Cap NADH acumulat: la fermentació els ha tornat a NAD^+, i aquest és el motiu de fer-la. 10 lactats, perquè cada glucosa dona 2 piruvats i cada piruvat un lactat. Si l'enunciat hagués dit «només glucòlisi, amb oxigen», els NADH serien 10 i no hi hauria lactat.

3.3 Destí del piruvat i cicle de Krebs

Si hi ha oxigen i mitocondri, cada piruvat entra a la matriu. Allà el complex de la piruvat-deshidrogenasa el descarboxila:

piruvat + CoA + NAD^+ → acetil-CoA + CO_2 + NADH

Per glucosa (dos piruvats): 2 acetil-CoA, 2 CO_2 i 2 NADH. Aquest pas no és encara el cicle de Krebs.

Al cicle de Krebs (cicle de l'àcid cítric, cicle dels àcids tricarboxílics), també a la matriu, l'acetil-CoA (2C) es condensa amb l'oxaloacetat (4C) i dona citrat (6C). L'oxaloacetat es regenera al final: per això és un cicle. L'ordre dels intermedis és citrat, isocitrat, α-cetoglutarat, succinil-CoA, succinat, fumarat, malat i oxaloacetat. En una volta surten 2 CO_2, 3 NADH, 1 $FADH_2$ i 1 GTP (equivalent a 1 ATP, fosforilació a nivell de substrat, a l'enzim que passa de succinil-CoA a succinat). El $FADH_2$ el produeix la succinat-deshidrogenasa, que és el complex II de la cadena i està a la membrana interna, no dissolta a la matriu.




Figura 3.10. Respiració cel·lular (Zlir'a, CC BY-SA 4.0). La glucòlisi, al citosol, rendeix 2 ATP. El piruvat entra a la matriu i passa a acetil-CoA. El cicle de Krebs, també a la matriu, rendeix 2 ATP per glucosa. La cadena respiratòria i l'ATP-sintasa són a la membrana interna i en rendeixen uns 28. Amb els 4 de la fosforilació a nivell de substrat, el total és d'uns 30–32 ATP per glucosa.

Per glucosa el cicle gira dues vegades: 4 CO_2, 6 NADH, 2 $FADH_2$ i 2 GTP. Sumats als 2 NADH de la descarboxilació del piruvat, a la matriu hi ha 8 NADH per glucosa, a més dels 2 NADH citosòlics de la glucòlisi.




Figura 3.3. Una volta del cicle per cada acetil-CoA. El carboni que entra no és, volta per volta, el que surt com a CO_2: el balanç sí que és de dos CO_2.

= Idea clau

El CO_2 que expirem ve d'aquestes descarboxilacions (piruvat i Krebs), no «de cremar oxigen». L'oxigen que inspirem acaba, a la cadena, en aigua.

En un eucariota el piruvat entra a la matriu. El complex de la piruvat deshidrogenasa el converteix en acetil-CoA: surt un CO_2 i un NADH per piruvat. No és encara el Krebs; és el pont. Per glucosa, dos piruvats: 2 CO_2 i 2 NADH. Aquest CO_2 no s'ha de comptar dues vegades quan es fa el balanç del Krebs.

El cicle de Krebs (àcids tricarboxílics) comença quan l'acetil-CoA, de dos carbonis, s'uneix a l'oxalacetat, de quatre, i fa citrat, de sis. Dues descarboxilacions tornen els dos carbonis que han entrat, com a CO_2, i regeneren l'oxalacetat. Per volta: 3 NADH, 1 $FADH_2$ i 1 GTP (equivalent a 1 ATP). Per glucosa, dues voltes: 6 NADH, 2 $FADH_2$, 2 GTP i 4 CO_2. Sumats als 2 CO_2 del pont, són els 6 CO_2 de la glucosa. El carboni que surt en una volta concreta no és, àtom per àtom, el que acaba d'entrar; el balanç sí que és de dos CO_2 per acetil.

Mini-PAU resolt

Un àcid gras ha donat 4 acetil-CoA que entren al Krebs. Quants CO_2, NADH i $FADH_2$ en surten, només del cicle, no de la β-oxidació?

Cada acetil-CoA: 2 CO_2, 3 NADH, 1 $FADH_2$, 1 GTP. Per quatre: 8 CO_2, 12 NADH, 4 $FADH_2$ i 4 GTP. No s'hi afegeix el NADH de la piruvat deshidrogenasa, perquè aquests acetils no venen del piruvat.

Exemple resolt

Per què el Krebs s'atura si no hi ha NAD^+ lliure, encara que no hi intervingui l'oxigen?

Perquè tres passos del cicle redueixen NAD^+ i un redueix FAD. Si tot el coenzim és en forma reduïda, aquells passos no tenen acceptor. L'oxigen no és substrat del Krebs; és el que, a la cadena, permet reoxidar el NADH. Sense cadena funcional, el Krebs es queda sense NAD^+.

Mini-PAU resolt

Per què, en un eucariota, el piruvat ha de entrar a la matriu abans de fer acetil-CoA, i què es perd si la membrana interna és impermeable al NADH?

El complex de la piruvat deshidrogenasa és a la matriu. El piruvat hi entra amb un transportador. El NADH fet a la matriu lliura els electrons a la cadena per dins. El NADH fet al citosol, a la glucòlisi, no travessa la membrana interna: per això existeixen les llançadores, que passen els electrons sense passar la molècula. Si no hi fossin, aquells electrons no arribarien a l'oxigen.

Exemple resolt

Un torn del Krebs comença amb oxalacetat i acaba amb oxalacetat. Si el compost es regenera, d'on surt l'energia?

De l'acetil-CoA que s'hi ha afegit, no de l'oxalacetat. Els dos carbonis de l'acetil s'oxiden a CO_2 al llarg del cicle, i els electrons queden al NADH i al $FADH_2$. L'oxalacetat és el portador que torna a estar disponible. Dir que «el cicle no produeix res perquè tot es regenera» oblida el que hi entra i el que en surt en forma reduïda.

3.4 Cadena respiratòria i balanç d'ATP

La cadena és a la membrana interna del mitocondri (en procariotes, a la membrana plasmàtica). Els electrons del NADH entren pel complex I; els del $FADH_2$, pel complex II, i per això rendeixen menys. D'allà passen a la ubiquinona, al complex III, al citocrom c i al complex IV. L'acceptor final és l'oxigen:

$$\tfrac{1}{2}\, O_2 + 2\, e^- + 2\, H^+ \rightarrow H_2O$$

per cada parell d'electrons. Sense oxigen els electrons no tenen on anar, el NADH i el $FADH_2$ no es reoxiden i tant la cadena com el Krebs s'aturen. Els complexos I, III i IV bombegen protons cap a l'espai intermembranós. El retorn dels protons a la matriu per l'ATP-sintasa fosforila l'ADP. Això és la quimiosmosi, i el conjunt, la fosforilació oxidativa. No és el mateix que la fosforilació a nivell de substrat de la glucòlisi i del Krebs, que no fa servir la cadena.



Figura 3.4. Els electrons acaben a l'oxigen. El gradient de protons mou l'ATP-sintasa. El $FADH_2$ no passa pel complex I.

El quocient P/O (ATP formats per cada parell d'electrons que arriba a l'oxigen) no és un enter net. El valor acceptat avui és aproximadament 2,5 ATP per NADH mitocondrial i 1,5 ATP per $FADH_2$. Els 2 NADH de la glucòlisi són al citosol i els seus electrons han d'entrar al mitocondri. Amb la llançadora malat-aspartat rendeixen com un NADH (≈2,5 cadascun). Amb la llançadora del glicerol-fosfat, típica del múscul i del cervell, rendeixen com un $FADH_2$ (≈1,5).

Balanç per glucosa

Substrat: 2 ATP (glucòlisi) + 2 GTP (Krebs) = 4 ATP.

Coenzims: 10 NADH (2 citosol + 2 piruvat + 6 Krebs) i 2 $FADH_2$, si la llançadora és la del malat. 10 × 2,5 + 2 × 1,5 = 25 + 3 = 28, més els 4 de substrat: uns 32 ATP.

Si la llançadora és la del glicerol-fosfat, els 2 NADH citosòlics compten 1,5: 8 × 2,5 + 4 × 1,5 + 4 = 20 + 6 + 4 = 30 ATP.

Per això es diu uns 30–32 ATP per glucosa. El recompte clàssic dels llibres escolars assignava 3 ATP al NADH i 2 al $FADH_2$ i obtenia 38 (llançadora del malat, o bé un procariota, on no cal llançadora) o 36 (llançadora del glicerol-fosfat, que «costava» 2 ATP). Si un enunciat antic demana 36 o 38, expliqueu quin conveni feu servir. El valor que cal defensar avui és 30–32.

Per ampliar · no és matèria d'examen

El 2,5 i el 1,5 surten del nombre de protons: uns 10 H^+ per NADH (complexos I, III i IV) i uns 6 per $FADH_2$, repartits entre uns 4 H^+ per ATP exportat (sintasa més el transport d'ADP i fosfat). La c-subunitat de l'ATP-sintasa humana en té 8, i el quocient no és exactament 2,50. No cal aquest càlcul a la prova.

Mini-PAU resolt

Per què, sense oxigen, s'atura el cicle de Krebs encara que el Krebs no faci servir O_2 directament?

Perquè el NADH i el $FADH_2$ no es poden reoxidar a la cadena si l'oxigen no accepta els electrons. Sense NAD^+ i FAD lliures, el Krebs no pot continuar. La fermentació existeix precisament per reoxidar el NADH sense cadena.

La cadena és a la membrana interna del mitocondri. El complex I rep electrons del NADH; el II, del $FADH_2$, i per això el $FADH_2$ no bomba al complex I. Els electrons passen al III i al IV, i l'acceptor final és l'O_2, que amb protons fa aigua. El transport va lligat al bombament de protons cap a l'espai intermembranós. L'ATP-sintasa deixa tornar els protons a la matriu i amb aquest flux fosforila ADP. Això és la fosforilació oxidativa. No és una fosforilació a nivell de substrat: aquesta és la del GTP del Krebs i la de la glucòlisi, que no necessiten membrana.

El recompte modern, amb relacions P/O d'uns 2,5 per NADH i 1,5 per $FADH_2$, dona uns 30–32 ATP per glucosa. El clàssic escolar (3 i 2) dona 38 si els 2 NADH citosòlics es compten com a 3, o 36 si la llançadora del glicerol-fosfat els compta com a $FADH_2$. Les dues xifres s'han de saber situar: 30–32 és l'estimació actual; 36–38 és el conveni dels llibres antics. Cap de les dues és el rendiment de la glucòlisi sola.

Procedència, per glucosa	Coenzim	ATP amb 2,5 i 1,5
Glucòlisi, substrat	—	2
Glucòlisi	2 NADH	5 o 3, segons la llançadora
Piruvat → acetil-CoA	2 NADH	5
Krebs	6 NADH	15
Krebs	2 $FADH_2$	3
Krebs, substrat	2 GTP	2
Total		32 o 30

Mini-PAU resolt

Un inhibidor bloqueja el complex IV. Què passa amb el consum d'oxigen, amb el gradient de protons i amb el Krebs?

Els electrons no arriben a l'oxigen: el consum d'O_2 cau. La cadena s'embussa, perquè els transportadors queden reduïts i no poden acceptar-ne més. S'atura el bombament. Sense reoxidació del NADH, el Krebs i la piruvat deshidrogenasa es paren. La glucòlisi pot continuar només si hi ha fermentació que regeneri NAD^+. L'ATP-sintasa es queda sense gradient.

Exemple resolt

L'oligomicina bloqueja l'ATP-sintasa però no els complexos de la cadena. Per què, tot i així, la cadena també s'acaba aturant?

Perquè els protons no poden tornar i el gradient es fa tan gran que els complexos no tenen prou energia per continuar bombant. Cadena i sintasa estan acoblades pel gradient. Desacoblar (un desacoblador deixa passar protons sense fer ATP) rellança la cadena i l'energia es perd com a calor: és el que fan el teixit adipós bru i alguns verins.

Mini-PAU resolt

Calculeu l'ATP d'un NADH matricial i d'un $FADH_2$ amb el conveni 2,5 i 1,5, i amb el conveni escolar 3 i 2. Digueu en quin conveni el total per glucosa s'acosta a 30–32.

Amb 2,5 i 1,5: un NADH dona 2,5 ATP i un $FADH_2$ 1,5. És el conveni que, sumat com a la taula del tema, dona 30 o 32 segons la llançadora. Amb 3 i 2 surt el clàssic 36 o 38. Les dues respostes són acceptables si es diu quin conveni s'ha fet servir. Donar 38 com si fos una mesura experimental actual, sense dir-ho, és el que es penalitza.

Exemple resolt

El cianur bloqueja el complex IV. Per què no queda ATP de la fosforilació oxidativa, i quin ATP encara es pot fer, i on?

Sense complex IV els electrons no arriben a l'O_2, la cadena s'atura i el gradient cau. L'ATP-sintasa no té flux de protons. Encara es pot fer l'ATP de substrat de la glucòlisi, al citosol, si la fermentació regenera el NAD^+: 2 ATP per glucosa. El GTP del Krebs no, perquè el Krebs també s'atura sense NAD^+.

Un balanç sencer, amb els dos convenis

Es parteix d'una glucosa. Glucòlisi, al citosol: es paguen 2 ATP, se'n cobren 4, net 2 ATP, i queden 2 NADH i 2 piruvats. Cada piruvat, a la matriu, dona un acetil-CoA, un NADH i un CO_2. Dues vegades: 2 NADH i 2 CO_2. Cada acetil-CoA fa una volta de Krebs: 3 NADH, 1 $FADH_2$, 1 GTP i 2 CO_2. Dues voltes: 6 NADH, 2 $FADH_2$, 2 GTP i 4 CO_2. El CO_2 total és 6, que és el de la glucosa. El GTP es compta com a ATP.

Conveni actual, P/O 2,5 per NADH i 1,5 per $FADH_2$. Els 2 NADH de la glucòlisi, si la llançadora és la del malat-aspartat, compten com a NADH matricials: 2 × 2,5 = 5. Si és la del glicerol-fosfat, compten com a $FADH_2$: 2 × 1,5 = 3. Els 2 NADH del pont: 5. Els 6 del Krebs: 15. Els 2 $FADH_2$: 3. Més 2 ATP de la glucòlisi i 2 del GTP. Total 32 o 30. Aquest és el 30–32.

Conveni escolar, 3 i 2. Els mateixos NADH matricials donen 3, els $FADH_2$ donen 2. Els 8 NADH de dins (2 del pont i 6 del Krebs) donen 24. Els 2 $FADH_2$ donen 4. Els 2 NADH citosòlics donen 6 o 4 segons la llançadora. Més

4 de substrat. Total 38 o 36. Quan l'enunciat diu «calculeu segons el conveni de 3 i 2», es fa així i es diu. Quan no ho diu, es pot donar el 30–32 i esmentar que el clàssic és 36–38.

Mini-PAU resolt

Un NADH i un $FADH_2$ arriben a la cadena. Amb el conveni 2,5 i 1,5, quant ATP se'n fa, i per què el $FADH_2$ en fa menys si tots dos acaben a l'oxigen?

2,5 i 1,5. El $FADH_2$ entrega els electrons al complex II, no al I, i es bomba menys protons per aquell parell d'electrons. L'oxigen és el mateix acceptor; el que canvia és el tram de la cadena que es recorre. Per això no es pot dir «tots els coenzims reduïts valen igual».

3.5 Fermentacions

Sense acceptor final per a la cadena, la cèl·lula només pot treure ATP de la glucòlisi, però ha de reoxidar el NADH a NAD^+, si no la glucòlisi també s'atura. Això és la fermentació: el piruvat, o un derivat seu, fa d'acceptor orgànic dels electrons. No hi ha cadena ni mitocondri implicats. El balanç net des de glucosa és 2 ATP. És una degradació parcial: al producte final encara hi queda molta energia química.

A la fermentació làctica, el piruvat s'oxida? No: es redueix a lactat i el NADH passa a NAD^+. La fan el múscul esquelètic quan l'aport d'oxigen no cobreix la demanda, i bacteris com *Lactobacillus*, responsables del iogurt i del formatge. Equació neta: glucosa → 2 lactat, amb 2 ATP. El CO_2 no es desprèn.

A la fermentació alcohòlica el piruvat es descarboxila a acetaldehid i CO_2, i l'acetaldehid es redueix a etanol regenerant el NAD^+. La fan els llevats (*Saccharomyces*): pa, vi i cervesa. Neta: glucosa → 2 etanol + 2 CO_2, amb 2 ATP.




Figura 3.5. Les dues fermentacions regeneren NAD^+. El guany és el de la glucòlisi: 2 ATP.

Com ho diu la PAU i com ho diu la química

Les orientacions anomenen «respiració anaeròbica» el conjunt glucòlisi + fermentació. En microbiologia, respiració anaeròbica és una altra cosa: hi ha cadena de transport, però l'acceptor final no és l'O_2 sinó nitrat, sulfat o un altre inorgànic. Rendeix menys que la respiració aeròbica i més que la fermentació. Si l'enunciat diu «respiració anaeròbica» i parla de lactat o d'etanol, es refereix a la fermentació. A la resposta, feu servir el nom del procés (làctica o alcohòlica) i el balanç de 2 ATP.

Mini-PAU resolt

Compareu el rendiment de la respiració aeròbica i el de la fermentació làctica a partir d'una glucosa. Per què, si rendeix tan poc, la fermentació continua existint?

Aeròbica: uns 30–32 ATP (o 36–38 si l'enunciat imposa el conveni clàssic). Làctica: 2 ATP. La fermentació no depèn de l'oxigen ni de mitocondris, regenera el NAD^+ i és ràpida. En un múscul en dèficit d'oxigen, 2 ATP ara són millor que cap. En un llevat, n'hi ha prou per créixer mentre hi hagi sucre.

Sense oxigen, o sense cadena, el NADH de la glucòlisi s'ha de reoxidar d'una altra manera. La fermentació no fa més ATP que la glucòlisi: en fa 2 de nets per glucosa. El que fa és tornar NAD^+. A la làctica, el piruvat s'accepta els electrons i esdevé lactat. La fan el múscul en anaerobiosi i els lactobacils. A l'alcohòlica, el piruvat perd un CO_2, queda acetaldehid, i l'acetaldehid es redueix a etanol. La fan els llevats. El CO_2 de les bombolles del pa i de la cervesa és aquest, no el del Krebs.

	Acceptor dels electrons del NADH	Productes	CO_2?	ATP nets
Làctica	piruvat	lactat	no	2
Alcohòlica	acetaldehid	etanol + CO_2	sí, un per piruvat	2
Respiració	la cadena, i al final l'O_2	CO_2 + H_2O	sí, sis per glucosa	~30–32

Mini-PAU resolt

Un llevat en un pot tancat sense oxigen produeix etanol i CO_2, i 2 ATP per glucosa. Per què no fa el Krebs, si el CO_2 podria semblar del cicle?

Perquè sense oxigen la cadena no reoxida el NADH i el Krebs es para. El CO_2 és el de la descarboxilació del piruvat camí de l'etanol, un per piruvat, dos per glucosa, no els sis de la respiració. L'ATP és només el de la glucòlisi. Si s'obre el pot i entra oxigen, el llevat pot respirar i el rendiment puja: és l'efecte Pasteur.

Exemple resolt

El lactat del múscul és un cul-de-sac? Què en fa el fetge?

No es llença com a residu definitiu. El fetge el pot tornar a piruvat i, amb ATP, a glucosa (neoglucogènesi, el cicle de Cori). El múscul no fa neoglucogènesi. Per això el lactat és un deute temporal d'oxigen, no un producte final com l'etanol del llevat, que el llevat excreta.

Mini-PAU resolt

Un llevat i un múscul fermenten. Tots dos regeneren NAD^+. Qui desprèn CO_2, qui acumula lactat, i quant ATP net fa cadascun per glucosa?

El llevat, fermentació alcohòlica: desprèn CO_2 i fa etanol. El múscul, làctica: acumula lactat i no desprèn CO_2 en aquest pas. Tots dos, 2 ATP nets, els de la glucòlisi. Ni l'etanol ni el lactat són «energia de més»: són el destí dels electrons.

Exemple resolt

Per què el pa puja i el iogurt no fa bombolles, si tots dos són fermentacions?

Perquè només l'alcohòlica descarboxila el piruvat. El CO_2 és el gas de les bombolles. La làctica passa de piruvat a lactat sense perdre carboni. L'acidificació del iogurt és el làctic, no un gas. Són dues reaccions diferents amb el mateix objectiu de coenzim.

3.6 β-oxidació

Els àcids grassos són una reserva més energètica que la glucosa, però no es degraden per la glucòlisi. Al citosol, l'àcid gras s'activa a acil-CoA amb despesa equivalent a 2 ATP (l'ATP passa a AMP). L'acil-CoA entra a la matriu mitocondrial per la llançadora de la carnitina. Allà, la β-oxidació talla la cadena de dos en dos carbonis. Cada volta allibera un acetil-CoA i redueix un NAD^+ i un FAD.

Un àcid gras de n carbonis (n parell) dona n/2 acetil-CoA i fa (n/2 − 1) voltes. L'acetil-CoA entra al Krebs. No és el camí de la glucosa: un greix no es converteix en piruvat per aquesta via, i els animals no poden fer glucosa neta a partir d'acetil-CoA.

Exemple resolt · palmitat (C16)

8 acetil-CoA i 7 voltes (7 NADH i 7 $FADH_2$ de la β-oxidació), menys els 2 ATP de l'activació.

Amb el conveni actual (acetil-CoA ≈ 10 ATP: 3 NADH × 2,5 + 1 $FADH_2$ × 1,5 + 1 GTP): 8 × 10 + 7 × 2,5 + 7 × 1,5 − 2 = 80 + 17,5 + 10,5 − 2 = 106 ATP.

Amb el conveni clàssic (acetil-CoA = 12): 8 × 12 + 7 × 5 − 2 = 129 ATP. Si l'enunciat no diu quin conveni vol, escriviu 106 i mencioneu el 129 com a recompte escolar antic. El que segur que demanen és el sentit de la via: matriu, acetil-CoA, NADH i $FADH_2$, i que rendeix molt més que una glucosa.

La β-oxidació és a la matriu (als peroxisomes, una part, en alguns teixits; a batxillerat es localitza a la matriu). L'àcid gras s'activa a acil-CoA gastant l'equivalent de 2 ATP, perquè l'ATP passa a AMP. Cada volta treu dos carbonis en forma d'acetil-CoA i produeix 1 NADH i 1 $FADH_2$. Una cadena de 2n carbonis dona n acetil-CoA i n − 1 voltes. El palmitat té 16 carbonis: 8 acetil-CoA i 7 NADH i 7 $FADH_2$, menys el cost d'activació. Els acetil-CoA entren al Krebs si hi ha oxalacetat i oxigen. En dejú llarg, el fetge en desvia cap a cossos cetònics, que el cervell pot oxidar.

Mini-PAU resolt

Un àcid gras saturat de 18 carbonis entra en β-oxidació. Quants acetil-CoA i quantes voltes, i per què el nombre de voltes no és igual al d'acetils?

9 acetil-CoA (18/2). Voltes: 8, perquè l'última volta parteix un fragment de 4 carbonis en dos acetils i ja no cal una volta de més. En general, n acetils i n − 1 voltes. Cada volta: 1 NADH i 1 $FADH_2$. L'activació, a part, costa 2 ATP equivalents.

Exemple resolt

Per què un greix no es pot convertir en glucosa neta als animals, i un sucre sí que es pot convertir en greix?

L'acetil-CoA de la β-oxidació entra al Krebs unint-se a l'oxalacetat, i les dues descarboxilacions treuen dos carbonis: no hi ha guany net de carboni per fer oxalacetat. Sense oxalacetat de més, no hi ha neoglucogènesi des d'acetil-CoA. El piruvat de la glucòlisi sí que pot fer acetil-CoA (camí cap al greix) i també oxalacetat. El pas piruvat → acetil-CoA és irreversible. Per això el greix no torna a sucre, i el sucre sí que pot anar a greix.

Mini-PAU resolt

Un àcid gras de 12 carbonis, saturat, s'activa i entra en β-oxidació. Quants acetil-CoA, quantes voltes i quin cost d'activació en equivalents d'ATP?

6 acetil-CoA, 5 voltes (cada volta un NADH i un $FADH_2$), i 2 equivalents d'ATP perquè l'ATP passa a AMP. Els 6 acetils, si hi ha oxigen, entren al Krebs. No s'ha de restar el cost dues vegades: l'AMP es recupera gastant un altre ATP, i per això es compta com a dos, un sol cop.

Exemple resolt

En un dejuni llarg el fetge fabrica cossos cetònics. Per què no els fa servir ell com a única font, i qui se'n beneficia?

El fetge els exporta. El cervell, que no crema bé els àcids grassos, els pot oxidar quan la glucosa és escassa. El fetge els fa precisament perquè li sobra acetil-CoA de la β-oxidació i li falta oxalacetat, desviat a la neoglucogènesi. No és un residu tòxic en quantitat moderada; és un combustible alternatiu.

3.7 Anabolisme heteròtrof

L'anabolisme heteròtrof construeix molècules orgàniques a partir d'altres molècules orgàniques. No fixa CO_2. Tres processos, i només això:

La síntesi d'aminoàcids munta l'esquelet de carboni (que ve d'intermedis de la glucòlisi o del Krebs) i hi posa nitrogen, sovint per transaminació a partir de glutamat. Passa al citosol i a la matriu, segons l'aminoàcid. Els humans no fabriquem els aminoàcids essencials: els hem de menjar.

La síntesi de proteïnes és la traducció, als ribosomes, i gasta ATP i GTP. El mecanisme (codi, RNAt, fases) és al tema 5, com indiquen les orientacions. A l'esquema del metabolisme només cal situar-la com a via que consumeix aminoàcids i energia.

La lipogènesi fabrica àcids grassos al citosol, a partir d'acetil-CoA, i gasta NADPH. No és la β-oxidació al revés: són enzims diferents, compartiments diferents i coenzims diferents (NADPH aquí, NAD^+ i FAD allà). L'acetil-CoA mitocondrial surt cap al citosol en forma de citrat.

La neoglucogènesi fabrica glucosa a partir de precursors que no són glúcid: lactat, glicerol i alguns aminoàcids glucogènics. És al fetge (i al ronyó), no al múscul. No és la glucòlisi al revés: els tres passos irreversibles de la glucòlisi se salten amb enzims propis, i costa ATP. El múscul no té la glucosa-6-fosfatasa, de manera que encara que trenqui glicogen no allibera glucosa a la sang: la gasta ell. El fetge sí que en pot abocar.

La síntesi d'àcids grassos no és la β-oxidació al revés. És al citosol, fa servir NADPH i malonil-CoA, i afegeix dos carbonis per volta. La β-oxidació és a la matriu, fa NADH i $FADH_2$, i treu dos carbonis. Que les dues existeixin alhora seria un cicle fútil: la cèl·lula les separa de lloc i les regula de manera que quan una va, l'altra està frenada.

Exemple resolt

Després d'un dejuni, la glucèmia es manté. D'on surt la glucosa si el glicogen hepàtic ja és baix, i per què el cervell encara en depèn?

De la neoglucogènesi hepàtica, a partir d'aminoàcids i de glicerol. El cervell no fa β-oxidació de greixos a gran escala i depèn de la glucosa (o, en dejú llarg, dels cossos cetònics). El múscul no li pot passar la seva glucosa-6-fosfat. Per això el fetge és el que sosté la glucèmia.

Mini-PAU resolt

Un aminoàcid es transamina i el seu esquelet entra al Krebs com a oxalacetat. Es pot considerar glucogènic? I un que només doni acetil-CoA?

El que dona oxalacetat sí: l'oxalacetat pot sortir cap a la neoglucogènesi. El que només dona acetil-CoA és cetogènic: aquell carboni no fa glucosa neta als animals, pel mateix motiu que el greix. Alguns aminoàcids són les dues coses.

Mini-PAU resolt

El múscul té glicogen i el fetge també. Després d'unes hores sense menjar, qui sosté la glucosa de la sang, i quin enzim li falta al múscul per fer-ho?

El fetge. Té glucosa-6-fosfatasa, que treu el fosfat i deixa sortir la glucosa. El múscul no té aquest enzim: el glicogen muscular es queda com a glucosa-6-fosfat i el múscul el crema ell. Per això un exercici gasta el glicogen del múscul sense abocar glucosa a la sang.

Exemple resolt

Per què la síntesi d'àcids grassos al citosol i la β-oxidació a la matriu no es consideren la mateixa via reversible?


Perquè els enzims, el coenzim i el transport no coincideixen. La síntesi fa servir NADPH i malonil-CoA, i afegeix dos carbonis. La β-oxidació fa NADH i $FADH_2$, i en treu dos. Si anessin alhora al mateix lloc, gastarien energia sense guany. La separació de compartiment i la regulació ho impedeixen.

3.8 Fotosíntesi

La fotosíntesi oxigènica, la de plantes, algues i cianobacteris, fa servir llum per arrencar electrons de l'aigua, reduir $NADP^+$ i fosforilar ADP. Amb aquest ATP i aquest NADPH fixa CO_2 i en fa sucre. L'equació que mostra d'on surt l'oxigen és:

$6\ CO_2 + 12\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 + 6\ H_2O$

L'O_2 prové de l'aigua, no del CO_2. La forma simplificada $6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$ cancel·la sis aigües i amaga aquest fet. En eucariotes tot passa al cloroplast: la fase lluminosa a la membrana del tilacoide i el Calvin a l'estroma.



Estroma del cloroplast · cicle de Calvin

CO_2 + ribulosa-1,5-bisfosfat → 2 × 3-fosfoglicerat → triosa

Per cada CO_2 es gasten 3 ATP i 2 NADPH. La resta de trioses regenera la RuBP.

L'ATP i el NADPH els forma la fase lluminosa, a la membrana del tilacoide.

Figura 3.11. Fase lluminosa a la membrana del tilacoide i cicle de Calvin a l'estroma (Yikrazuul, adaptació d'AngelHerraez, CC BY-SA 3.0). El fotosistema II trenca l'aigua i allibera O_2. Els protons s'acumulen al lumen i tornen a l'estroma per l'ATP-sintasa. El fotosistema I redueix el $NADP^+$. A l'estroma, el Calvin fixa el CO_2 amb aquest ATP i aquest NADPH.

La fase lluminosa és a la membrana del tilacoide. Al fotosistema II, la llum excita el P680. El $P680^+$ és un oxidant tan fort que arrenca electrons de l'aigua: és la fotòlisi, i l'O_2 es desprèn aquí. Els electrons baixen de nivell pel camí plastoquinona → citocrom b_6f → plastocianina i alimenten un gradient de protons. Al fotosistema I, la llum excita el P700 i els electrons arriben a la ferredoxina i al $NADP^+$, que passa a NADPH. Aquest flux, obert, és la fotofosforilació acíclica: produeix ATP, NADPH i O_2. Uns 12 protons de tornada per l'ATP-sintasa corresponen a uns 2,6 ATP per cada 2 NADPH. El Calvin en gasta 3 i 2 per cada CO_2. Si el cloroplast necessita més ATP que NADPH, els electrons tornen del fotosistema I a la cadena sense fer NADPH ni trencar aigua: fotofosforilació cíclica, només ATP, que cobreix la diferència.




Figura 3.6. Esquema en Z. L'aigua es trenca al fotosistema II. El NADPH es forma al final del fotosistema I.

La fase fosca no vol dir que passi de nit: vol dir que no capta fotons directament. És el cicle de Calvin, a l'estroma, i s'atura a les fosques perquè li falten l'ATP i el NADPH de la fase lluminosa. La rubisco fixa CO_2 sobre la ribulosa-1,5-bisfosfat (RuBP, 5C) i en surten dues molècules de 3-fosfoglicerat. Reduir-les a gliceraldehid-3-fosfat gasta ATP i NADPH. Una part del sucre surt del cicle; la resta, amb més ATP, regenera la RuBP. Per cada CO_2 es gasten 2 NADPH i 3 ATP. Per a una glucosa (6 CO_2): 12 NADPH i 18 ATP.




Figura 3.7. Calvin a l'estroma. La rubisco fixa el CO_2. El balanç per CO_2 és 3 ATP i 2 NADPH.

= Fotosíntesi i respiració

Són complementàries, no inverses enzim a enzim. La fotosíntesi redueix el CO_2 i oxida l'aigua, amb llum, al cloroplast. La respiració oxida el sucre i redueix l'oxigen a aigua, al mitocondri, i l'energia queda en ATP. Una planta respira de dia i de nit. De dia, a la llum, la fotosíntesi sol superar la respiració i el balanç de gasos és d'entrada neta de CO_2.

Mini-PAU resolt

Un herbicida bloqueja el flux d'electrons entre el fotosistema II i el fotosistema I. Deixaran de formar-se O_2, ATP i NADPH? Podrà continuar el Calvin?

La fotòlisi s'atura perquè el P680 no es pot reoxidar: no hi haurà O_2. Tampoc no arribaran electrons al $NADP^+$: no hi haurà NADPH. L'ATP de la via acíclica també cau. Sense ATP ni NADPH el Calvin s'atura, encara que la rubisco no sigui la diana directa.

Fotosíntesi i respiració

	Fotosíntesi oxigènica	Respiració aeròbica
On, en una planta	cloroplast	citosol (glucòlisi) i mitocondri
Energia	llum	energia química del combustible
Gasos	entra CO_2, surt O_2	entra O_2, surt CO_2
L'aigua	es trenca (fotòlisi) i dona l'O_2	es forma a la cadena
Coenzim reduït	NADPH	NADH i $FADH_2$

No són la mateixa via al revés. Una planta respira de dia i de nit. De dia, a la llum, la fotosíntesi sol superar la respiració i el balanç net és d'entrada de CO_2.

La fase lluminosa és a la membrana del tilacoide. El fotosistema II treu electrons a l'aigua: és la fotòlisi, i l'O_2 que es desprèn ve d'aquí, no del CO_2. Els electrons pugen de nivell amb la llum, baixen per una cadena cap al fotosistema I i, pel camí, es bomben protons al lumen. El fotosistema I, amb un altre fotó, passa els electrons al $NADP^+$, que esdevé NADPH. Els protons tornen a l'estroma per l'ATP-sintasa i fan ATP. Aquest ATP és de fotofosforilació, no de mitocondri.

El Calvin és a l'estroma. La rubisco fixa CO_2 sobre la ribulosa-1,5-bisfosfat i el producte es parteix en dues molècules de 3-fosfoglicerat. Reduir-les a triosa gasta ATP i NADPH. Per cada CO_2 fan falta 2 NADPH i 3 ATP. Per una glucosa, 6 CO_2: 12 NADPH i 18 ATP. Una part de les trioses es queda al cicle per regenerar la ribulosa; una part surt cap a midó (a l'estroma) o cap a sacarosa (al citosol).

La rubisco també pot fixar O_2 en lloc de CO_2: és la fotorespiració, que no fa sucre i gasta energia. Puja quan hi ha molt O_2, poc CO_2 i calor. Les plantes C4 concentren CO_2 a les cèl·lules de la beina i redueixen aquest problema. No és matèria nuclear de la prova, però si un enunciat en parla, la idea és aquesta: no és una fotosíntesi sense llum.

Mini-PAU resolt

Un herbicida bloqueja el pas d'electrons entre el fotosistema II i el I. Què passa amb l'O_2, el NADPH i el Calvin?

La fotòlisi es para perquè els electrons no tenen on anar: cau l'alliberament d'O_2. No es fa NADPH ni es bomba el gradient, de manera que cau l'ATP de la fotofosforilació. Sense ATP ni NADPH el Calvin s'atura, encara que la rubisco no sigui l'objectiu del verí. La respiració mitocondrial, en canvi, no fa servir aquesta cadena.

Exemple resolt

De nit una planta consumeix O_2 i desprèn CO_2. Vol dir que no té cloroplasts?

No. De nit no hi ha fase lluminosa, el Calvin es para per falta d'ATP i NADPH, i la respiració mitocondrial continua. Els cloroplasts hi són; el que no hi és, és la llum. De dia les dues vies van alhora i, si la planta creix, la fotosíntesi supera la respiració en el balanç net.

Mini-PAU resolt

Per fixar 6 CO_2 al Calvin fan falta 18 ATP i 12 NADPH. D'on surten, en quin compartiment es gasten, i per què no serveix el NADH mitocondrial?

Surten de la fase lluminosa, a la membrana del tilacoide. Es gasten a l'estroma, on és el Calvin. El NADH mitocondrial no travessa fins al cloroplast i, a més, els enzims del Calvin reconeixen NADPH. Són coenzims de feines diferents. Comptar el NADH de la respiració com si alimentés el Calvin és barrejar les dues vies.

Exemple resolt

Un experiment amb aigua marcada amb ^{18}O desprèn oxigen marcat, i un amb CO_2 marcat no. Quina conclusió sobre l'origen de l'O_2 és la correcta?

L'O_2 surt de l'aigua, de la fotòlisi al fotosistema II. No surt del CO_2. El CO_2 marcat apareix al sucre i a l'aigua del Calvin, no al gas. És l'experiment que va tancar la discussió, i és el que es demana saber en una frase: l'oxigen de la fotosíntesi ve de l'H_2O.

El balanç del Calvin es demana per CO_2 o per glucosa, i no s'han de barrejar. Per un CO_2: la rubisco el fixa, surten dues molècules de tres carbonis, i reduir-les i regenerar la ribulosa costa 2 NADPH i 3 ATP. Per sis CO_2, que són els d'una glucosa, 12 NADPH i 18 ATP. Aquests no surten del mitocondri. Surten de la fase lluminosa. L'aigua es trenca al fotosistema II, a la banda del lumen. L'oxigen que se'n va és el de l'aigua. Els protons queden al lumen, tornen a l'estroma per l'ATP-sintasa, i el NADPH es forma a l'estroma, al final del fotosistema I. El Calvin, que gasta les dues coses, és a l'estroma. Si es diu que el Calvin és al tilacoide, el balanç de protons queda al revés.

Mini-PAU resolt

Una planta fixa 12 CO_2. Quants NADPH i quants ATP gasta el Calvin, i quants O_2 ha hagut de desprendre la fase lluminosa si la relació és la de la fotosíntesi oxigènica, un O_2 per cada dos aigua, amb sis O_2 per glucosa?

12 CO_2 són dues glucoses. NADPH: 12 × 2 = 24. ATP: 12 × 3 = 36. O_2: dues glucoses, 12 O_2. El CO_2 no és la font de l'O_2; la relació 1:1 entre CO_2 fixat i O_2 després és el balanç global, no el mecanisme. El mecanisme continua essent la fotòlisi.

3.9 Quimiosíntesi i fotosíntesi bacteriana

La fotosíntesi bacteriana no és tota igual. Els cianobacteris fan la mateixa fotosíntesi oxigènica que les plantes: trenquen aigua i alliberen O_2, i van ser els responsables de l'oxigen atmosfèric. Els bacteris porpra i els verds del sofre fan fotosíntesi anoxigènica: el donador d'electrons no és l'aigua sinó, per exemple, H_2S, i no alliberen O_2. Tenen bacterioclorofil·la i un sol fotosistema. No cal el detall dels centres de reacció.

La quimiosíntesi no fa servir llum. Bacteris quimiolitòtrofs oxiden un compost inorgànic (NH_4^+ els nitrificants, H_2S els del sofre, Fe^{2+} alguns del ferro) i amb l'energia obtinguda fan ATP i poder reductor, i fixen CO_2, sovint pel cicle de Calvin. *Nitrosomonas* oxida amoni a nitrit; *Nitrobacter*, nitrit a nitrat. Són autòtrofs químics, no fotosintètics.




Figura 3.8. Localització en una cèl·lula eucariota. Els procariotes fan les mateixes químiques a la membrana i al citoplasma, sense orgànuls.

La quimiosíntesi obté energia oxidant un compost inorgànic (H_2S, NH_3, nitrit, Fe^{2+}, H_2), no de la llum. Els electrons d'aquesta oxidació alimenten una cadena i es fa ATP, i sovint poder reductor per fixar CO_2. La fan bacteris i arqueus. No és fotosíntesi sense pigment: no hi ha fotons. Els nitrificants (amoníac → nitrit, i nitrit → nitrat) són l'exemple que enllaça amb el cicle del nitrogen.

La fotosíntesi bacteriana no oxigènica fa servir un donador que no és l'aigua (per exemple H_2S) i no desprèn O_2. Té un sol fotosistema, no dos. Els cianobacteris sí que fan la fotosíntesi oxigènica, amb aigua i dos fotosistemes, i són el parent del cloroplast. Dir «bactèria» no diu quina de les dues.

Exemple resolt

Un bacteri oxida NH_3 a nitrit i fixa CO_2 a les fosques. És fotosíntesi, fermentació o quimiosíntesi?

Quimiosíntesi. L'energia surt de l'oxidació de l'amoníac, no de la llum ni d'un substrat orgànic fermentat. El CO_2 es fixa amb l'ATP i el poder reductor que aquesta oxidació ha permès. Al cicle del nitrogen, aquest pas és la nitrificació.

Mini-PAU resolt

Per què un cianobacteri desprèn O_2 i un bacteri porpra del sofre, que també fa fotosíntesi, no?

Perquè el cianobacteri treu els electrons a l'aigua i l'aigua, en partir-se, dona O_2. El bacteri porpra els treu al sulfur d'hidrogen i el residu és sofre, no oxigen. Tots dos fan servir llum. El donador és el que decideix si hi ha O_2.

Mini-PAU resolt

Classifiqueu tres microorganismes: un que oxida H_2S a la llum i no desprèn O_2; un que oxida NH_3 a les fosques i fixa CO_2; un que fa servir H_2O a la llum i desprèn O_2.

El primer fa fotosíntesi no oxigènica (el donador és el sulfur). El segon fa quimiosíntesi (nitrificant). El tercer fa fotosíntesi oxigènica (cianobacteri o cloroplast). La llum separa els dos primers. L'O_2 separa el primer del tercer. Cap dels tres no fermenta: fermentar seria oxidar un substrat orgànic sense cadena.

Exemple resolt

Per què un nitrificant es considera autòtrof si no té pigments?

Perquè fixa CO_2. Autòtrof vol dir que la font de carboni és el CO_2, no que la font d'energia sigui la llum. La llum és el que distingeix fotoautòtrof de quimioautòtrof. El nitrificant treu l'energia de l'amoníac i el carboni de l'aire. És autòtrof i no fotosintètic.

3.10 Mapa del tema

L'esquema que les orientacions donen per bo és el de la UB de biologia de la PAU (esquema general del metabolisme). El que heu de poder assenyalar-hi a cegues és: glucòlisi al citosol; piruvat cap a acetil-CoA o cap a fermentació; acetil-CoA cap al Krebs o, en sentit biosintètic, cap a àcids grassos; Krebs i cadena al mitocondri; β-oxidació abocant acetil-CoA; fotosíntesi i quimiosíntesi com a entrades de matèria inorgànica; aminoàcids entre el Krebs i les proteïnes. La fletxa «proteïnes» no s'explica aquí: és la traducció.

Resum

Via	On	Entra	Surt	Coenzims i ATP
Glucòlisi	citosol	glucosa	2 piruvat	net +2 ATP, +2 NADH
Piruvat → acetil-CoA	matriu	piruvat	acetil-CoA + CO_2	+1 NADH (×2 per glucosa)
Krebs	matriu	acetil-CoA	2 CO_2	3 NADH, 1 $FADH_2$, 1 GTP
Cadena	membrana interna	NADH, $FADH_2$, O_2	H_2O, ATP	≈2,5 i ≈1,5 ATP
Fermentació	citosol	piruvat + NADH	lactat, o etanol + CO_2	net 2 ATP des de glucosa
β-oxidació	matriu	acil-CoA	acetil-CoA	1 NADH i 1 $FADH_2$ per volta
Fase lluminosa	tilacoide	H_2O, llum, $NADP^+$, ADP	O_2, NADPH, ATP	el NADPH és de l'anabolisme
Calvin	estroma	CO_2, ATP, NADPH	triosa, i es regenera RuBP	3 ATP i 2 NADPH per CO_2

Errors típics a la PAU

- Posar la glucòlisi al mitocondri o el Krebs al citosol.
- Dir que l'oxigen es converteix en CO_2, o que el CO_2 de la fotosíntesi es converteix en O_2.
- Donar 38 ATP com si fos el valor real, sense dir que és el conveni clàssic.
- Comptar el NADH de la fermentació com si anés a la cadena.
- Confondre NADH i NADPH.
- Dir que la fase fosca només passa de nit, o situar-la al tilacoide.
- Tractar la β-oxidació i la lipogènesi com la mateixa via en dos sentits.

Glossari

Fosforilació a nivell de substrat

Formació d'ATP (o GTP) per transferència directa d'un fosfat, sense cadena ni gradient.

Fosforilació oxidativa
: Formació d'ATP acoblada a la cadena respiratòria i al gradient de protons.

Quimiosmosi
: Ús d'un gradient de protons per fer girar l'ATP-sintasa.

P/O
: ATP obtinguts per parell d'electrons que redueix un àtom d'oxigen. Avui: ≈2,5 (NADH) i ≈1,5 ($FADH_2$).

Fermentació
: Reoxidació del NADH per un acceptor orgànic, sense cadena. Net: 2 ATP per glucosa.

Fotòlisi
: Trencament de l'aigua al fotosistema II, amb alliberament d'O_2.

Rubisco
: Enzim que fixa CO_2 sobre la RuBP al cicle de Calvin.

Quimiosíntesi
: Fixació de CO_2 amb energia d'oxidar un compost inorgànic, sense llum.

Autoavaluació

1. Escriviu el balanç net de la glucòlisi per a una molècula de glucosa i digueu en quin compartiment ocorre. Indiqueu també per què el guany d'ATP no és de quatre, tot i que se'n formen quatre.

   La glucòlisi ocorre al citosol. El balanç net és: glucosa + 2 NAD^+ + 2 ADP + 2 P_i → 2 piruvat + 2 NADH + 2 ATP + 2 H^+ + 2 H_2O. Se'n formen quatre d'ATP a la segona meitat de la via, però els dos primers passos en gasten dos per fosforilar la glucosa i la fructosa-6-fosfat. El guany net és, per tant, de dos ATP, més dos NADH. Aquest NADH s'ha de reoxidar després, o la via s'atura per falta de NAD^+. No s'hi han de sumar els ATP de la respiració: l'enunciat demana només la glucòlisi.

2. Per una glucosa, quants NADH, $FADH_2$, GTP i CO_2 produeix el cicle de Krebs, sense comptar la descarboxilació del piruvat? Expliqueu d'on surt el factor 2.

   Cada glucosa dona dos piruvats i, després de la descarboxilació, dos acetil-CoA. El cicle gira, doncs, dues vegades. Cada volta, per un acetil-CoA, produeix 3 NADH, 1 $FADH_2$, 1 GTP i 2 CO_2. Dues voltes fan 6 NADH, 2 $FADH_2$, 2 GTP i 4 CO_2. El factor 2 no és un rendiment arbitrari: és el nombre d'acetils que surten d'una glucosa. La descarboxilació del piruvat, que l'enunciat demana de no comptar, afegiria encara 2 NADH i 2 CO_2. L'oxigen no és substrat del cicle; fa falta després, a la cadena, per reoxidar aquests coenzims.

3. Per què el rendiment acceptat avui de la respiració aeròbica d'una glucosa no és de 36 ni de 38 ATP? Situeu aquestes xifres respecte del conveni actual.

   36 i 38 ATP surten del conveni escolar antic, que assigna 3 ATP a cada NADH i 2 a cada $FADH_2$. Les mesures actuals de la relació P/O són més baixes: uns 2,5 ATP per NADH i uns 1,5 per $FADH_2$. A més, els dos NADH de la glucòlisi es fan al citosol i els seus electrons entren al mitocondri per una llançadora, que pot rendir com un NADH o com un $FADH_2$. Amb aquests valors, el total cau a uns 30–32 ATP per glucosa. 36 i 38 no són un error de suma si s'explicita el conveni; són un conveni superat. En cap cas no són el rendiment de la glucòlisi sola, que és de 2 ATP.

4. La fermentació alcohòlica desprèn CO_2 i la làctica no. D'on surt aquest CO_2, i quin és el balanç net d'ATP de les dues fermentacions per glucosa? Per què no és més alt?

   A la fermentació alcohòlica el piruvat es descarboxila i dona acetaldehid i CO_2; l'acetaldehid es redueix després a etanol i així es regenera el NAD^+. A la làctica el piruvat es redueix directament a lactat, sense perdre carboni, i per això no hi ha CO_2. En totes dues el balanç net és de 2 ATP per glucosa, els de la glucòlisi. No n'hi ha més perquè no funcionen ni el cicle de Krebs ni la cadena respiratòria: la fermentació no existeix per rendir energia, sinó per reoxidar el NADH quan no hi ha oxigen que accepti els electrons.

5. En la fotosíntesi oxigènica, on es trenca l'aigua i on es fixa el CO_2? Justifiqueu per què l'O_2 que es desprèn no prové del CO_2.

   L'aigua es trenca al fotosistema II, a la membrana del tilacoide: és la fotòlisi, i l'oxigen molecular que se'n desprèn és el de l'aigua. El CO_2 es fixa a l'estroma, al cicle de Calvin, per la rubisco, sobre la ribulosa-1,5-bisfosfat. L'oxigen del CO_2 no es converteix en O_2; queda en els productes del cicle. La prova clàssica és que l'aigua marcada amb ^{18}O dona oxigen gasós marcat, i el CO_2 marcat no. Confondre els dos compartiments —dir que el Calvin és al tilacoide o que l'oxigen surt del CO_2— inverteix la fase lluminosa i la fase fosca.

6. Un bacteri oxida amoni i fixa CO_2 en absència de llum. Com s'anomena aquest metabolisme i en què es diferencia del d'un cianobacteri?

   És quimiosíntesi, i el bacteri és quimioautòtrof: la font de carboni és el CO_2 i la font d'energia és l'oxidació d'un compost inorgànic, aquí l'amoni, no la llum. Un cianobacteri també fixa CO_2, però obté l'energia de la llum i els electrons de l'aigua, de manera que desprèn O_2: fa fotosíntesi oxigènica. Tots dos són autòtrofs, perquè el carboni els ve del CO_2. El que els separa és la font d'energia i el fet que només el cianobacteri produeix oxigen.

4. Genètica mendeliana

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU

Entren els problemes de monohibridisme i dihibridisme, autosòmics i lligats al sexe, la codominància i la dominància incompleta, els pedigrís, la probabilitat i el risc a partir de freqüències. Cal distingir genotip i fenotip, dominant i recessiu, homozigot, heterozigot i hemizigot. El lligament i la recombinació es relacionen amb la meiosi (tema 2). Els caràcters quantitatius i l'herència poligènica es demanen a nivell conceptual. Hardy-Weinberg és al tema 6, perquè les orientacions el lliguen a l'evolució com a canvi de freqüències.

4.1 Conceptes i lleis de Mendel

Un gen és un fragment de DNA que determina un caràcter (o una part d'un caràcter). Un al·lel és una versió d'aquest gen. En un diploide hi ha dos al·lels, un a cada homòleg. Si són iguals, l'individu és homozigot; si són diferents, heterozigot. El genotip és la combinació d'al·lels; el fenotip, el caràcter observable. Un al·lel dominant es manifesta en heterozigosi; un de recessiu, només en homozigosi. Això no vol dir que el dominant sigui «el bo» ni el més freqüent a la població.

La llei de la segregació: els dos al·lels d'un individu se separen en formar gàmetes, i cada gàmeta n'hereta un. La base cel·lular és l'anafase I (i la II, per a les cromàtides). La llei de la transmissió independent: al·lels de gens situats en cromosomes diferents s'hereten amb independència. Si són al mateix cromosoma, estan lligats i la llei no s'aplica, llevat que la recombinació els separi.

Notació

Al·lel dominant: lletra majúscula (A). Recessiu: la mateixa lletra minúscula (a). En herència lligada a l'X s'escriu l'al·lel com a superíndex del cromosoma: X^H, X^h, Y. No es posa al·lel al cromosoma Y si el gen no hi és.

Un gen és un tram d'informació heretable. L'al·lel n'és una versió. El genotip són els al·lels que l'individu porta; el fenotip, el que se'n manifesta. Homozigot: els dos al·lels iguals. Heterozigot: diferents. Dominant és el que es veu a l'heterozigot; recessiu, el que només es veu en homozigosi. Això és una relació entre al·lels, no una virtut de l'al·lel: el mateix al·lel pot ser dominant per a un caràcter i no per a un altre.

La primera llei, la de la segregació, diu que els dos al·lels d'un individu se separen en fer gàmetes, i cada gàmeta n'hereta un. És la meiosi I. La segona, la de la independència, diu que al·lels de gens diferents s'hereten per separat. Només és certa si els gens són a cromosomes diferents o tan lluny al mateix cromosoma que es recombinen lliurement. Si estan lligats, la segona llei no s'aplica i cal comptar recombinants.

Exemple resolt

Un individu Aa fa gàmetes. Quina fracció porten A, i per què no en pot fer de genotip Aa?

La meitat. A la meiosi I els dos al·lels se separen. Un gàmeta és haploide: porta un sol al·lel d'aquest gen. «Gàmeta Aa» seria diploide i no és un gàmeta. L'error apareix quan es fa el quadre de Punnett posant Aa en una casella de gàmeta.

Mini-PAU resolt

Per què la segona llei de Mendel falla si els dos gens són a 5 centimorgan l'un de l'altre?

Perquè estan lligats: viatgen al mateix cromosoma i només es separen si hi ha un entrecreuament entre ells, que a 5 cM passa en un 5 % dels gàmetes. Els parentals surten molt més que els recombinants. La independència prediciria un 50 % de recombinants. La llei no és falsa; té un domini, i el lligament n'és l'excepció que la prova també demana.

Mini-PAU resolt

Un individu de genotip AaBb, gens independents, fa un gàmeta. Quina probabilitat té de ser AB? I per què la resposta no és ¾?

És ¼. Per a A, ½; per a B, ½; independents, producte ¼. El ¾ seria la probabilitat que un fill d'Aa × Aa mostri el fenotip dominant, que és una altra pregunta. El gàmeta no té fenotip dominant: té un al·lel de cada gen. Barrejar la fracció del gàmeta amb la del fenotip del fill és l'error més comú del tema.

Exemple resolt

Es diu que un al·lel és dominant perquè és «el bo» o «el més freqüent». Quines dues correccions cal fer?

Dominant només vol dir que es veu a l'heterozigot. No diu res de si la funció és la salvatge o la patològica: hi ha malalties dominants. I no diu res de la freqüència: un al·lel rar pot ser dominant. Freqüència i dominància es mesuren amb dades diferents.

4.2 Monohibridisme

Encreuament d'un sol gen amb dominància completa. Aa × Aa dona genotips 1/4 AA, 1/2 Aa, 1/4 aa i fenotips 3:1. AA × aa dona tota la descendència Aa, fenotip dominant. L'encreuament prova d'un individu de fenotip dominant i genotip desconegut és creuar-lo amb aa: si surt algun fill recessiu, el progenitor era Aa; si tota la descendència és dominant i la mostra és gran, el més probable és AA.




Figura 4.1. Punnett d'Aa × Aa. Genotips 1:2:1. Amb dominància completa, fenotips 3:1.

Si la dominància és incompleta, l'heterozigot té un fenotip intermedi (flor vermella RR × blanca rr → rosa Rr). L'F2 és 1:2:1 també en fenotips. A la codominància els dos al·lels es manifesten sencers. Als grups ABO, I^A i I^B són codominants i i és recessiu. Els genotips són I^AI^A i I^Ai (grup A), I^BI^B i I^Bi (grup B), I^AI^B (grup AB) i ii (grup O). Un pare A i una mare B poden tenir fills dels quatre grups si tots dos són heterozigots (I^Ai × I^Bi).

Exemple resolt

Una planta de flor vermella, dominància incompleta, es creua amb una de rosa. Quina proporció de blanques s'espera?

Vermella és RR, rosa és Rr. RR × Rr → 1/2 RR i 1/2 Rr. Cap rr. La proporció de blanques és 0. Si l'enunciat hagués dit «dominància completa», vermell podria ser RR o Rr i caldria més informació.

Mini-PAU resolt

El text diu: «només emmalalteixen les persones que han heretat l'al·lel defectuós dels dos progenitors; afecta nois i noies; el gen és al cromosoma 1». Quin patró és?

Recessiu, perquè calen dues còpies. Autosòmic, perquè el cromosoma 1 no és sexual i afecta els dos sexes. No és lligat a l'X.

Encreuament Aa × Aa, amb dominància completa. Gàmetes ½ A i ½ a per cada banda. El quadre dona ¼ AA, ½ Aa i ¼ aa. Genotips 1:2:1. Fenotips 3:1, perquè AA i Aa es veuen igual. Encreuament prova: un dominant de fenotip, de genotip desconegut, amb un recessiu aa. Si en surt algun fill recessiu, el desconegut era Aa. Si en surten molts i tots dominants, era AA. Amb pocs fills no es pot assegurar l'homozigot: l'absència d'un recessiu pot ser atzar.

Mini-PAU resolt

En un encreuament Aa × aa neixen 40 fills. Quants s'esperen de cada fenotip si A és dominant, i quina probabilitat té un fill concret de ser aa?

S'esperen 20 i 20. La probabilitat d'un fill aa és ½, perquè l'únic gàmeta del recessiu és a, i la meitat dels gàmetes de l'heterozigot són a. No és ¼: el ¼ és d'Aa × Aa. Cada fill és independent; haver tingut ja tres aa no fa pujar la probabilitat del quart.

Exemple resolt

Una flor vermella i una blanca donen totes les filles roses, i roses × roses dona 1 vermella : 2 roses : 1 blanca. És dominància completa?

No. És dominància incompleta. L'heterozigot té fenotip propi, i per això el 1:2:1 es veu al fenotip, no només al genotip. Si fos completa, roses × roses no existiria com a categoria, i vermell × blanc donaria tot vermell o tot blanc.

Mini-PAU resolt

De l'encreuament de dues plantes de llavor groga en surt una de verda. El groc és dominant. Quins genotips tenien els pares, i quina fracció de verds s'espera a la llarga?

Els dos pares eren heterozigots. Si un fos homozigot dominant, no podria sortir cap verd. La fracció esperada de verds és ¼. Un sol fill verd no diu que la proporció de la mostra sigui ¼; diu que els dos portaven l'al·lel. Amb molts fills, la proporció s'hi acosta.

Exemple resolt

Un encreuament prova amb un recessiu dona 48 dominants i 52 recessius. L'individu provat era homozigot o heterozigot?

Heterozigot. Un homozigot dominant no dona fills recessius. La proporció propera a 1:1 és la d'Aa × aa. Amb 100 fills, 48 i 52 és compatible amb 1:1 i incompatible amb «tots dominants».

4.3 Dihibridisme i lligament

Dos gens independents, dominància completa, F1 doble heterozigot AaBb × AaBb: cada gen fa 3:1 i, com que són independents, els fenotips es multipliquen. Surt 9 A_B_ : 3 A_bb : 3 aaB_ : 1 aabb. Els genotips són 16 combinacions igualment probables si es fa el quadre de 4 × 4. Un encreuament prova AaBb × aabb, amb gens independents, dona 1:1:1:1.

Si els dos gens són al mateix cromosoma, estan lligats. Un dihíbrid en cis (AB al mateix cromosoma, ab a l'homòleg) produeix sobretot gàmetes parentals AB i ab. Els recombinants Ab i aB només apareixen si hi ha hagut entrecreuament entre els dos loci a la profase I. La freqüència de recombinació és el nombre de descendents recombinants dividit pel total. Es mesura en centimorgans: 1 % de recombinació = 1 cM. No és una distància en nucleòtids, i per damunt del 50 % els gens es comporten com si no estiguessin lligats.

Exemple resolt

Un encreuament prova dona 405 parentals i 95 recombinants. Quina distància hi ha entre els gens?

RF = 95 / 500 = 0,19 = 19 %. La distància és de 19 cM. Si hagués sortit prop del 50 %, no podríeu afirmar que estan lligats.

Idea clau

9:3:3:1 només si hi ha independència i dominància completa als dos gens. Si el resultat s'aparta fortament d'això i els parentals sobren, penseu en lligament abans que en un error de recompte.

El 9:3:3:1 només val si els dos gens són independents i hi ha dominància completa a tots dos. Si el recompte s'aparta d'això i els parentals són majoria, els gens estan lligats. La distància en centimorgans és el percentatge de recombinants. Un 50 % vol dir que es comporten com si no estiguessin lligats: o són lluny al mateix cromosoma, o són a cromosomes diferents.

Exemple resolt

Encreuament prova: 430 parentals i 70 recombinants. Estan lligats? A quina distància?

70/500 = 0,14. Sí que estan lligats, a 14 cM. Si haguessin estat independents, els quatre tipus haurien sortit prop del 25 % cadascun.

Dos gens independents, AaBb × AaBb, amb dominància completa als dos. Cada caràcter va a 3:1 i, com que són independents, el fenotip doble dominant és ¾ × ¾ = 9/16. El doble recessiu és ¼ × ¼ = 1/16. Els altres dos són 3/16 cadascun. El 9:3:3:1 és això, no una llista per memoritzar sense el producte. Si els gens estan lligats, aquestes fraccions no surten: surten sobretot els dos tipus parentals.

La freqüència de recombinació és recombinants / total. En centimorgans, es multiplica per 100. Un 50 % no demostra que siguin a cromosomes diferents: poden ser lluny al mateix. Un valor clarament per sota de 50 %, amb prou individus, demostra lligament. L'entrecreuament és a la profase I, entre cromàtides no germanes.

Mini-PAU resolt

Encreuament prova d'un dihíbrid. Neixen 405 d'un tipus parental, 395 de l'altre, 48 d'un recombinant i 52 de l'altre. Estan lligats? A quina distància?

Total 900. Recombinants 100. 100/900 = 0,111. Sí que estan lligats, a uns 11 cM. Si fossin independents, cada tipus hauria de ser prop de 225. Els parentals són gairebé deu vegades els recombinants.

Exemple resolt

Per què un 9:3:3:1 amb només 16 fills no es pot donar per demostrat, encara que els números encaixin exactament?

Perquè 16 és la mida d'una mostra on l'atzar pesa molt. El 9:3:3:1 és una esperança, no un resultat obligat de cada ventrada. Amb 16 individus, moltes altres proporcions són compatibles amb gens independents. La prova, quan dona dades, en dona centenars, o demana la probabilitat d'un sol descendent, que sí que es pot calcular amb poques dades.

Mini-PAU resolt

En un encreuament prova surten quatre fenotips: 140, 135, 145 i 130. Estan lligats els gens? I si haguessin sortit 430, 420, 25 i 25?

El primer cas és compatible amb independència: els quatre tipus són gairebé iguals, prop del 25 %. No hi ha lligament detectable. El segon cas sí: els dos primers són parentals i els dos últims, recombinants. Recombinants 50 de 900, uns 5,6 cM. La diferència no és el nombre total, és com es reparteix.

Exemple resolt

Dos gens a 50 cM es comporten com si no estiguessin lligats. Per què un mapa pot, tot i així, posar-los al mateix cromosoma?

Perquè la distància es construeix sumant trams curts. A i B poden ser a 50 cM i, pel mig, A–C i C–B a 25. Directament, A i B recombinen un 50 % i no es distingeixen de gens independents. El mapa no es fa amb una sola distància llarga.

La distància es calcula només amb un encreuament prova, on es veu el genotip de cada descendent. Es sumen els dos tipus recombinants, es divideix pel total i es multiplica per 100. Els parentals són els dos grups grans. Si els quatre grups són semblants, no hi ha lligament i no es dona una distància: es diu que són independents o tan lluny que no es distingeixen.

Mini-PAU resolt

Dades: 610, 590, 45, 55. Calculeu la distància i digueu quins són els parentals.

Total 1.300. Els parentals són 610 i 590. Els recombinants, 45 i 55, sumen 100. 100/1.300 = 0,0769. Distància 7,7 cM, que es pot deixar en 7,7 o en 8 segons les xifres significatives de l'enunciat. No es calcula 610/1.300: això és la freqüència d'un parental, no la distància.

4.4 Herència lligada al sexe

En els humans, XX és femení i XY masculí pel que fa als cromosomes sexuals. Els gens de la regió diferencial de l'X no tenen parella a l'Y: els homes són hemizigots. Un sol al·lel recessiu a l'X ja es manifesta en l'home. Les dones només el manifesten si són homozigotes.

Els exemples clàssics són l'hemofília i el daltonisme, tots dos recessius lligats a l'X. Una mare portadora X^HX^h i un pare sa X^HY tenen, en esperança: filles totes sanes (la meitat portadores) i fills homes, la meitat afectats. Un pare afectat X^hY i una mare sana no portadora X^HX^H tenen filles totes portadores (el pare els passa el seu X^h) i fills homes tots sans (el pare els passa l'Y, i l'X els ve de la mare). No hi ha transmissió d'home afectat a fill home.

Lligat a l'X recessiu · mare portadora × pare sa

$X^HX^h \times X^HY$

Fills: ½ X^HX^H noia sana, ½ X^HX^h noia portadora,
½ X^HY noi sa, ½ X^hY noi afectat.

Exemples clàssics: hemofília i daltonisme.

Figura 4.4. Mare portadora i pare sa: la meitat dels fills homes, en esperança, són afectats. Cap filla no ho és, però la meitat són portadores.

Un caràcter dominant lligat a l'X es manifesta en totes les filles d'un home afectat, perquè totes reben el seu X. Un caràcter de l'Y (holàndric) passa d'home a home i a cap dona; és poc freqüent i gairebé no surt als problemes.

Mini-PAU resolt

Una dona no hemofílica, filla d'un pare hemofílic, té fills amb un home no hemofílic. Quina probabilitat té un fill home de ser hemofílic?

El pare de la dona és X^hY i li ha passat X^h. Ella és X^HX^h. L'home és X^HY. Un fill home rep l'Y del pare i l'X de la mare: la meitat de vegades aquest X és X^h. La probabilitat és 1/2. Una filla no serà hemofílica (el pare li dona X^H), però tindrà 1/2 de ser portadora.

Exemple resolt

Un home hemofílic i una dona sana no portadora tenen una filla. Quina probabilitat té aquesta filla de ser hemofílica? I de ser portadora?

El pare li passa el seu X (X^h) i la mare un X sa (X^H). La filla és X^HX^h: no és hemofílica (calen dos al·lels) i sí que és portadora. Probabilitat d'afectada: 0. De portadora: 1, en aquest encreuament.

Al cromosoma X humà hi ha gens que no tenen parella al Y. Les dones en tenen dues còpies; els homes, una (hemizigosi). Un al·lel recessiu lligat a l'X es manifesta en l'home que el porta, perquè no hi ha un segon al·lel que el tapi. En la dona calen dues còpies. Per això aquests caràcters (hemofília, daltonisme, en els models escolars) es veuen molt més en homes, i un home afectat no els passa als fills homes: el fill home rep el Y del pare i l'X de la mare. Els passa a totes les filles, que reben el seu X.

Encreuament	Fills homes	Filles
Mare portadora X^HX^h × pare sa X^HY	½ afectats	cap d'afectada; ½ portadores
Mare sana X^HX^H × pare afectat X^hY	cap d'afectat	totes portadores, cap d'afectada
Mare portadora × pare afectat	½ afectats	½ afectades, ½ portadores

Mini-PAU resolt

Un home hemofílic i una dona sana no portadora tenen una filla i un fill. Quina probabilitat té cadascun de ser hemofílic?

La filla rep X^h del pare i X^H de la mare: és portadora, probabilitat d'afectada 0. El fill rep el Y del pare i X^H de la mare: sa, probabilitat 0. Cap fill d'aquest encreuament no és hemofílic. L'home afectat transmet el caràcter a través de les netes, no dels fills homes.

Exemple resolt

Un caràcter passa de pare a fill home en diverses generacions. Pot ser recessiu lligat a l'X?

No. El pare dona el Y al fill home, no el seu X. Una transmissió pare → fill home descarta el lligament a l'X. Encaixa amb un gen autosòmic o, molt menys habitual a la prova, amb un gen del Y.

Mini-PAU resolt

Una dona portadora de daltonisme i un home sa tenen un fill i una filla. Quina probabilitat té el fill de ser daltònic, i quina la filla? El daltonisme és recessiu lligat a l'X.

El fill, ½: rep l'X de la mare, que la meitat de les vegades porta l'al·lel. La filla, 0 d'afectada: rep l'X sa del pare, i amb un sol al·lel recessiu no manifesta el caràcter; la probabilitat de ser portadora és ½. No es calcula igual per als dos sexes, i aquest és el punt de la pregunta.

Exemple resolt

Un home daltònic té totes les filles portadores i cap fill daltònic, amb una dona sana no portadora. Encaixa amb l'X. Quina observació, en una altra família, trencaria aquesta hipòtesi?

Un fill home daltònic d'un pare daltònic i una mare no portadora. El pare no li pot passar l'X. Si això passés, l'herència no seria lligada a l'X, o la mare sí que seria portadora i la premissa cauria. La transmissió pare → fill home és la que descarta el model.

Mini-PAU resolt

Una dona sana filla d'un pare hemofílic i d'una mare no portadora es casa amb un home sa. Quina probabilitat té un fill home de la parella de ser hemofílic?

La dona és portadora obligada: el pare li ha passat el seu únic X, que és l'afectat, i la mare un X sa. Amb un home sa, cada fill home té ½ de rebre l'X afectat. Una filla no serà hemofílica: el pare sa li dona un X sa. La probabilitat que es demana, la del fill home, és ½, no ¼, perquè el sexe ja està fixat a l'enunciat. Si demanés «un fill qualsevol, sense saber el sexe», seria ¼: ½ de ser home i ½ de rebre l'al·lel.

4.5 Pedigrís i probabilitat

Al pedigrí, el quadrat és un home i el cercle una dona. El farciment indica l'afectat. La línia horitzontal uneix una parella; la vertical baixa cap als fills, d'esquerra a dreta per ordre de naixement. Una persona que ja no hi és es ratlla. Llegir-ne el patró:

Autosòmic recessiu: pot saltar generacions; dos no afectats tenen un fill afectat (tots dos portadors); afecta els dos sexes. Autosòmic dominant: no sol saltar; un afectat té un progenitor afectat (si la mutació no és nova); homes i dones per igual. Recessiu lligat a l'X: més homes afectats; no passa de pare a fill home; un home afectat i una dona no portadora tenen filles portadores. Dominant lligat a l'X: un home afectat transmet el caràcter a totes les filles i a cap fill.

Pedigrí · autosòmic recessiu (exemple)




Figura 4.3. Dos no afectats amb un fill afectat: patró compatible amb un recessiu. Cal mirar més generacions abans de tancar-ho.

La probabilitat de dos fets independents es multiplica. La de dos fets mútuament excloents se suma. En una família, el resultat de cada fill és independent del dels germans: tenir ja dos fills afectats no «compensa» el tercer. Si l'ordre no importa, el nombre de maneres d'obtenir k afectats en n fills és el binomial: $C(n, k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$.

Exemple resolt

Dos portadors d'un recessiu autosòmic (Aa) volen tres fills. Quina probabilitat hi ha que cap no sigui aa?

Per a cada fill, P(no aa) = 3/4. Independents: $(3/4)^3 = 27/64 \approx 0{,}42$. La probabilitat que els tres ho siguin és $(1/4)^3 = 1/64$. La probabilitat que n'hi hagi exactament un és $C(3,1) \cdot (1/4) \cdot (3/4)^2 = 3 \cdot 1/4 \cdot 9/16 = 27/64$.

El risc poblacional es lliga amb Hardy-Weinberg (tema 6). Si una malaltia recessiva afecta 1 de cada 10 000 naixements, $q^2 = 1/10000$, $q = 1/100$ i la freqüència de portadors $2pq$ és aproximadament 1/50, perquè p és gairebé 1. Un individu sa de la població general té, doncs, una probabilitat propera a 1/50 de ser portador, no 1/10000.

En un pedigrí, un quadrat és un home i un cercle una dona; el farcit és l'afectat. Si dos no afectats tenen un fill afectat, el caràcter és recessiu: els pares eren portadors i el dominant hauria sortit en un d'ells. Si l'afectat surt cada generació i un afectat té un progenitor afectat, encaixa amb un dominant. Si gairebé només són homes i no hi ha transmissió pare → fill, encaixa amb un recessiu lligat a l'X. Un sol pedigrí petit sovint és compatible amb més d'un model: la resposta honesta és «compatible amb», no «demostra».

La probabilitat de dos esdeveniments independents junts és el producte. La d'un o l'altre, si s'exclouen, és la suma. «Com a mínim un» es calcula sovint com 1 menys «cap». L'ordre de naixement no esgota probabilitat.

Mini-PAU resolt

Dos portadors d'un recessiu autosòmic (Aa) tenen dos fills. Quina probabilitat hi ha que tots dos siguin aa? I que cap dels dos no ho sigui?

Cada fill té ¼ de ser aa, i són independents. Tots dos: ¼ × ¼ = 1/16. Cap: ¾ × ¾ = 9/16. La probabilitat que n'hi hagi com a mínim un és 1 − 9/16 = 7/16, que no és ¼ ni ½.

Exemple resolt

En un pedigrí, una dona afectada té amb un home sa tres fills homes afectats i una filla sana. Per què encaixa millor amb un recessiu lligat a l'X que amb un autosòmic recessiu, sense poder-ho tancar del tot?

Perquè tots els homes, que reben l'X de la mare, surten afectats, i la filla, que rep l'X sa del pare, no. Un autosòmic recessiu faria afectats els fills només si el pare també fos portador, i no afavoriria els homes. Amb quatre fills l'atzar encara hi cap; el patró, però, és el de l'X.

Mini-PAU resolt

Dos portadors tenen tres fills. Quina probabilitat hi ha que els tres siguin sans (no aa), si el caràcter és autosòmic recessiu?

Cada fill té ¾ de no ser aa. Independents: $(¾)^3 = 27/64$. No és ¾. El «tres» es calcula amb el producte, no repetint la fracció d'un sol fill. La probabilitat que els tres siguin afectats seria $(¼)^3 = 1/64$.

Exemple resolt

En un pedigrí petit, un model recessiu autosòmic i un de recessiu lligat a l'X encaixen tots dos. Quina dada d'un fill més ho podria separar?

El sexe dels afectats i qui els transmet. Un fill home sa d'una mare afectada descarta, en la pràctica, el recessiu lligat a l'X, perquè rebria l'X afectat. Una filla afectada d'un pare sa també el complica, perquè hauria de rebre un X sa. Si els afectats són dels dos sexes i fills de dos portadors, l'autosòmic continua sent el més simple.

Mini-PAU resolt

Dos heterozigots per a dos gens independents, AaBb × AaBb. Quina probabilitat té un fill de ser aabb? I de tenir almenys un fenotip dominant?

aabb és ¼ × ¼ = 1/16. Almenys un fenotip dominant és tot el que no és el doble recessiu: 1 − 1/16 = 15/16. No és 9/16: això és només el doble dominant. «Almenys un» inclou els 9/16, els 3/16 i els 3/16. Fer el producte i restar de 1 és més curt que sumar tres fraccions, i dona el mateix.

4.6 Caràcters quantitatius

L'alçada, el color de la pell o molts caràcters agronòmics no es parteixen en dues classes. Hi intervenen diversos gens (herència poligènica) i, sovint, l'ambient. El fenotip fa una distribució contínua, no una proporció 3:1. A la PAU n'hi ha prou amb aquesta idea i amb saber que les freqüències que es calculen en un problema de Mendel clàssic no s'apliquen directament a un caràcter quantitatiu. No es demana l'heritabilitat ni la variància.




Figura 4.5. Un gen, dos gens lliures, gens lligats o un gen a l'X: el quadre de Punnett no és el mateix.

Els caràcters quantitatius (alçada, color de pell en una escala, producció de llet) no donen 3:1. Els fan molts gens, cadascun amb un efecte petit, més l'ambient. La gràfica de la població és una campana, no dues barres. No se'ls aplica un sol quadre de Punnett. L'heretabilitat diu quina part de la variació observada es deu a diferències genètiques en aquella població i aquell ambient; no diu que el caràcter estigui «un 60 % escrit al DNA» de cap persona concreta.

Exemple resolt

Un problema presenta quatre fenotips ben separats, 9:3:3:1. És un caràcter quantitatiu?

No. Són dos gens amb efecte clar, el dihibridisme clàssic. Un quantitatiu no es parteix en quatre classes netes. Si l'enunciat dona una campana i diu que hi intervenen molts loci, llavors sí.

Mini-PAU resolt

Dos pares de grup sanguini AB tenen un fill. Pot ser del grup O? Quins grups pot ser, si A i B són codominants i O és l'absència dels dos?

No pot ser O. Els pares AB només fan gàmetes A o B. El fill és AA, AB o BB, és a dir A, AB o B, amb probabilitats ¼, ½ i ¼. El grup O seria ii, i aquí no hi ha al·lel i. La codominància és el que fa que l'AB es vegi com a categoria pròpia, no com un intermedi difuminat.

Mini-PAU resolt

L'alçada no dona 3:1 en una família. Es proposa que «no s'hereta». Quina alternativa, compatible amb Mendel, ho explica millor?

Que és quantitatiu: hi intervenen molts gens d'efecte petit, més l'ambient (nutrició, salut). Cada gen pot seguir Mendel i el conjunt no dona classes netes. «No s'hereta» contradiria que els parents s'assemblin més que dos desconeguts. El que no s'hereta és un sol gen amb dominància completa.

Exemple resolt

Dos pares de grup A tenen un fill de grup O. Quina deducció sobre els genotips és obligada, si A és dominant sobre i?

Els dos pares eren A i portaven i: genotip I^Ai. El fill és ii. Si un pare fos I^AI^A no podria donar i. El grup A del fenotip amaga dos genotips, i el fill O els destapa. No cal que cap avi sigui O, tot i que és compatible.

4.7 Mapa del tema

Abans de calcular, decidiu el patró. Després escriviu els genotips dels progenitors, els gàmetes (compte amb el lligament: no feu quatre gàmetes igual de probables si els gens van junts) i el quadre. Al final, responeu el que demanen: de vegades és un genotip, de vegades una probabilitat, de vegades només el patró.

Resum

Situació	Resultat que cal reconèixer
Aa × Aa, dominància completa	3:1 fenotips; 1:2:1 genotips
Aa × aa	1:1
Dominància incompleta o codominància	1:2:1 també en fenotips
AaBb × AaBb, gens lliures	9:3:3:1
Gens lligats	molts parentals, pocs recombinants
X recessiu, mare portadora, pare sa	fills homes 1/2 afectats; filles sanes

Errors típics a la PAU

- Aplicar 3:1 quan la dominància és incompleta.
- Fer 9:3:3:1 amb gens lligats.
- Creure que un pare transmet l'hemofília al seu fill home.
- Confondre freqüència d'afectats (q^2) i freqüència de portadors ($2pq$).
- Tractar el sexe del fill següent com si depengués dels germans que ja han nascut.
- Escriure un al·lel sobre el cromosoma Y quan el gen és a l'X.

Glossari

Al·lel
: Cadascuna de les versions d'un gen.

Hemizigot
: Individu amb un sol al·lel d'un gen, com l'home per als gens de la regió diferencial de l'X.

Codominància
: Els dos al·lels es manifesten sencers a l'heterozigot, com I^A i I^B.

Dominància incompleta
: L’heterozigot té un fenotip intermedi.

Lligament
: Dos gens al mateix cromosoma, que tendeixen a heretar-se junts.

Centimorgan
: Unitat de mapa igual a un 1 % de recombinació.

Encreuament prova
: Creuament amb un homozigot recessiu per revelar el genotip de l’altre progenitor.

Herència poligènica
: Caràcter controlat per diversos gens, sovint amb efecte de l’ambient; distribució contínua.

Autoavaluació

1. En l’encreuament AaBb × aabb els dos gens són independents i hi ha dominància completa. Quina proporció de la descendència s’espera que sigui aabb? Escriviu el càlcul a partir dels gàmetes, no només la fracció final.

   L’heterozigot AaBb fa quatre gàmetes equiprobables, AB, Ab, aB i ab, cadascun amb probabilitat 1/4. L’homozigot aabb només fa gàmetes ab. El descendent aabb només pot sortir del gàmeta ab de l’heterozigot, que té probabilitat 1/4. Es pot arribar al mateix resultat gen per gen: la probabilitat de rebre a de l’heterozigot és 1/2, la de rebre b és 1/2, i com que els gens són independents es multipliquen, $1/2 \times 1/2 = 1/4$. Els quatre fenotips d’aquest encreuament prova surten 1:1:1:1. Si els gens estiguessin lligats, aquesta proporció no es compliria.

2. Un home amb daltonisme, caràcter recessiu lligat al cromosoma X, i una dona sana no portadora tenen una filla. Serà daltoniana? Serà portadora? Justifiqueu-ho amb els cromosomes que rep de cada progenitor.

   No serà daltoniana, i sí que serà portadora. El pare li transmet el seu únic cromosoma X, que porta l’al·lel del daltonisme, i el cromosoma Y el reserva per als fills homes. La mare, no portadora, li transmet un X amb l’al·lel sa. La filla és, per tant, heterozigota. Com que el daltonisme és recessiu, un sol al·lel no es manifesta i la filla no és daltoniana, però sí que pot transmetre l’al·lel. Un fill home d’aquesta mateixa parella no seria daltonià, perquè rebria l’X sa de la mare i el Y del pare.

3. Dos portadors d’una malaltia autosòmica recessiva han tingut un fill afectat. Quina probabilitat té el fill següent de no estar afectat? Per què el resultat del primer fill no modifica aquest valor?

   La probabilitat és 3/4. Dos heterozigots Aa × Aa donen 1/4 AA, 1/2 Aa i 1/4 aa. Només aa està afectat, de manera que la probabilitat de no estar-ho és 3/4. Cada fecundació és independent: el genotip del fill ja nascut no canvia els gàmetes del següent. Confondre-ho amb «ara toca un de sa» seria tractar la probabilitat com si tingués memòria. Si la pregunta fos la probabilitat que dos fills seguits estiguin sans, llavors sí que es multiplicaria, (3/4) × (3/4), perquè serien dos esdeveniments.

4. En un encreuament prova s’obtenen 400 descendents, dels quals 40 són recombinants. Calculeu la distància entre els dos gens i digueu si estan lligats. Indiqueu què heu fet servir de numerador.

   La distància, en centimorgans, és el percentatge de recombinants: 40/400 = 0,10, és a dir 10 cM. El numerador són només els recombinants, no el grup parental més nombrós. Un 10 % queda molt per sota del 50 % que s’espera si els gens s’hereten de manera independent, de manera que estan lligats, al mateix cromosoma, i només se separen quan hi ha un entrecreuament entre ells. Els 360 restants són parentals. Amb 400 individus, la conclusió de lligament és sòlida; amb una desena de fills, la mateixa fracció no es podria defensar.

5. En una població en equilibri de Hardy-Weinberg, la freqüència d’homozigots recessius és $q^2 = 1/400$. Quina fracció de la població és, aproximadament, portadora heterozigota? Mostreu els passos.

   Si $q^2 = 1/400$, $q = 1/20 = 0{,}05$. Com que $p + q = 1$, $p = 0{,}95$, que a efectes d’aquest càlcul es pot aproximar a 1. La freqüència d’heterozigots és $2pq = 2 \times 0{,}95 \times 0{,}05 = 0{,}095$, aproximadament 1/10, un 10 %. No és 1/400: aquesta és la freqüència dels afectats, que són els homozigots. Els portadors no es veuen i són molt més nombrosos. L’error habitual és dividir 1/400 per dos i donar aquest resultat com a freqüència de portadors, sense fer l’arrel ni aplicar 2pq.

5. Genètica molecular i biotecnologia

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU

Entra la relació entre estructura i funció dels àcids nucleics, la comparació dels genomes i de l'expressió en procariotes i eucariotes, la replicació pel model procariota, la transcripció, el codi genètic i la traducció, amb problemes de seqüència. Entra la regulació: l'operó com a exemple procariota, i en eucariotes el promotor, els intensificadors, els factors de transcripció, activadors i repressors, les marques epigenètiques i la diferenciació. Entren les mutacions lligades a la replicació, el càncer (oncogens i gens supressors) i tot el bloc de biotecnologia: restricció, DNA recombinant, clonació molecular, PCR, CRISPR-Cas9, la diferència entre OMG i transgènic, els vectors i la teràpia gènica.

5.1 Dogma i genomes

La informació va, en una cèl·lula, de DNA a RNA (transcripció) i d'RNA a proteïna (traducció). El DNA es copia a si mateix (replicació). L'excepció que cal saber és la retrotranscripció: alguns virus d'RNA fan DNA a partir de l'RNA. No és el camí ordinari d'una cèl·lula. Les proteïnes no es transcriuen de tornada a àcid nucleic.




Figura 5.1. El camí habitual i l'excepció dels retrovirus, que es reprèn al tema 7.

El genoma procariota és un cromosoma circular, sense histones autèntiques (hi ha proteïnes semblants), amb molt poc DNA no codificant, i sovint plasmidis: molècules circulars petites, independents, que es repliquen soles i porten gens accessoris (resistències, virulència). No hi ha nucli: transcripció i traducció poden coincidir en el temps i en l'espai.

El genoma eucariota nuclear és lineal, amb histones i amb molta seqüència no codificant (introns, regions reguladores, DNA repetitiu). Els gens es transcriuen al nucli i l'RNAm madur surt al citosol per ser traduït. Mitocondris i cloroplasts tenen un genoma circular propi, residual, de tipus bacterià.

L'RNAm porta el missatge, en codons de tres bases, de 5′ a 3′. L'RNAt porta un aminoàcid al braç acceptor i un anticodó que reconeix el codó; la forma de trèvol és l'esquema de batxillerat. L'RNAr, juntament amb proteïnes, forma el ribosoma. Hi ha altres RNA (el de l'operó no es tradueix sencer; microRNA reguladors): a la PAU n'hi ha prou amb saber que no tot l'RNA és missatger.

DNA i RNA

	DNA	RNA
Sucre	desoxiribosa	ribosa
Bases	A, T, G, C	A, U, G, C
Cadenes	dues, antiparal·leles	normalment una
On, en un eucariota	nucli, mitocondri, cloroplast	se'n fa al nucli i es tradueix al citosol
Funció	guardar la informació	expressar-la (RNAm, RNAt, RNAr)

El flux habitual és DNA → RNA → proteïna. La replicació copia DNA en DNA. La transcripció copia DNA en RNA. La traducció llegeix l'RNAm i fa proteïna. Un retrovirus fa l'excepció RNA → DNA, amb la retrotranscriptasa, i després segueix el flux habitual. No vol dir que la informació torni de la proteïna al DNA: això no passa.

El genoma humà és nuclear, lineal, amb histones, més el genoma circular dels mitocondris. El d'un bacteri és un cromosoma circular principal i, sovint, plasmidis. El d'un virus pot ser DNA o RNA, d'una cadena o de dues, i no és un genoma cel·lular: no es replica sol.

Exemple resolt

Per què es diu que el DNA és l'arxiu i l'RNA la còpia de treball, si tots dos són àcids nucleics?

Perquè el DNA es queda al nucli (o al cromosoma bacterià) i es copia sencer només quan la cèl·lula es divideix. L'RNAm se'n fa un tros, el d'un gen, es fa servir per fabricar proteïna i es degrada. Es poden fer moltes còpies d'un gen sense tocar l'arxiu. L'RNAt i l'RNAr ni tan sols es tradueixen: són part de la maquinària.

Mini-PAU resolt

Un virus amb RNA entra en una cèl·lula i al cap d'unes hores hi ha DNA víric integrat. Quin enzim víric ho explica, i quin pas del dogma s'ha fet al revés?

La retrotranscriptasa, que copia RNA en DNA. El pas invertit és la transcripció, no la traducció: la proteïna no s'ha llegit per fer àcid nucleic. Després, aquest DNA es transcriu amb la maquinària de la cèl·lula, en el sentit habitual.

Mini-PAU resolt

Ordeneu els processos i digueu quin no passa al nucli d'un eucariota: replicació, transcripció, traducció.

L'ordre habitual és replicació (quan la cèl·lula es divideix), transcripció i traducció. Al nucli hi ha replicació i transcripció. La traducció és al citosol, als ribosomes. L'RNAm ha de sortir. En un bacteri els tres llocs se superposen al citoplasma, i la traducció pot començar sobre un RNAm que encara s'està fent.

Exemple resolt

Un retrovirus fa DNA a partir d'RNA. Això vol dir que una proteïna es pot traduir en sentit invers cap a RNA?

No. El pas excepcional és d'RNA a DNA, un àcid nucleic a un altre, amb la retrotranscriptasa. No hi ha cap maquinària que llegeixi una proteïna i en faci un gen. El dogma, en la forma que es demana, admet aquesta excepció i no admet la de la proteïna cap enrere.

5.2 Replicació

La replicació és semiconservativa: cada cadena vella serveix de motlle i cada filla queda amb una cadena vella i una de nova. El model que les orientacions demanen és el procariota, amb una sola origen. La helicasa obre la doble hèlix. Les proteïnes SSB mantenen les cadenes separades. La topoisomerasa (DNA-girasa en bacteris) talla i torna a unir per treure la tensió que s'acumula davant de la forquilla. La primasa sintetitza un encebador curt de RNA, perquè la DNA-polimerasa no pot començar una cadena: només afegeix nucleòtids a un 3′–OH.

La síntesi és sempre 5′→3′. Sobre el motlle que queda orientat 3′→5′ en el sentit de la forquilla, la cadena nova creix de manera contínua: és la cadena líder. Sobre l'altre motlle, la polimerasa va a batzegades, lluny de la forquilla, i fa fragments d'Okazaki, cadascun amb el seu encebador: és la cadena retardada. En bacteris, la DNA-polimerasa III allarga; la DNA-polimerasa I treu l'encebador de RNA i omple el forat amb DNA; la DNA-ligasa tanca l'últim fosfodièster. La polimerasa corregeix: si entra una base mal aparellada, l'activitat exonucleasa 3′→5′ la treu. Quan la correcció falla, queda una mutació.




Figura 5.2. Forquilla de replicació (LadyofHats, domini públic). La polimerasa només allarga en sentit 5′→3′. Una cadena és contínua i l’altra, la retardada, es fa a fragments d’Okazaki. En bacteris, la DNA-polimerasa III allarga i la DNA-polimerasa I treu l’encebador.

En eucariotes hi ha moltes origens (el genoma és enorme i lineal), els enzims tenen altres noms i els extrems, els telòmers, no es poden acabar del tot amb el mecanisme dels fragments d’Okazaki. La telomerasa, una polimerasa amb un motlle de RNA propi, els allarga a les cèl·lules que s’han de continuar dividint. El principi —semiconservatiu, antiparal·lel, encebadors, líder i retardada— és el mateix.

Replicació procariota i eucariota

	Procariota	Eucariota
Origens	una	moltes
Qui allarga	DNA-polimerasa III	diverses polimerases
Qui treu l’encebador	DNA-polimerasa I	maquinària equivalent
Extrems	el cromosoma és circular	telòmers; la telomerasa els allarga en algunes cèl·lules
Comú	semiconservativa, síntesi només 5′→3′, cadena líder i retardada, helicasa, primasa, ligasa, SSB	

Exemple resolt

Per què la cadena retardada no es pot fer d'una sola tirada, en el mateix sentit que avança la forquilla?

Perquè la polimerasa només afegeix nucleòtids a un extrem 3′. Al motlle que queda orientat al revés, l'única manera d'avançar amb la forquilla és anar fent fragments cap enrere, cadascun amb el seu encebador.

La replicació és semiconservativa: cada filla es queda amb una cadena vella i una de nova. La doble hèlix s'obre per l'helicasa. La topoisomerasa talla d'una banda perquè el DNA no s'embulli en desenrotllar-se. Les proteïnes d'unió a cadena senzilla impedeixen que es torni a tancar. La primasa posa un encebador de RNA, perquè la DNA-polimerasa no sap començar: només allarga un 3′–OH. Llegeix el motlle 3′→5′ i sintetitza 5′→3′.

A la forquilla, una cadena (la líder) es fa seguida, en el sentit d'obertura. L'altra (la retardada) es fa a trossos, els fragments d'Okazaki, cadascun amb el seu encebador, perquè el motlle mira al revés. Després es treu l'RNA, es reomple amb DNA i la ligasa tanca el nick. En bacteris, la polimerasa III allarga i la I treu l'encebador. En eucariotes hi ha diverses polimerases i el problema dels extrems: la cadena retardada no es pot acabar del tot, i els telòmers escurcen. La telomerasa, activa a cèl·lules germinals i a moltes tumorals, hi afegeix DNA.

Mini-PAU resolt

Per què la cadena retardada necessita molts encebadors i la líder, en una forquilla, només un?

Perquè la polimerasa només afegeix al 3′. Al motlle que queda orientat a favor de la forquilla, un sol encebador permet anar allargant sense parar. A l'altre motlle, cada cop que s'obre un tram nou el 3′ útil queda a l'extrem oposat al sentit d'obertura, i cal un encebador nou per fer un fragment cap enrere.

Exemple resolt

Meselson i Stahl van fer créixer bacteris en nitrogen pesant i després en nitrogen lleuger. Després d'una generació tot el DNA tenia densitat intermèdia. Què hauria sortit si la replicació fos conservativa?

Amb el model conservatiu, la doble hèlix vella es quedaria sencera (pesant) i la nova seria tota lleugera: dues bandes, no una d'intermèdia. La banda intermèdia única és la semiconservativa: cada dúplex té una cadena pesant i una de lleugera. A la segona generació apareix, a més, DNA tot lleuger, i la banda intermèdia es manté.

Mini-PAU resolt

Esquerra de la forquilla, la cadena nova creix cap a l'obertura; dreta, creix a trossos en sentit contrari. Quina és la líder, quina la retardada, i quin enzim uneix els trossos un cop tret l'encebador?

La de l'esquerra, contínua, és la líder. La de la dreta és la retardada, feta de fragments d'Okazaki. La ligasa segella el nick que queda quan s'ha substituït l'RNA de l'encebador per DNA. La polimerasa allarga; no tanca el nick. La primasa posa l'encebador i no allarga el DNA.

Exemple resolt

Per què els telòmers s'escurcen a les cèl·lules somàtiques i no, o menys, a la línia germinal?

Perquè la telomerasa, que allarga els extrems, és activa a la línia germinal i està apagada a la majoria de cèl·lules somàtiques. Sense ella, la cadena retardada no es pot completar a l'extrem. Moltes cèl·lules tumorals la reactiven, i per això poden dividir-se sense escurçar el telòmer.

5.3 Transcripció i codi genètic

La transcripció copia un tros de DNA a RNA. La cadena que es llegeix és el motlle, en sentit 3′→5′. L'RNA creix 5′→3′ i queda amb la mateixa seqüència que la cadena codificant (la que no es llegeix), canviant T per U. En bacteris, l'RNA-polimerasa reconeix el promotor amb l'ajuda del factor σ, transcriu i s'atura al terminador. L'RNAm es pot traduir de seguida, i un mateix RNAm pot portar diversos gens (policistrònic): és el cas dels operons.

En eucariotes, l'RNAm el fa l'RNA-polimerasa II. Abans de sortir del nucli es madura: cap de 7-metilguanosina a l'extrem 5′, cua de poli-A a l'3′ i eliminació dels introns (splicing), de manera que només els exons queden a l'RNAm. Un gen pot donar més d'un RNAm si l'splicing tria exons diferents. L'RNAm eucariota és monocistrònic.




Figura 5.3. El motlle es llegeix 3′→5′. L'RNA que en surt s'assembla a la cadena codificant, amb U en lloc de T.

El codi genètic és la correspondència entre codons de l'RNAm i aminoàcids. És de tripletes (64 codons), degenerat (hi ha 61 codons per a 20 aminoàcids; diversos codons codifiquen el mateix aminoàcid, sovint coincidint en les dues primeres bases), continu (sense comes), no solapat i gairebé universal. L'AUG és l'inici i codifica metionina (en bacteris, la primera és formilmetionina). UAA, UAG i UGA són parada i no codifiquen aminoàcid. Per traduir

una seqüència cal fixar el marc: es comença a l'AUG i es llegeix de tres en tres fins a un codó de parada. Un problema de PAU sol donar la taula del codi; no cal memoritzar-la sencera, però sí l'AUG i les parades, i saber completar la cadena complementària.

Exemple resolt

Motlle de DNA: 3′–TAC TTT GGG ATC–5′. Escriviu la cadena codificant, l'RNAm i els aminoàcids (UUU és Phe, CCC és Pro, UAG és parada, AUG és Met).

Codificant: 5′–ATG AAA CCC TAG–3′. RNAm: 5′–AUG AAA CCC UAG–3′. Pèptid: Met–Phe–Pro, i UAG atura. No es tradueix el codó de parada.

Mini-PAU resolt

Us donen un fragment d'RNA: 5′–AUU CGU GAG–3′. Demanen la cadena de DNA que ha servit de motlle.

El motlle és antiparal·lel i complementari, amb T on l'RNA té A, A on té U, etc. Motlle: 3′–TAA GCA CTC–5′. La cadena codificant seria 5′–ATT CGT GAG–3′. Si l'enunciat diu «DNA complementària» sense precisar, mireu el sentit que us demanen i escriviu-lo; el motlle és el que s'aparella amb l'RNA.

Transcripció: procariotes i eucariotes

	Procariota	Eucariota
Enzim de l'RNAm	una RNA-polimerasa, amb factor σ	RNA-polimerasa II
On	citoplasma (no hi ha nucli)	nucli
Maduració	no: es pot traduir de seguida	cap 5′, cua poli-A, eliminació d'introns
RNAm	sovint policistrònic (operó)	monocistrònic

En els dos casos el motlle es llegeix 3′→5′ i l'RNA creix 5′→3′. La cadena codificant no es llegeix: l'RNA s'hi assembla, amb U en lloc de T.

Mini-PAU resolt

Motlle 3′–TAC GGA TTA ACT–5′. Escriviu l'RNAm i digueu on comença i on s'atura la traducció si AUG és inici, UAA és parada, GGA és Gly i UUA és Leu. La taula de l'examen us donaria aquests codons.

RNAm 5′–AUG CCU AAU UGA–3′. Comença a AUG (Met) i s'atura a UGA, que no es tradueix. Entre mig, CCU i AAU. El motlle començava per TAC, que és l'AUG: no cal inventar un marc diferent.

La transcripció la fa l'RNA-polimerasa. No necessita encebador. Llegeix la cadena motlle 3′→5′ i l'RNA creix 5′→3′. L'RNA és complementari del motlle i idèntic a la cadena codificant, amb U en lloc de T. El promotor és DNA: és on s'uneix la polimerasa, no es transcriu. En bacteris, el factor σ reconeix el promotor i després se'n va. En eucariotes, l'RNAm el fa la polimerasa II i el transcrit primari es madura: cap 5′, cua de poli-A i eliminació d'introns. Els exons són el que es queda. Un gen pot donar diversos RNAm segons quins exons es conservin. L'RNAm bacterià no es madura així i sovint porta diversos gens (operó).

El codi es llegeix de tres en tres, sense comes, en el sentit 5′→3′ de l'RNAm. És degenerat: diversos codons codifiquen el mateix aminoàcid, sobretot a la tercera base. És gairebé universal. AUG és metionina i inici. UAA, UAG i UGA són parada i no codifiquen aminoàcid. La taula, a la prova, la donen: no s'ha de memoritzar, s'ha de saber fer servir sense canviar el marc.

Mini-PAU resolt

Cadena codificant 5′–ATG TTT GGA TAA–3′. Escriviu l'RNAm i la proteïna, si UUU és Phe, GGA és Gly, AUG és Met i UAA és parada.

La codificant té la mateixa seqüència que l'RNA, amb T en lloc d'U. RNAm: 5′–AUG UUU GGA UAA–3′. Proteïna: Met–Phe–Gly, i UAA no es tradueix. Si es parteix el marc un nucleòtid més enllà, AUG desapareix i la lectura és una altra. El marc el fixa l'AUG d'inici, no el primer triplet que ens vingui de gust.

Exemple resolt

Un intró es queda dins l'RNAm per error. Què li passa a la proteïna, encara que l'exó sigui correcte?

El marc de lectura a partir de l'intró gairebé segur que canvia, o apareix una parada prematura. La proteïna serà més llarga, més curta o amb una seqüència diferent des d'aquell punt. Que l'exó «estigui bé» no salva el producte si el ribosoma llegeix nucleòtids de més.

Mini-PAU resolt

Motlle 3′–TAC GGT ATT–5′. Escriviu l'RNAm 5′→3′ i digueu quin triplet és l'inici i quin no s'ha de traduir si ATT del motlle correspon a la parada. GGA és Gly. AUG és Met.

RNAm 5′–AUG CCA UAA–3′. AUG és l'inici (Met). CCA seria Pro, no Gly: GGA seria el complement d'un motlle CCT, que aquí no hi és. UAA és parada i no es tradueix. La proteïna és només Met, si no hi ha més codons entre l'inici i la parada. Cal llegir el motlle al revés i canviar T per U, no copiar-lo tal qual.

Exemple resolt

Un gen eucariota té 4 exons i 3 introns. L'RNAm madur, quants trams de la seqüència del gen conserva, i on s'ha fet la maduració?

Conserva els 4 exons, units. Els introns s'han eliminat. La maduració és al nucli, abans de sortir. El ribosoma no veu els introns. Si es seqüencia el gen i es compara amb l'RNAm, els trossos que falten a l'RNA són els introns.

Mini-PAU resolt

RNAm 5′–AUG UUC UAA GGG–3′. La taula diu que UUC és Phe i GGG és Gly. Quina proteïna se'n fa, i per què la glicina no hi és?

Met–Phe. UAA és parada i el ribosoma se'n va. GGG és a continuació i no es llegeix. Una parada al mig no es «salta». Si l'enunciat hagués posat UUC i GGG abans de la parada, la glicina hi seria. L'ordre és el que mana, no la llista d'aminoàcids que algú veu a la taula.

El marc es fixa a l'AUG. Si es comença un nucleòtid abans, AUG desapareix i la lectura és una altra proteïna, o cap. Per això una inserció d'una base és greu: no canvia una lletra, canvia totes les de després.

5.4 Traducció

La traducció es fa al ribosoma. En procariotes és 70S (subunitats 30S i 50S); al citosol eucariota, 80S (40S i 60S). Els ribosomes de mitocondris i cloroplasts són 70S. Cada aminoàcid s'uneix al seu RNAt per una aminoacil-RNAt-sintetasa, amb despesa d'ATP: és la càrrega, i és específica. El ribosoma llegeix l'RNAm de 5′ a 3′ i té tres llocs: A (entra l'RNAt carregat), P (porta la cadena naixent) i E (l'RNAt buit en surt).

A l'inici, la subunitat petita reconeix l'AUG, hi entra el primer RNAt i es tanca la subunitat gran. A l'elongació, l'RNAt del lloc A aparella l'anticodó amb el codó, la peptidil-transferasa (una activitat de l'RNAr, no d'una proteïna) fa l'enllaç peptídic i el ribosoma es desplaça un codó. A la terminació, un codó de parada és reconegut per un factor d'alliberament, no per un RNAt, i la cadena se separa.




Figura 5.4. Traducció al ribosoma (LadyofHats, domini públic). El ribosoma té els llocs A i P. L'RNAt buit surt pel lloc E, a l'esquerra del P. L'RNAm es llegeix 5′→3′.

+ Per ampliar · no és matèria d'examen

La hipòtesi del balanceig: la tercera base del codó admet aparellaments menys estrictes, i per això n'hi ha prou amb menys de 61 RNAt. Explica la degeneració, però no cal citar-la.

El ribosoma té una subunitat petita, que lliga l'RNAm, i una de gran, que fa l'enllaç peptídic. Els llocs són A (entra l'RNAt amb l'aminoàcid), P (porta la cadena) i E (surt l'RNAt buit). L'RNAt porta l'aminoàcid a l'extrem 3′ i l'anticodó, que s'aparella antiparal·lel amb el codó. La wobble explica part de la degeneració: la tercera base no sempre aparella estricte, i per això no calen 61 RNAt.

La traducció comença a l'AUG, que a eucariotes és a prop del cap 5′. Creix de N-terminal a C-terminal, mentre l'RNAm es llegeix 5′→3′. S'atura a un codó de parada, on no entra un RNAt sinó un factor d'alliberament, i la cadena se separa. En bacteris, la traducció pot començar abans que s'acabi la transcripció. En eucariotes, no: l'RNAm ha de sortir del nucli.

Mini-PAU resolt

Un codó és 5′–GCA–3′. Quin anticodó hi encaixa, escrit 5′→3′, i quin aminoàcid hi va si GCA és Ala?

L'anticodó antiparal·lel és 3′–CGU–5′, que escrit en el sentit convencional 5′→3′ és 5′–UGC–3′. L'aminoàcid és l'alanina, el de la taula del codó, no el de l'anticodó. L'error habitual és aparellar en paral·lel i llegir UGC com si fos el codó.

Exemple resolt

Un antibiòtic impedeix que l'RNAt entri al lloc A. En quin pas s'atura la traducció, i la transcripció en queda afectada?

S'atura l'elongació: no pot entrar el següent aminoàcid. El lloc P es queda amb la cadena a mig fer. La transcripció és un altre enzim i un altre motlle; no s'atura per aquest antibiòtic, llevat que l'enunciat digui que la molècula també toca la polimerasa. En un bacteri, els ribosomes que ja estaven traduint aquell RNAm es congelen.

Mini-PAU resolt

Al lloc P hi ha un RNAt amb una cadena de 15 aminoàcids. Al lloc A entra el següent. Després de la formació de l'enllaç, on és la cadena de 16, i què hi ha al lloc E?

La cadena de 16 queda unida a l'RNAt que havia entrat al lloc A. El que era al P es queda sense aminoàcid i, en el desplaçament, passa al lloc E i surt. El ribosoma avança un codó. La cadena creix per l'extrem carboxil, no per l'amino.

Exemple resolt

Un codó de parada no té RNAt. Com s'acaba la proteïna, si no entra cap aminoàcid?

Entra un factor d'alliberament, que reconeix el codó i fa que la cadena se separi de l'últim RNAt. No s'afegeix un aminoàcid «de parada». El codó ocupa el lloc A i no el llegeix cap anticodó. La proteïna queda lliure i les subunitats se separen.

5.5 Regulació i diferenciació

Totes les cèl·lules d'un organisme tenen el mateix DNA (amb poques excepcions). Són diferents perquè no expressen els mateixos gens. Regular l'expressió és decidir quins gens es transcriuen, i amb quina intensitat.

En bacteris, l'exemple és l'operó lac, inducible i de control negatiu. Els gens estructurals (z, y, a) es transcriuen junts. El repressor, codificat per lacI, es lliga a l'operador i tanca el pas de la polimerasa. Si al medi hi ha lactosa, l'al·lolactosa es lliga al repressor, el repressor deixa l'operador i l'operó es pot transcriure. Si a més hi ha glucosa, la transcripció és baixa: sense glucosa puja el cAMP, el complex CAP-cAMP es lliga davant del promotor i activa. Resum per a la prova: la lactosa indueix; la glucosa reprimeix; el repressor actua en negatiu.

En eucariotes el control és a diverses capes. El promotor, sovint amb una caixa TATA, fixa la maquinària basal. Els intensificadors (enhancers) són regions llunyanes on es lliguen activadors; els silenciadors, on es lliguen repressors. Els factors de transcripció són proteïnes que fan aquest paper. Abans fins i tot d'això, la cromatina ha d'estar oberta: les marques epigenètiques (metilació del DNA, modificació de les histones) no canvien la seqüència i es poden heretar a través de mitosis. La diferenciació és el resultat estable d'aquest programa: un limfòcit i una

cèl·lula del fetge tenen el mateix genoma i transcriptomes diferents. L'splicing alternatiu, al tema 6, afegeix diversitat sense gens nous.

Totes les cèl·lules d'un cos tenen el mateix genoma (amb les excepcions dels limfòcits reordenats i d'alguna pèrdua local). Són diferents perquè no transcriuen els mateixos gens. Regular és decidir quins es transcriuen, i amb quina força. En bacteris, l'operó lac és el model: sense lactosa, un repressor es lliga a l'operador i la polimerasa no avança; amb lactosa, el repressor se'n va. Si a més hi ha poca glucosa, puja el cAMP i un activador ajuda la polimerasa. El gen es pot induir. No cal el nom de cada proteïna; sí la lògica: un repressor apaga, un senyal el treu.

En eucariotes la regulació és al promotor i als potenciadors, amb factors de transcripció, i també després: maduració, vida mitjana de l'RNAm, traducció. La diferenciació és aquest patró d'expressió fet estable. Una cèl·lula de fetge i una neurona no tenen genomes diferents; tenen gens oberts diferents.

Exemple resolt

Un bacteri en un medi amb glucosa i lactosa gairebé no fa els enzims de la lactosa. N'hi ha prou amb dir que «la lactosa no hi és»?

No: la lactosa hi és, de manera que el repressor no hauria de bloquejar. El que frena és la glucosa, que manté baix el cAMP i sense l'activador la transcripció és pobra. Les dues condicions compten: lactosa present i glucosa escassa. És la repressió per catabòlit, no la simple absència de lactosa.

Mini-PAU resolt

Per què un trasplantament de nucli d'una cèl·lula diferenciada a un òvul sense nucli pot donar un organisme sencer, si aquella cèl·lula «ja estava especialitzada»?

Perquè el genoma continuava sencer. L'especialització era expressió, no pèrdua de gens. L'òvul reprograma la cromatina i torna a obrir gens que la cèl·lula donant tenia tancats. És el fonament de la clonació per transferència nuclear. No funcionaria si la diferenciació hagués esborrat el DNA.

Mini-PAU resolt

Un operó està apagat. S'afegeix la molècula que inactiva el repressor i la glucosa és escassa. Es transcriu. Quina de les dues condicions, sola, no bastaria en l'operó lac?

Cap de les dues sola no dona la transcripció plena. Sense treure el repressor, la polimerasa no avança encara que hi hagi activador. Sense activador (glucosa alta, poc cAMP), el repressor absent dona una transcripció baixa. Les dues condicions són la que es demana: lactosa present i glucosa escassa.

Exemple resolt

Dues cèl·lules d'un mateix fetge tenen el mateix genoma i una fa albúmina i l'altra, en un moment donat, no. On és la diferència?

En l'expressió, no en la seqüència. Factors de transcripció, estat de la cromatina o senyals del moment fan que el gen estigui obert en una i no en l'altra. Clonar el nucli de qualsevol de les dues podria, en principi, donar el gen de l'albúmina a un organisme sencer: no s'havia perdut.

5.6 Mutacions i càncer

Una mutació és un canvi heretable de la seqüència. Si falla la correcció de la polimerasa, pot quedar un nucleòtid canviat. Una substitució pot ser silent (el codó nou codifica el mateix aminoàcid, gràcies a la degeneració), de canvi de sentit (un altre aminoàcid) o sense sentit (un codó de parada prematur). Una inserció o una deleció que no sigui múltiple de tres desplaça el marc de lectura des d'aquell punt. Les mutacions cromosòmiques (deleció, duplicació, inversió, translocació d'un tros) i les cariotípiques (un cromosoma de més o de menys, com la trisomia 21) es classifiquen al tema 6, amb les causes.

Una mutació somàtica queda a la cèl·lula i a les seves filles per mitosi; no passa a la descendència. Una mutació germinal, al gàmeta, sí. El càncer és, en essència, una malaltia de mutacions somàtiques que desmunten el control del cicle. Els protooncogens estimulen la divisió; mutats en oncogens, l'estimulen sense fre (n'hi ha prou amb un al·lel). Els gens supressors de tumors frenen la divisió o reparen el DNA; cal inactivar les dues còpies. El cas que val la pena saber pel nom és TP53, que codifica p53, un supressor que atura el cicle si el DNA està danyat. El càncer no és «una mutació»: n'acumula diverses, i per això és més freqüent amb l'edat.

Una mutació és un canvi heretable de la seqüència. Puntual: se substitueix una base. Si el codó nou codifica el mateix aminoàcid, és silenciosa. Si en codifica un altre, és de sentit erroni. Si esdevé una parada, és disbarat i la proteïna queda curta. Una inserció o una deleció que no sigui múltiple de tres canvia el marc: a partir d'aquell punt tot és diferent, i sovint apareix una parada aviat. Una de tres bases afegeix o treu un aminoàcid i conserva el marc.

Al cos, les mutacions de les cèl·lules somàtiques no es passen als fills; les de la línia germinal, sí. El càncer és clonal i somàtic: acumulació de mutacions que treuen frens del cicle (supressors de tumors) o deixen acceleradors enganxats (oncogens, versions mutades de protooncogens). No és un sol gen ni un contagi. Un agent mutagènic (radiació ionitzant, alguns compostos) puja la taxa; no «crea» un càncer amb una sola lesió garantida.

Mini-PAU resolt

Una substitució canvia GAA (Glu) per GAG (Glu). Una altra, el mateix GAA per UAA. Quina es notarà a la proteïna?

La primera és silenciosa: el codi és degenerat i l'aminoàcid no canvia. La segona és disbarat: UAA és parada i la cadena s'allibera. La segona és la que es nota, gairebé sempre. Cal mirar la taula, no assumir que tot canvi de base canvia la proteïna.

Exemple resolt

S’insereix un nucleòtid al mig d’un exó. Per què és pitjor, en general, que una substitució?

Perquè desplaça el marc de tots els triplets de més avall. Una substitució toca un sol codó, que fins i tot pot ser sinònim. La inserció converteix la resta de la proteïna en una seqüència a l’atzar i sol trobar una parada. Només si se n’insereixen tres es conserva el marc.

Mini-PAU resolt

Es delecionen dues bases al mig d’un exó. Més endavant, una inserció d’una base restaura en part la funció, i una inserció de dues no. Per què?

Dues bases delecionades desplacen el marc. Una inserció posterior deixa el marc encara desplaçat (en total, el desplaçament no és múltiple de tres). Dues insercions, sumades a la deleció de dues, són un canvi net de zero mòdul tres si es compta bé: deleció de 2 i inserció de 2 tornen el marc. El tram entre els dos canvis queda alterat, i per això la funció torna només en part. El que es valora és el mòdul tres, no el nombre absolut.

Exemple resolt

Un protooncogen passa a oncogen per una mutació que el deixa sempre actiu. Per què n’hi ha prou amb un al·lel mutat, i en un supressor de tumors no?

Perquè l’oncogen és un accelerador enganxat: una còpia hiperactiva ja empeny el cicle. El supressor frena; mentre en quedi una còpia bona, el fre funciona. Calen les dues còpies perdudes. Per això els oncogens es comporten com a dominants a la cèl·lula i els supressors com a recessius.

Mini-PAU resolt

Una substitució canvia UUU (Phe) per UUC (Phe). Una deleció treu la primera U. Compareu l’efecte sobre la proteïna, sabent que el triplet següent era GGA (Gly) i que, desplaçat, el nou triplet pot ser un altre.

La substitució és silenciosa: l’aminoàcid no canvia, el marc tampoc. La deleció treu una base i tot el que ve després es llegeix en un marc diferent. Encara que el primer aminoàcid afectat es pogués salvar, la resta de la cadena no. La deleció és la mutació greu. No es puntua igual una substitució sinònima i un canvi de marc.

5.7 Enginyeria genètica

Els enzims de restricció, d’origen bacterià, tallen el DNA en una seqüència curta que reconeixen, sovint un palíndrom. Molts fan un tall esglaonat i deixen extrems cohesius; d’altres, un tall rom. Dues molècules tallades amb

el mateix enzim es poden aparellar pels extrems. La DNA-ligasa tanca els fosfodièsters. El producte, un DNA que no existia així a la natura, és DNA recombinant.

La clonació molecular vol dir obtenir moltes còpies d'un fragment. El fragment s'insereix en un vector, gairebé sempre un plasmidi, que ha de tenir un origen de replicació i un gen de selecció (resistència a un antibiòtic). El plasmidi es fa entrar en un bacteri (transformació). En un medi amb l'antibiòtic només creixen els que han rebut el plasmidi. Les colònies es poden cribrar per saber quines porten l'insert. Això no té res a veure amb fer un animal sencer idèntic a un altre.



Figura 5.7. Restricció, ligasa, plasmidi i les dues tècniques que amplien o editen: PCR i CRISPR.

Una endonucleasa de restricció talla el DNA en una seqüència curta i concreta, sovint palindròmica, i pot deixar extrems cohesius. Dues molècules tallades amb el mateix enzim tenen extrems compatibles i la ligasa les pot unir. Això és la base del DNA recombinant. Un plasmidi és un DNA circular petit, propi de bacteris, que es replica a part. Si hi posem un gen i el bacteri el manté, aquell gen es copia cada cop que es copia el plasmidi. El plasmidi de laboratori porta, a més, un gen de resistència per seleccionar les cèl·lules que l'han agafat.

Exemple resolt

Es talla un plasmidi i un fragment humà amb EcoRI i es lliguen. Per què no n'hi ha prou amb transformar el bacteri, si es vol estar segur que el plasmidi porta l'insert i no s'ha tancat buit?

Perquè el plasmidi tallat es pot tornar a tancar sense l'insert. Cal una selecció. La resistència a un antibiòtic diu que el plasmidi hi és. Per saber que l'insert també, es fa servir un segon gen (com lacZ) que s'interromp en inserir-hi el fragment: les colònies blanques, i no les blaves, són les recombinants. Després es comprova amb una restricció o amb PCR.

Mini-PAU resolt

Un fragment tallat amb EcoRI i un plasmidi tallat amb un enzim que deixa extrems roms es poden lligar amb bona eficiència?

No. Els extrems cohesius d'EcoRI busquen la seqüència complementària. Un extrem rom no la té. La ligasa pot unir roms, però és ineficient, i no uneix un cohesiu amb un rom. Cal el mateix enzim, o extrems compatibles.

Mini-PAU resolt

Un plasmidi i un gen humà es tallen amb el mateix enzim, que deixa extrems cohesius. Després de lligar i transformar, les colònies creixen en un antibiòtic. N'hi ha prou per dir que totes porten el gen humà?

No. L'antibiòtic selecciona les que porten el plasmidi, que duu el gen de resistència. El plasmidi es pot haver tancat sense l'insert. Cal un segon criteri: interrupció d'un gen indicador, o una PCR, o una restricció que mostri la mida de més. Resistència i insert no són el mateix.

Exemple resolt

Per què els extrems cohesius d'un mateix enzim s'uneixen millor que dos extrems roms?

Perquè les bases sobresortints són complementàries i s'aparellen soles, i la ligasa només ha de tancar el nick. Els roms no s'aguanten: la ligasa ha de trobar dos extrems que coincideixin per atzar. Es pot fer, i el rendiment és pitjor. Per això es tria el mateix enzim a les dues bandes.

5.8 PCR, CRISPR, OMG i clonació

La PCR amplifica un fragment in vitro, sense cèl·lules. Cal el DNA motlle, dos encebadors que flanquegin el fragment, dNTP, magnesi, tampó i una DNA-polimerasa que aguanti l'ebullició (Taq, de *Thermus aquaticus*). Cada cicle és: desnaturalitzar (94–95 °C), hibridar els encebadors (la temperatura depèn d'ells; sovint 50–65 °C) i allargar (72 °C). Després de n cicles, si es partia d'una molècula i el rendiment fos del 100 %, n'hi hauria 2^n. A la pràctica el rendiment no és perfecte, però el creixement és exponencial. Serveix per diagnosticar, per obtenir DNA antic o per preparar un fragment abans de clonar-lo.




Figura 5.5. Les tres temperatures d'un cicle de PCR. La polimerasa de l'extensió ha de ser termostable.

CRISPR-Cas9 és un sistema de defensa bacterià reconvertit en eina d'edició. Un RNA guia, dissenyat per nosaltres, s'aparella amb la seqüència diana. La proteïna Cas9 talla les dues cadenes al costat d'un motiu curt que ella mateixa exigeix, el PAM (en el Cas9 de *Streptococcus pyogenes*, NGG). La cèl·lula repara el tall. Si ho fa per unió d'extrems no homòloga, sol cometre errors i el gen queda inactivat. Si li donem un motlle, pot copiar-lo (reparació dirigida per homologia) i introduïm el canvi que volíem.




Figura 5.6. L'RNA guia porta el Cas9 a la diana. El tall es repara amb errors o amb un motlle.

Un organisme modificat genèticament (OMG) és qualsevol organisme el genoma del qual s'ha alterat per enginyeria: un knockout fet amb CRISPR també ho és. Un transgènic és un OMG que porta un gen d'una altra espècie. Tot transgènic és OMG; no tot OMG és transgènic. Obtenir un transgènic té tres passos: introduir el gen exogen, seleccionar els individus que l'han incorporat i que l'expressen, i reproduir-los perquè el gen passi a la descendència. Les vies d'entrada són la microinjecció al zigot, bacteris com *Agrobacterium tumefaciens* en plantes, i vectors vírics o plasmidis.

Idea clau

Clonació molecular: copiar un fragment de DNA dins un bacteri. Clonació reproductiva: un organisme sencer genèticament gairebé idèntic a un altre, per transferència del nucli d'una cèl·lula somàtica a un òvul sense nucli (SCNT; l'ovella Dolly). La clonació terapèutica faria embrions només per obtenir cèl·lules, no per gestar-los. Als enunciats, si parlen de plasmidi i antibiòtic, és la molecular.

La PCR amplifica un tram de DNA entre dos encebadors. Cada cicle té tres temperatures: desnaturalitzar (uns 95 °C, se separen les cadenes), hibridar (uns 50–60 °C, els encebadors s'uneixen) i estendre (uns 72 °C, la polimerasa termostable copia). Cada cicle dobla el tram. Després de n cicles hi ha, teòricament, 2^n còpies. La polimerasa ha de ser de bacteri termòfil, perquè si no es moriria a 95 °C. Els encebadors defineixen què s'amplifica: si estan mal triats, s'amplifica una altra cosa o no res.

CRISPR-Cas9 és una nucleasa guiada per un RNA. L'RNA guia s'aparella amb la diana i Cas9 talla les dues cadenes. La cèl·lula repara el tall. Si la reparació és propensa a errors, el gen queda inactivat. Si se li dona un motlle, pot copiar-hi un canvi concret. No és «tisores màgiques que editen soles»: sense reparació cel·lular no hi ha edició.

Un organisme modificat genèticament porta un gen afegit o editat que no hi era. Un transgènic porta DNA d'una altra espècie. La clonació reproductiva és un nucli somàtic dins un òvul, no un transgèn. Són tres coses que la prova separa.

Mini-PAU resolt

Una PCR de 30 cicles parteix d'una sola molècula. Quantes còpies del tram hi ha, en teoria, al final? I per què a la pràctica són menys?

2^{30}, uns mil milions. A la pràctica la reacció s'atura abans perquè s'acaben els encebadors o els nucleòtids, i la polimerasa perd eficàcia. Els primers cicles sí que són exponencials. Si no hi hagués encebadors específics, no s'amplificaria un sol tram.

Exemple resolt

Es vol inactivar un gen amb CRISPR però no corregir-lo. Cal donar un DNA motlle?

No. N'hi ha prou amb el tall: la reparació per unió d'extrems sol inserir o esborrar unes bases i desplaçar el marc. El motlle cal quan es vol un canvi precís, perquè llavors la cèl·lula fa servir la recombinació homòloga i copia el motlle. Sense motlle no hi ha res a copiar.

Mini-PAU resolt

Una PCR no amplifica. Els encebadors són correctes i el motlle també. La polimerasa és d'un bacteri que viu a 37 °C. On és l'error de disseny?

A la polimerasa. El cicle puja a uns 95 °C per separar les cadenes, i una polimerasa de 37 °C es desnaturalitza al primer cicle. Cal una polimerasa termostable. Els encebadors i el motlle no eren el problema. Sense extensió no hi ha producte, encara que l'hibridació sigui bona.

Exemple resolt

CRISPR talla el DNA i la cèl·lula repara el tall afegint dues bases a l'atzar. S'ha fet una edició precisa?

No. S'ha inactivat el gen, probablement, perquè dues bases desplacen el marc. L'edició precisa demana un motlle amb la seqüència desitjada i la via de reparació que el copia. El tall sol, sense motlle, és una interrupció, no una correcció dirigida.

Mini-PAU resolt

Es parteix de 4 molècules i es fan 10 cicles de PCR, amb eficiència del 100 %. Quantes còpies del tram hi ha al final? Per què el resultat no és 4 × 10?

Cada cicle dobla. $4 \times 2^{10} = 4 \times 1.024 = 4.096$. Multiplicar per 10 seria un creixement lineal, que no és el de la PCR. El creixement és exponencial mentre hi ha encebadors, nucleòtids i polimerasa activa. Quan un d'aquests s'acaba, la corba s'aplana i el 4.096 teòric no s'assoleix.

5.9 Aplicacions i teràpia gènica

Els microorganismes recombinants fabriquen insulina humana, factors de coagulació, enzims de rentadores o vacunes de subunitat. A l'agricultura, els transgènics porten resistència a una plaga o tolerància a un herbicida; també n'hi ha de dissenyats per enriquir un nutrient. Al medi, la bioremediació fa servir microbis (de vegades modificats) per degradar un contaminant. A la indústria alimentària, els enzims i els fermentadors són biotecnologia encara que el microorganisme no sigui transgènic. En recerca, un ratolí amb un gen humà mutat serveix de model d'una malaltia. El judici ètic que la prova demana no és un eslògan: cal dir quin benefici es busca, quin risc hi ha (flux del gen a una població silvestre, efecte no desitjat) i sobre quina dada es recolza.

La teràpia gènica introdueix un gen funcional en cèl·lules d'una persona per corregir una malaltia, sovint amb un virus desarmat com a vector (adenovirus, virus adenoassociats). El virus no ha de causar la malaltia: se n'han tret els gens de replicació i s'hi ha posat el gen terapèutic. No és el mateix que donar un fàrmac, ni que editar la línia germinal: la teràpia somàtica no passa als fills. Els anticossos monoclonals —tots iguals, contra un sol epítop— són una altra eina, d'immunoteràpia, i es fabriquen per biotecnologia.

Mini-PAU resolt

Un esquema de teràpia gènica mostra un virus que entra en una cèl·lula de la retina. Quina funció hi fa el virus? Quins enzims han calgut per muntar el DNA recombinant que porta?

El virus és el vector: introdueix el gen funcional a la cèl·lula. Per muntar el recombinant cal un enzim de restricció (talla el vector i l'insert) i la ligasa (els uneix). La polimerasa no substitueix la ligasa.

La teràpia gènica vol corregir una cèl·lula del pacient, no la descendència, quan és somàtica. El vector (sovint un virus desarmat) ha de portar el gen a les cèl·lules adequades i no integrar-se on activi un oncogen. La teràpia germinal canviaria zigot o gàmetes i es transmetria: no és el que es fa a la clínica. Un medicament recombinant, com la insulina feta en un bacteri o en un llevat, no és teràpia gènica: el gen s'ha posat al microorganisme, no al pacient.

Exemple resolt

Es produeix insulina humana en un bacteri amb un plasmidi. El bacteri s'ha de dir transgènic? I el pacient que se la injecta, també?

El bacteri que porta el gen humà és un organisme modificat, transgènic en el sentit ampli. El pacient no: no se li ha canviat el genoma, se li ha donat la proteïna. Confondre el fàrmac recombinant amb la teràpia gènica és l'error. La teràpia gènica seria posar el gen de la insulina a les cèl·lules del pacient, que no és com es tracta la diabetis.

Mini-PAU resolt

Un vector víric integra el gen corrector al costat d'un protooncogen i el deixa sempre engegat. Quina conseqüència no desitjada explica aquest disseny, i per què els vectors actuals miren on s'integren?

El protooncogen esdevé un oncogen de facto: la cèl·lula pot proliferar sense fre. És el risc de la inserció a l'atzar, vist en alguns assaigs antics. Per això es busquen llocs segurs d'integració o edició dirigida, i vectors que no integrin si n'hi ha prou amb una còpia transitòria.

Mini-PAU resolt

Es fabrica hormona de creixement humana en un bacteri. És teràpia gènica, clonació reproductiva o producció recombinant? Qui té el gen humà, el bacteri o el pacient?

Producció recombinant. El gen el té el bacteri, en un plasmidi. El pacient rep la proteïna, no el gen. No és teràpia gènica, que modificaria cèl·lules del pacient, ni clonació, que faria un organisme a partir d'un nucli. Els tres termes es separen per on és el DNA nou.

Exemple resolt

Una teràpia gènica somàtica corregeix cèl·lules de la medul·la. Els fills del pacient heretaran la correcció?

No. La medul·la no és la línia germinal. Els gàmetes continuen amb el gen original. La correcció es perd amb el pacient, en el sentit que no es transmet. Una intervenció sobre zigot o gònades seria una altra cosa, i no és el que es fa.

5.10 Mapa del tema

DNA que es copia, DNA que es transcriu, RNA que es tradueix, i les eines que tallen, enganxen, amplifiquen o editen aquest DNA. Si un problema dona una seqüència, el primer que cal decidir és si us han donat el motlle, la cadena codificant o l'RNA, i en quin sentit.

Resum

Procés	Enzim principal	Sentit	On, en un eucariota
Replicació	DNA-polimerasa	síntesi 5′→3′	nucli (i orgànuls)
Transcripció	RNA-polimerasa	motlle 3′→5′; RNA 5′→3′	nucli
Traducció	ribosoma (RNAr)	RNAm 5′→3′	citosol
PCR	Taq polimerasa	5′→3′	in vitro
CRISPR	Cas9 + RNA guia	tall bicatenari	on s'introdueixi

Errors típics a la PAU

- Fer créixer la cadena nova en sentit 3′→5′.
- Traduir el codó de parada o començar a llegir fora de l'AUG.
- Dir que l'operó lac s'expressa sempre que hi ha lactosa, oblidant la glucosa.
- Confondre OMG i transgènic, o clonació molecular i Dolly.
- Dir que la PCR necessita cèl·lules, o que el Cas9 talla sense RNA guia.
- Tractar una mutació silent com si canviés l'aminoàcid.

Glossari

Semiconservativa
: Cada doble hèlix filla conserva una de les dues cadenes parentals.

Fragment d'Okazaki
: Tros de DNA de la cadena retardada, sintetitzat a partir d'un encebador de RNA.

Codó
: Triplet de l'RNAm. AUG inicia; UAA, UAG i UGA aturen.

Operó
: Conjunt de gens procariotes transcrits en un sol RNAm i regulats plegats.

Epigenètica
: Regulació heretable a través de la mitosi que no canvia la seqüència del DNA.

DNA recombinant
: Molècula de DNA feta unint fragments d'orígens diferents.

Vector
: Molècula (plasmidi, virus) que introdueix un gen en una cèl·lula.

Transgènic
: OMG que porta un gen procedent d’una altra espècie.

Autoavaluació

1. En la forquilla de replicació, una de les dues cadenes noves es sintetitza en fragments. Per què no es poden fer les dues de manera contínua? Relacioneu-ho amb el sentit de la polimerasa i amb l’orientació de les cadenes motlle.

   La DNA-polimerasa només afegeix nucleòtids a un extrem 3′: llegeix el motlle en sentit 3′→5′ i la cadena nova creix 5′→3′. Les dues cadenes motlle són antiparal·leles. La que queda orientada de manera que el 3′ mira cap a l’obertura de la forquilla es pot anar copiant sense parar: és la cadena líder. L’altra mira al revés. Cada cop que la forquilla obre un tram nou, l’únic 3′ útil queda a l’extrem oposat al sentit d’avanç, i cal un encebador nou per fer un fragment cap enrere. Aquests fragments són els d’Okazaki, i la cadena es diu retardada. Després es treu l’RNA de l’encebador, es reomple amb DNA i la ligasa tanca el nick.

2. La cadena motlle d’un tram de DNA és 3′–ATG–5′, escrita en aquest sentit. Quin codó d’RNAm se’n transcriu, i quin aminoàcid codifica si UAC és tirosina i AUG és metionina? Expliqueu per què no surt l’AUG d’inici.

   La polimerasa llegeix el motlle 3′→5′ i l’RNA creix 5′→3′, complementari del motlle i amb uracil en lloc de timina. Del motlle 3′–ATG–5′ en surt l’RNAm 5′–UAC–3′. UAC codifica tirosina, no metionina. L’AUG d’inici només apareix si el motlle és 3′–TAC–5′. L’error habitual és copiar les lletres tal com estan escrites, sense invertir el sentit ni canviar T per U, i llegir ATG com si fos AUG. El marc i el sentit manen més que l’ordre en què algú ha escrit les bases a l’enunciat.

3. Un bacteri disposa alhora de lactosa i de glucosa. L’operó lac es transcriu al màxim? Raoneu-ho amb el paper del repressor i el de l’activador, sense limitar-vos a dir sí o no.

   No es transcriu al màxim. La lactosa inactiva el repressor, que deixa lliure l’operador, de manera que la polimerasa no queda bloquejada. Però la glucosa manté baix el cAMP, i sense cAMP no s’uneix l’activador CAP. Sense aquest activador, la transcripció és feble encara que el repressor no hi sigui. Les dues condicions de la transcripció plena són lactosa present i glucosa escassa. Dir només que «hi ha lactosa i per tant es transcriu» oblida la repressió per catabòlit.

4. En un exó, a meitat de la pauta de lectura, s’insereix una sola base. Quin efecte és el més probable sobre la proteïna, i per què és més greu, en general, que una substitució d’una base per una altra?

   El més probable és un desplaçament del marc de lectura. El ribosoma llegeix de tres en tres. Una base de més fa que, a partir d’aquell punt, tots els triplets siguin diferents, i sovint apareix aviat un codó de parada: la proteïna queda truncada o amb una seqüència irreconeixible des de la inserció. Una substitució, en canvi, toca un sol codó. Pot ser silenciosa, si el codó nou és sinònim; pot canviar un sol aminoàcid; o pot crear una parada. Només el canvi d’un codó, no el de tota la resta de la cadena. Per això una inserció que no és múltiple de tres és, en general, més greu.

5. Amb CRISPR s’inactiva un gen propi del tomàquet, sense introduir DNA de cap altra espècie. L’organisme resultant és un organisme modificat genèticament? És transgènic? Distingiu els dos termes.

   És un organisme modificat genèticament, perquè se n’ha canviat el genoma de manera dirigida: el gen propi ha quedat inactivat. No és transgènic, perquè transgènic vol dir que porta un gen procedent d’una altra espècie, i aquí no se n’hi ha afegit cap. Els dos termes no són sinònims. Tampoc no és una clonació: no s’ha transferit un nucli a un òvul. El tall de CRISPR, reparat amb errors i sense motlle, n’hi ha prou per inactivar; el motlle només faria falta si es volgués escriure una seqüència nova concreta.

6. Una PCR ideal parteix d’una sola molècula i fa 10 cicles. Quantes còpies del tram hi ha al final, en teoria? Per què el resultat no és 10, i per què a la pràctica solen ser-ne menys?

   Cada cicle dobla el nombre de còpies, de manera que després de 10 cicles n’hi ha $2^{10} = 1\,024$. Multiplicar per 10 seria un creixement lineal, i la PCR és exponencial mentre hi ha encebador, nucleòtids i polimerasa activa. A la pràctica se n’obtenen menys perquè algun d’aquests reactius s’acaba i la corba s’aplana, o perquè la polimerasa perd eficàcia. A més, la polimerasa ha de ser termostable: si fos d’un organisme de 37 °C, el pas a 95 °C del primer cicle la desnaturalitzaria i no hi hauria producte.

6. Evolució

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU

L'evolució és un fet que cal justificar amb evidències. Entren l'anagènesi i la cladogènesi, el lamarckisme (encerts i errors), el darwinisme i la teoria sintètica, i el contrast amb explicacions que neguen el fet (creacionisme, disseny intel·ligent) a partir de proves, no d'opinions.

Entra Hardy-Weinberg i el càlcul de freqüències, i els factors que les canvien: selecció natural, selecció sexual, mutació, deriva i flux gènic. Les fonts de variabilitat són la mutació i la recombinació. Cal distingir mutació somàtica i germinal, i els tipus (nucleotídica, estructural, cromosòmica, cariotípica). L'especiació és al·lopàtrica o simpàtrica, amb les barreres prezigòtiques i postzigòtiques. Al final, al nivell de les orientacions: gradualisme i equilibri puntuat, endosimbiosi, i evo-devo (ortòlegs, paràlegs, caixa d'eines, splicing alternatiu, duplicació).

6.1 L'evolució és un fet

L'evolució és el canvi de les poblacions al llarg del temps, amb avantpassats comuns. No és una hipòtesi pendent de demostrar: les evidències independents coincideixen. Una línia que canvia sense ramificar-se és anagènesi (evolució filètica). L'aparició de dues branques a partir d'una és cladogènesi, i és el que produeix espècies noves.




Figura 6.1. Les evidències no es llegeixen soles: encaixen entre elles. Homòleg no és el mateix que anàleg.

Els fòssils ordenen formes en el temps i mostren transicions. Els òrgans homòlegs tenen la mateixa estructura bàsica i un origen comú, encara que la funció hagi canviat (l'extremitat anterior d'un humà, d'un ratpenat i d'una balena). Els anàlegs fan la mateixa funció amb un origen diferent: les ales d'un ocell i les d'un insecte. Això és convergència. Els vestigials (l'apèndix, les restes de pelvis en algunes balenes) són estructures reduïdes que ja no fan la funció original. L'embriologia mostra semblances primerenques entre vertebrats. La biogeografia explica per què els marsupials es concentren a Austràlia i per què a les illes hi ha radiacions (moltes espècies properes que ocupen nínxols diferents, com els pinsans de les Galápagos). Les proves moleculars comparen DNA i proteïnes: com més recent és l'avantpassat comú, més s'assemblen les seqüències.

Idea clau

Homologia és parentiu. Analogia és convergència. Una ala no prova per si sola que dos animals siguin parents: cal mirar si l'estructura és la mateixa o només la funció.

Una prova sola no «demostra» l'evolució com si fos un experiment d'un dia. El que es demana és relacionar-ne dues: per exemple, que els ossos de l'extremitat anterior són homòlegs i que les seqüències del gen corresponent també s'assemblen més entre parents propers. La convergència explica per què una ala d'ocell i una ala d'insecte no són un argument de parentiu.

L'evolució, com a fet, és que les poblacions canvien al llarg del temps i que les espècies actuals venen d'avantpassats comuns. Les proves que la PAU demana de relacionar, no d'acumular, són: el registre fòssil (formes intermèdies i ordre temporal), l'anatomia comparada (homologies), el desenvolupament, la biogeografia i les seqüències de DNA i de proteïnes. Dues espècies properes s'assemblen en tot això alhora. Una sola coincidència es pot discutir; el paquet, no.

Homòleg és el mateix òrgan, heretat d'un avantpassat, encara que faci feines diferents: l'extremitat anterior d'un humà, d'un ratpenat i d'una balena. Anàleg és una funció semblant amb origen diferent: l'ala d'un ocell i l'ala d'un insecte. L'analogia és convergència, no parentiu. Fer servir una ala d'insecte per dir que l'ocell i la mosca són parents propers és l'error.

Mini-PAU resolt

El DNA del citocrom c humà s'assembla més al del ximpanzé que al del llevat, i l'extremitat anterior humana i la del ratpenat tenen els mateixos ossos. Quina de les dues proves és anatòmica i quina molecular, i què conclouen juntes?

Els ossos són anatomia comparada, una homologia. El citocrom és una prova molecular. Juntes diuen parentiu: l'humà és més a prop del ximpanzé que del llevat, i l'ala del ratpenat no és una invenció des de zero sinó una extremitat modificada. Cap de les dues, sola, no és «la prova»; es reforcen.

Exemple resolt

Un fòssil es troba en un estrat més profund que un altre. Quina conclusió d'edat és raonable, i quina no?

En una sèrie no capgirada, el més profund és més antic. No es pot dir l'any sense una datació, ni que l'un sigui avantpassat directe de l'altre. L'ordre relatiu és el que el registre dona per si sol.

Mini-PAU resolt

L'ala d'un ratpenat i l'ala d'una papallona serveixen per volar. L'esquelet de l'ala del ratpenat és el d'una mà. Quina comparació és homologia i quina no es pot fer servir com a prova de parentiu pròxim entre ratpenat i papallona?

L'ala del ratpenat és homòloga de la mà humana: mateix origen, funció diferent en part. L'ala de la papallona és anàloga a la del ratpenat: mateixa funció, origen diferent (cutícula, no ossos). Fer-les servir com a prova que el ratpenat i la papallona són parents propers és l'error. La convergència explica l'analogia.

Exemple resolt

Dues espècies tenen un gen amb un 98 % de bases iguals, i dues altres, un 70 %. Quina conclusió de parentiu és raonable, i quina dada única no n'hi faria prou?

El 98 % indica un avantpassat comú més recent que el 70 %, si es compara el mateix gen i es té en compte que algunes posicions canvien més de pressa. Una sola base igual en un sol lloc no diria res: pot coincidir per atzar. El que val és el conjunt de la seqüència, i millor si encaixa amb els fòssils i l'anatomia.

6.2 Lamarck, Darwin i la teoria sintètica

Lamarck va encertar que les espècies canvien i que l'ambient hi té un paper. El mecanisme que proposava no s'aguanta: l'ús i el desús no fan aparèixer òrgans nous, i els caràcters adquirits durant la vida (un múscul entrenat, una cua tallada) no s'hereten. L'error no és «creure en el canvi»; és la via d'herència.

Darwin i Wallace expliquen el canvi per selecció natural. Calen tres condicions: variació entre individus, herència d'aquesta variació, i èxit reproductiu diferent. Qui deixa més descendents en aquell ambient aporta més al·lels a la generació següent. No és «el fort sobreviu» ni una millora dirigida. La variació no apareix perquè faci falta.




Figura 6.2. Les tres condicions han de donar-se alhora. Sense herència, la selecció d'una generació no canvia la següent.

La teoria sintètica uneix Darwin amb la genètica de Mendel i de les poblacions: la selecció actua sobre fenotips, però el que canvia de freqüència són els al·lels. El creacionisme i el disseny intel·ligent neguen aquest fet o el substitueixen per una causa no comprovable. El que es contrasta a la prova són les evidències del punt anterior, no un debat d'opinions.

Mini-PAU resolt

Uns fongs patògens eren rars en mamífers perquè la nostra temperatura els anava malament. Amb un clima més càlid, les soques que toleren temperatures més altes es fan més freqüents. És lamarckisme o selecció?

Selecció. La tolerància ja variava a la població; no l'ha feta aparèixer la necessitat. Les soques que ja la tenien deixen més descendents. No és un caràcter adquirit i després heretat.

	Lamarck	Darwin	Teoria sintètica
Unitat que canvia	l'individu, al llarg de la vida	la població, entre generacions	la població, en freqüències al·lèliques
Mecanisme	ús i desús, i herència dels caràcters adquirits	variació heretable i selecció natural	el mateix, més mutació, deriva, flux i la genètica de Mendel
El que no es manté	un caràcter adquirit no s'hereta	Darwin no coneixia el gen	—

La selecció natural té tres condicions. Hi ha variació. Part d'aquesta variació s'hereta. Les variants no deixen el mateix nombre de descendents. El resultat és que la freqüència de l'al·lel que deixa més descendència puja. No és un esforç de l'individu per adaptar-se, ni una escala cap a la perfecció. El coll de les girafes no s'allarga perquè s'estirin: les que ja el tenien més llarg, per variació heretable, van deixar més fills.

Mini-PAU resolt

Un insecte sobreviu a un insecticida i els seus fills també hi resisteixen. Expliqueu-ho amb selecció, i escriviu la versió lamarckiana que no s'accepta.

A la població ja hi havia individus amb una variant heretable que tolerava el verí. El verí els va deixar reproduir-se més que els altres, i l'al·lel va pujar. La versió que no s'accepta és que el verí provoqués en cada insecte el caràcter i que aquest caràcter adquirit es passés als fills. El verí selecciona; no instrueix el genoma.

Exemple resolt

La selecció natural és aleatòria?

No. La mutació sí que ho és, respecte de la utilitat. La selecció no: les variants que deixen més descendents en aquell ambient pugen, i les altres baixen. Dir que «l'evolució és atzar» barreja les dues coses. La deriva sí que és atzar, i no és selecció.

Mini-PAU resolt

Escriviu en dues frases la diferència entre «la girafa allarga el coll perquè l'estira» i «a la població, els colls més llargs deixen més fills». Quina és seleccionista?

La primera atribueix el canvi a l'ús, en l'individu, i implica que el caràcter adquirit s'hereta: és Lamarck. La segona diu que ja hi havia variació heretable i que la reproducció diferencial en puja la freqüència: és selecció natural. Només la segona és compatible amb el que se sap de l'herència. L'estirament no canvia els gens que es passen.

Exemple resolt

Un caràcter adquirit, com un múscul entrenat, no es passa als fills. Quina de les tres condicions de la selecció falla?

L'herència. Hi ha variació (uns entrenen i altres no) i hi ha diferència de rendiment, però el múscul entrenat no és als gàmetes. Sense herència, la selecció d'una generació no canvia la següent. La condició que falla és la segona, no la de la reproducció diferencial.

Mini-PAU resolt

En una població de polls, un insecticida mata el 99 %. Al cap de dos anys, el mateix producte mata el 20 %. Proposeu l'explicació seleccionista i descarteu la lamarckiana en una frase.

El 1 % que va sobreviure portava, ja abans, una variant heretable de resistència. Els seus fills són la població actual, i per això el producte ja no funciona. No és que cada poll hagi desenvolupat resistència en resposta al verí i l'hagi llegada. Si fos així, la resistència apareixeria igual en una població sense variació prèvia, i no és el que s'observa.

6.3 Hardy-Weinberg i les forces evolutives

En una població ideal, les freqüències al·lèliques no canvien. Si p és la freqüència de A i q la de a, $p + q = 1$. Amb aparellament a l'atzar, els genotips queden p^2 (AA), $2pq$ (Aa) i q^2 (aa). Això és l'equilibri de Hardy-Weinberg. Les condicions són: població molt gran, aparellament aleatori, sense mutació, sense migració i sense selecció. Si se'n trenca alguna, hi ha evolució en aquell locus: canvi de p o de q.




Figura 6.4. El que canvia p i q. L'aparellament no aleatori, tot sol, canvia les freqüències dels genotips, no les dels al·lels.

La selecció natural canvia les freqüències segons l'èxit reproductiu. La selecció sexual és el cas en què l'èxit depèn d'aconseguir parella (la cua del paó). La mutació crea al·lels nous, gairebé sempre a freqüència baixa. La deriva és el canvi per atzar, fort en poblacions petites: un coll d'ampolla (la població es redueix de cop) o un efecte fundador (uns pocs individus colonitzen un lloc i no porten tots els al·lels). El flux gènic és la migració: entra o surt material genètic i les poblacions s'assemblen més.

Exemple resolt

Una malaltia autosòmica recessiva afecta 1 de cada 10 000 nadons. Quina fracció de la població és portadora, si suposem Hardy-Weinberg?

$q^2 = 1/10000$, $q = 1/100$. $p \approx 1$. Portadors $2pq \approx 2/100 = 1/50$. La freqüència d'afectats no és la de portadors.

Error típic

Dir que la consanguinitat, per si sola, fa evolucionar la població. Canvia quants homozigots hi ha. No canvia p ni q mentre no hi hagi selecció sobre aquests homozigots.

Mini-PAU resolt

En una població, el 16 % dels individus expressen un caràcter recessiu. Suposeu Hardy-Weinberg. Quina és la freqüència de l'al·lel recessiu i quina la de portadors?

$q^2 = 0{,}16$, $q = 0{,}4$. $p = 0{,}6$. Portadors $2pq = 2 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}4 = 0{,}48$, és a dir un 48 %. No és el 16 %.

Si la població és petita, la deriva pot canviar p d'una generació a l'altra encara que ningú no es reprodueixi millor. Un coll d'ampolla i un efecte fundador són dos casos de deriva, no de selecció.

En una població ideal, les freqüències no canvien. Les condicions són: població infinita (a la pràctica, molt gran), aparellament a l'atzar, ni mutació, ni migració, ni selecció. Llavors, si p és la freqüència de A i q la de a, amb $p + q = 1$, els genotips són p^2 (AA), $2pq$ (Aa) i q^2 (aa). Això és Hardy-Weinberg. Serveix de hipòtesi nul·la: si les freqüències no encaixen, alguna condició falla, i aquella condició és una força evolutiva.

Força	Què canvia	És adaptativa?
Selecció	p, a favor de qui deixa més fills	sí
Deriva	p, per atzar de mostreig; forta si la població és petita	no
Flux gènic	p, perquè entren o surten individus	no necessàriament
Mutació	crea al·lels nous; sola, canvia p molt a poc a poc	no
Aparellament no aleatori	les freqüències dels genotips, no les dels al·lels	no

Un coll d'ampolla i un efecte fundador són deriva: la població que queda, o la que colonitza, no és una mostra fidel. No són selecció, encara que després la selecció actuï sobre el que ha quedat.

Mini-PAU resolt

El 9 % d'una població mostra un caràcter autosòmic recessiu. Assumiu Hardy-Weinberg. Calculeu q, p i la freqüència de portadors.

$q^2 = 0{,}09$, $q = 0{,}3$. $p = 0{,}7$. Portadors $2pq = 2 \times 0{,}7 \times 0{,}3 = 0{,}42$, un 42 %. No és el 9 %, ni el 3 %. Els afectats són els homozigots; els portadors són molts més i no es veuen.

Exemple resolt

Una illa la colonitzen 10 ocells d'un continent on un al·lel és rar, i a l'illa aquell al·lel és freqüent. Quina força ho explica millor, si a l'illa l'al·lel no dona cap avantatge?

L'efecte fundador, un cas de deriva. Els 10 no eren una mostra representativa. No és selecció, perquè l'enunciat diu que no dona avantatge. Tampoc no és mutació: l'al·lel ja existia. Amb 10 individus, l'atzar pesa més que en el continent.

Mini-PAU resolt

En una població en equilibri, $p = 0{,}8$. Calculeu les freqüències d'AA, Aa i aa. Comproveu que sumen 1.

$q = 0{,}2$. AA = $p^2 = 0{,}64$. Aa = $2pq = 0{,}32$. aa = $q^2 = 0{,}04$. Suma 0,64 + 0,32 + 0,04 = 1. Si no suma 1, el càlcul està malament. Els portadors són el 32 %, vuit vegades els afectats. És el resultat que se sol demanar, no només q.

Exemple resolt

Una població compleix les freqüències de Hardy-Weinberg i, tot i així, p canvia una mica cada generació perquè és petita. Quina condició falla, i per què no és selecció si cap genotip no deixa més fills?

Falla la mida infinita. El canvi és deriva: l'atzar de qui es reprodueix. La selecció exigiria diferències de descendència lligades al genotip. Aquí l'enunciat diu que no n'hi ha. La fórmula és una aproximació; en una població petita no es manté exacta.

Mini-PAU resolt

El 36 % dels individus són homozigots recessius. La població està en equilibri. Quin percentatge són heterozigots?

$q^2 = 0{,}36$, $q = 0{,}6$, $p = 0{,}4$. Heterozigots $2pq = 2 \times 0{,}4 \times 0{,}6 = 0{,}48$, un 48 %. Homozigots dominants $p^2 = 0{,}16$, un 16 %. Comprovació: 16 + 48 + 36 = 100. El 36 % no és la freqüència de l'al·lel: és la del genotip. L'al·lel és 0,6, més alt, perquè també és a la meitat dels heterozigots.

Quan l'enunciat dona el percentatge d'afectats d'un recessiu, el primer pas és sempre l'arrel, no dividir per dos. Dividir el 36 % per dos i dir que els portadors són el 18 % és l'error de no fer servir el binomi.

6.4 Variabilitat: mutació i recombinació

Sense variació heretable no hi ha evolució. Les dues fonts són la mutació i la recombinació. La recombinació (entrecreuament a la profase I i el repartiment independent) no crea al·lels nous: fa combinacions noves. La mutació sí que canvia la seqüència, i és atzarosa respecte del que li aniria bé a l'organisme.

Per l'abast: una mutació nucleotídica és un canvi d'una o poques bases (silenciosa, de sentit o sense sentit; una inserció o deleció que no sigui múltiple de tres desplaça el marc). Una mutació estructural mou un tros de cromosoma (deleció, duplicació, inversió, translocació). Una mutació cromosòmica canvia l'estructura visible del cromosoma; la cariotípica canvia el nombre (trisomia 21). Les causes que citen les orientacions són errades de la replicació, errades de la meiosi, virus, transposons i agents externs (mutàgens: radiació, algunes substàncies).

Si la mutació és en una cèl·lula somàtica, queda en aquell llinatge i pot contribuir a un càncer, però no passa als fills. Si és en la línia germinal, entra als gàmetes i pot heretar-se. La resistència bacteriana als antibiòtics i el canvi de bec dels pinsans de les Galápagos són evolució observada: variació prèvia, herència i reproducció diferencial. L'antibiòtic no «ensenya» el bacteri a resistir.

Mini-PAU resolt

Una inserció d'un nucleòtid en un exó d'un gàmeta. És somàtica o germinal? Quin efecte és el més probable sobre la proteïna?

Germinal: pot passar a la descendència. Com que no és múltiple de tres, desplaça el marc de lectura des d'aquell punt i sovint apareix una parada prematura.

La mutació és l'única font d'al·lels nous. La recombinació i la segregació no en creen: barregen els que hi ha i fan genotips nous cada generació. Per a la selecció, aquesta barreja és la matèria primera immediata. Sense mutació, a llarg termini, no hi hauria res de nou per barrejar. Sense recombinació, la selecció arrossegaria blocs sencers de cromosoma.

La mutació és aleatòria respecte de la necessitat. No apareix perquè l'organisme la necessiti. Que després la selecció la conservi si és útil no la fa dirigida. La taxa és baixa per nucleòtid i per generació; en un genoma gran i una població gran, cada generació apareixen mutacions igualment.

Exemple resolt

Un bacteri resistent apareix en un cultiu exposat a l'antibiòtic. L'experiment de Luria i Delbrück va mostrar que les mutacions resistents ja hi eren abans d'afegir el verí. Quina frase de l'enunciat anterior és lamarckiana?

«Apareix en un cultiu exposat» suggereix que el verí les ha provocades. El que va mostrar l'experiment és que les colònies resistents sortien en nombres compatibles amb mutacions prèvies, a l'atzar, i que l'antibiòtic només les va seleccionar. La frase lamarckiana és la que fa del verí la causa de la mutació.

Mini-PAU resolt

Dos gens lligats es poden separar per entrecreuament. Això crea un al·lel nou?

No. Crea una combinació nova d'al·lels que ja existien, en un mateix cromosoma. L'al·lel nou només el fa un canvi de seqüència, la mutació. La recombinació és variació genètica, i la prova la vol distingida de la mutació, no barrejada.

Mini-PAU resolt

Una població té molta variació genètica i fa generacions que no apareix cap al·lel nou. D'on ha sortit la variació que encara es veu, i què la manté visible?

La variació nova, en el seu origen, va ser mutació. El que es veu ara són combinacions fetes per segregació i recombinació d'aquells al·lels. La recombinació no crea l'al·lel; el redistribueix. Sense mutació en el passat no hi hauria res per recombinar. Sense recombinació, la variació estaria en blocs que la selecció arrossegaria sencers.

Exemple resolt

Per què es diu que la mutació és aleatòria si no totes les mutacions són igual de probables?

Aleatòria respecte de la utilitat, no respecte de la química. Un canvi en una base pot ser més freqüent que en una altra. El que no passa és que la mutació útil aparegui perquè fa falta. La direcció la posa després la selecció, que conserva unes i n'elimina d'altres.

6.5 Especiació

El concepte biològic d'espècie (Mayr) diu que dues poblacions són de la mateixa espècie si es poden encreuar i tenir descendència fèrtil. No serveix bé per als fòssils ni per als organismes asexuals, i les orientacions ho deixen en aquest nivell: no cal la llista de conceptes alternatius.

L'aïllament prezigòtic impedeix la fecundació: hàbitat, temps, conducta, mecànica o gàmetes incompatibles. El postzigòtic actua després: l'híbrid no viu, és estèril (la mula) o la seva descendència és feble. L'especiació al·lopàtrica comença amb una barrera geogràfica; cada costat divergeix i, si la barrera cau, ja no es reprodueixen. La simpàtrica passa sense separar el territori. En plantes, una poliploïdia pot fer-ho d'una generació a l'altra.




Figura 6.3. Al·lopàtrica: primer la geografia. Simpàtrica: la barrera és reproductiva sense allunyar les poblacions.

Una espècie, en el concepte biològic, és un conjunt de poblacions que es creuen entre elles i queden aïllades reproductivament de les altres. No és «es assemblen». Dos gossos molt diferents són la mateixa espècie; un ase i un

cavall, que es poden assemblar més que dues races de gos, donen un mul estèril i són espècies diferents. El concepte falla en fòssils i en bacteris, que no tenen aquest tipus de creuament: allà es fan servir morfologia i seqüències. A batxillerat es fa servir el biològic i se n'assenyalen els límits.

L'especiació al·lopàtrica comença amb una barrera geogràfica. Les dues poblacions divergeixen per selecció i per deriva, i quan es retroben ja no es creuen. La simpàtrica passa sense separar els territoris: per exemple una poliploïdia en plantes, que fa un individu que no es creua amb el parental. La barrera és reproductiva des del primer moment.

Mini-PAU resolt

Un riu parteix una població de rossegadors. Al cap de molt temps el riu s'asseca i els dos grups no es creuen. Quin tipus d'especiació és, i en quin moment es pot dir que ja són dues espècies?

Al·lopàtrica: la barrera va ser geogràfica. Es pot dir que són dues espècies quan l'aïllament reproductiu es manté sense la geografia, és a dir quan el riu ja no hi és i tot i així no hi ha flux gènic. Mentre el riu hi era, no es podia saber si l'aïllament era només físic.

Exemple resolt

Dues plantes properes floreixen una a l'abril i l'altra al juliol, al mateix prat, i no s'hibriden. Quin tipus de barrera és?

Una barrera reproductiva prezigòtica, temporal, sense geografia. És un mecanisme d'aïllament, i si és l'únic que les separa i viuen barrejades, encaixa amb especiació simpàtrica o amb el manteniment de dues espècies ja fetes. No és al·lopàtrica: no hi ha barrera geogràfica.

Mini-PAU resolt

Dues poblacions separades per una serralada es tornen a trobar i els híbrids són estèrils. L'especiació ja s'ha completat? Era al·lopàtrica o simpàtrica?

Sí, si l'esterilitat es manté: hi ha aïllament reproductiu postzigòtic i ja no cal la serralada. Va ser al·lopàtrica, perquè la barrera inicial va ser geogràfica. Simpàtrica hauria començat sense separar els territoris. L'esterilitat de l'híbrid és el mateix tipus de dada que el mul, i aquí tanca l'especiació.

Exemple resolt

El concepte biològic d'espècie no s'aplica bé als fòssils. Quina dada es fa servir aleshores, i quin límit té?

La morfologia, i cada cop més les seqüències si es conserva material. El límit és que dos fòssils semblants poden ser espècies que no es creuaven, o una sola espècie amb dimorfisme. No es pot fer l'encreuament. El concepte biològic és clar on hi ha sexes i poblacions vives, i és una aproximació on no n'hi ha.

6.6 Perspectives actuals

El gradualisme espera canvis petits i continuats. L'equilibri puntuat descriu llargs períodes amb poc canvi i episodis curts de canvi ràpid, sovint lligats a l'especiació. No es contradiuen del tot: depenen de l'escala de temps. Les dues són interpretacions del registre, no mecanismes nous a banda de la selecció, la deriva i la mutació.

L'endosimbiosi explica mitocondris i cloroplasts: un procariota va quedar dins una cèl·lula hoste i no va ser digerit. Encaixen la doble membrana, el DNA circular i els ribosomes 70S. Els cianobacteris són el parent dels cloroplasts; un bacteri respirador, el dels mitocondris.

L'evo-devo, al nivell que demanen les orientacions, diu que la diversitat animal no exigeix gens del tot nous. Hi ha una caixa d'eines genètica conservada (gens del desenvolupament, com els Hox). Dos gens homòlegs separats per una especiació són ortòlegs. Dos gens nascuts d'una duplicació dins el mateix genoma són paràlegs. La duplicació deixa una còpia lliure de canviar. El splicing alternatiu treu més d'una proteïna d'un sol gen. Regular on i quan s'expressa un gen canvia el cos sense reescriure tota la seqüència.

Per ampliar · no és matèria d'examen

Els noms de les famílies Hox i els circuits concrets de la mosca no es demanen. N'hi ha prou amb caixa d'eines, ortòleg, paràleg, duplicació i splicing alternatiu.

La teoria sintètica no s'ha quedat congelada. La selecció pot actuar a més d'un nivell, la deriva es considera més important del que deien els textos de mitjan segle, i el desenvolupament explica per què no totes les formes són possibles: hi ha constriccions. L'equilibri puntuat descriu el registre com a llargs estasis i canvis relativament ràpids, no com una rampa constant. No nega la selecció. Cap d'aquestes idees no torna a Lamarck ni fa innecessària la genètica de poblacions.

Exemple resolt

Un text diu que «com que el registre mostra estasis, Darwin s'equivocava». On és l'error?

Darwin predeia canvi per selecció, no que cada llinatge hagués de canviar a velocitat constant cada mil anys. L'estasi és compatible amb una selecció estabilitzadora: es penalitza qui se separa de la mitjana. L'equilibri puntuat discuteix el tempo, no el mecanisme. Fer-lo servir per negar l'evolució és un mal ús del concepte.

Mini-PAU resolt

Per què una mutació avantatjosa es pot perdre igualment en una població de 20 individus?

Perquè la deriva, en una població petita, pesa més que un avantatge moderat. L'individu que la porta pot no reproduir-se per atzar: un accident, no una selecció en contra. En una població de milions, el mateix avantatge gairebé segur que s'estén. Selecció i deriva actuen alhora; la mida decideix quina es nota.

Mini-PAU resolt

Un llinatge fòssil no canvia de forma durant molt de temps i després canvia en un tram curt del registre. Això elimina la selecció natural?

No. L'estasi encaixa amb selecció estabilitzadora. El canvi relativament ràpid encaixa amb una selecció forta o amb un aïllament, en un temps que al registre sembla breu i en anys és llarg. L'equilibri puntuat discuteix el ritme. El mecanisme continua essent variació heretable i reproducció diferencial, més la deriva.

Exemple resolt

Per què una novetat morfològica no pot aparèixer «de qualsevol manera», encara que la selecció la afavorís?

Perquè el desenvolupament constreny el que es pot construir. No tot el que seria útil és accessible des de l'embrió que ja hi ha. La selecció tria entre les variants que el desenvolupament permet, no entre totes les formes imaginables. Això no és Lamarck: és un límit sobre la variació disponible.

6.7 Mapa del tema

Fet (evidències) → mecanisme (selecció i la resta de forces) → variació (mutació i recombinació) → espècies noves. Hardy-Weinberg és el zero: si les freqüències no canvien, en aquell locus no hi ha evolució.

Resum

Concepte	Què cal saber dir
Homòleg / anàleg	mateix origen / mateixa funció, origen diferent
Lamarck	el canvi sí; l'herència dels adquirits, no
Selecció	variació + herència + reproducció diferent
Hardy-Weinberg	$p+q=1$; $p^2+2pq+q^2=1$

Concepte	Què cal saber dir
Deriva	atzar; forta si la població és petita
Mutació germinal	pot heretar-se; la somàtica, no
Al·lopàtrica / simpàtrica	amb barrera geogràfica / sense

Errors típics a la PAU

- Dir que la selecció crea la variant que fa falta.
- Confondre homòleg i anàleg.
- Calcular els portadors com q^2 en comptes de $2pq$.
- Dir que Lamarck negava l'evolució.
- Tractar una mutació somàtica com si passés als fills.
- Dir que l'equilibri puntuat substitueix la selecció natural.

Glossari

Anagènesi
: Canvi dins d'un llinatge, sense ramificació.

Cladogènesi
: Divisió d'un llinatge en dos. És l'especiació.

Freqüència al·lèlica
: Proporció d'un al·lel en el conjunt de còpies del gen. $p + q = 1$.

Deriva gènica
: Canvi de freqüències per atzar de mostreig.

Flux gènic
: Entrada o sortida d'al·lels per migració.

Ortòlegs
: Gens homòlegs separats per una especiació.

Paràlegs
: Gens homòlegs nascuts d'una duplicació.

Endosimbiosi
: Origen dels mitocondris i dels cloroplasts a partir de procariotes interns.

Autoavaluació

1. En una població en equilibri, la freqüència d'homozigots recessius és $q^2 = 1/400$. Calculeu, pas a pas, la fracció aproximada de portadors heterozigots. Expliqueu per què no és 1/400 ni la meitat d'això.

   De $q^2 = 1/400$ se'n dedueix $q = 1/20 = 0{,}05$. Com que $p + q = 1$, $p = 0{,}95$, aproximadament 1 quan q és petit. La freqüència d'heterozigots és $2pq \approx 2 \times 1 \times 1/20 = 1/10$, un 10 %. El valor 1/400 és la freqüència dels afectats, que són homozigots i expressen el caràcter. Els portadors són heterozigots, no es veuen, i se'n calcula la freqüència amb 2pq, no dividint q^2 per dos. Amb aquestes xifres, els portadors són unes vint vegades més nombrosos que els afectats.

2. Les ales d'un ocell i les d'una papallona serveixen totes dues per volar. Són estructures homòlogues o anàlogues? Justifiqueu-ho amb l'origen, no només amb la funció, i digueu què se'n pot concloure sobre el parentiu.

   Són anàlogues. Fan la mateixa funció, volar, però no deriven de la mateixa estructura ancestral: l'ala de l'ocell és una extremitat de vertebrat modificada, amb ossos, i l'ala de la papallona és una expansió de la cutícula. Aquesta semblança és convergència, no herència d'un avantpassat comú alat. No es poden fer servir com a prova que l'ocell i la papallona siguin parents propers. Serien homòlogues, per exemple, l'ala de l'ocell i l'extremitat anterior d'un ratpenat o d'un humà, que comparteixen el mateix pla ossi encara que la funció no sigui idèntica.

3. Després d'aplicar un antibiòtic a un cultiu, al cap d'uns dies gairebé totes les colònies són resistents. D'on ha sortit aquesta resistència? Descarteu l'explicació segons la qual el bacteri desenvolupa el caràcter perquè el necessita.

   La resistència ve de mutacions que ja hi eren a la població, o que han aparegut a l'atzar, abans o durant el cultiu, sense relació amb la utilitat. L'antibiòtic no les instrueix: mata o atura les cèl·lules sensibles i deixa créixer les que ja toleraven el fàrmac, que passen a ser gairebé tota la població. Això és selecció natural. L'explicació que cal descartar és la lamarckiana: que cada bacteri, en contacte amb el verí, adquireixi la resistència i la transmeti. La mutació és aleatòria respecte de la necessitat; la direcció la posa després la selecció.

4. Definiu gen ortòleg i gen paràleg, i indiqueu quin procés origina cadascun. No n'hi ha prou amb dir que tots dos són homòlegs.

> Tots dos són gens homòlegs, és a dir que descendeixen d'un gen ancestral comú, però l'origen de la còpia és diferent. Els ortòlegs se separen quan dues espècies se separen: el gen es continua en cada llinatge després de l'especiació. Els paràlegs neixen d'una duplicació dins un mateix genoma, i les dues còpies poden després especialitzar-se en funcions diferents. Confondre'ls porta a comparar, com si fossin el mateix gen, dues còpies que en realitat s'han duplicat abans de l'especiació.

5. Dues poblacions d'una mateixa espècie queden separades per una serralada. Molt de temps després, quan tornen a entrar en contacte, ja no es poden encreuar. Com s'anomena aquesta especiació i quina barrera ha actuat primer?

> És especiació al·lopàtrica. La primera barrera ha estat geogràfica: la serralada ha impedit el flux gènic i les dues poblacions han divergit per selecció i per deriva. Quan es retroben, l'aïllament ja és reproductiu, perquè els híbrids no es formen o no són fèrtils, i la geografia ja no fa falta per mantenir-les separades. No és simpàtrica, que començaria sense separar els territoris. Mentre la serralada era l'única barrera, encara no es podia afirmar que fossin dues espècies: calia comprovar que, sense la geografia, continuaven sense encreuar-se.

7. Microbiologia

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU

Cal distingir bacteris i arqueus (paret, lípids, posició filogenètica, ecologia), espècie i soca, i calcular mides i augments amb les unitats m, mm, µm, nm i àngstrom. Entra el metabolisme bacterià i el seu paper en simbiosis i cicles biogeoquímics, la microbiota, les aplicacions (agricultura, farmàcia, alimentació, bioremediació) i les malalties, zoonosis i epidèmies.

Tècniques: esterilització, aïllament, cultiu i tinció de Gram. Transferència horitzontal: transformació, transducció i conjugació, i la resistència als antibiòtics. Les orientacions demanen no fer servir el terme parasexualitat. Dels virus cal composició, cicles lític i lisogènic i retrotranscripció. Viroides i prions es comparen amb els virus. Els fongs surten als exàmens com a patògens oportunistes, no com un tema de micologia.

7.1 Bacteris i arqueus

Bacteris i arqueus són procariotes: sense nucli, DNA circular al nucleoide, ribosomes 70S, sense orgànuls membranosos. No són el mateix grup. Els bacteris tenen paret de peptidoglicà i lípids de membrana amb enllaços èster. Els arqueus no tenen peptidoglicà; els lípids de membrana porten enllaços èter i cadenes isoprenoides, i n'hi ha d'extremòfils però també de comuns (metanògens, part de la microbiota). En els gens de la informació, els arqueus queden més a prop dels eucariotes que dels bacteris. Els tres dominis són Bacteria, Archaea i Eukarya.




Figura 7.1. Bacteri (Ali Zifan, CC BY-SA 4.0). Càpsula, paret, membrana plasmàtica, citoplasma, nucleoide, ribosomes, fímbria i flagel. No hi ha mesosoma: no és una estructura real. El plasmidi, quan n'hi ha, és un DNA petit a part del nucleoide. Els arqueus s'hi assemblen per fora i se'n separen per la paret i els lípids.

Una espècie bacteriana agrupa soques properes. La soca és un llinatge concret dins l'espècie, sovint amb un plasmidi o una virulència diferents. *Escherichia coli* K-12 i una soca que causa diarrea són la mateixa espècie i no el mateix risc.

Idea clau

El nom científic s'escriu en cursiva, el gènere amb majúscula i l'espècie amb minúscula: *Escherichia coli*. La soca, si es dona, va al darrere i no sempre en cursiva.

Bacteris i arqueus

	Bacteris	Arqueus
Organització	procariota	procariota
Paret	peptidoglicà	sense peptidoglicà
Lípids de membrana	enllaços èster	enllaços èter
Parentiu	domini Bacteria	més propers als eucariotes en la maquinària genètica

Dir «bacteri» per a qualsevol procariota és l'error. Els arqueus no es tenyeixen com un Gram clàssic de manual, perquè la tinció mira el peptidoglicà.

Bacteris i arqueus són procariotes: sense nucli, amb el DNA al nucleoide, ribosomes 70S i divisió per bipartició. No són el mateix domini. La paret bacteriana té peptidoglicà; la dels arqueus, no. Els lípids de membrana dels arqueus porten enllaços èter, no èster. La maquinària de transcripció dels arqueus s'assembla més a la eucariota que a la bacteriana. Per això un antibiòtic que toca el peptidoglicà (la penicil·lina i derivats, que bloquegen la síntesi de la paret) mata bacteris i no arqueus, i no toca les nostres cèl·lules, que no tenen aquesta paret.

	Bacteri	Arqueu	Eucariota
Nucli	no	no	sí
Peptidoglicà	sí	no	no
Ribosomes del citosol	70S	70S	80S
Exemple que es demana	E. coli, cianobacteris	metanògens, halòfils	la resta d'éssers del temari

Mini-PAU resolt

Un microbi viu a pH àcid i a alta temperatura, no té peptidoglicà ni nucli, i els seus lípids de membrana són èters. És un bacteri extremòfil?

No. Sense peptidoglicà, amb èters i procariota, és un arqueu. «Extremòfil» descriu l'hàbitat, no el domini. Hi ha bacteris extremòfils, però aquests trets de paret i de lípids són d'arqueu. El pH i la temperatura no decideixen el domini.

Exemple resolt

Per què la penicil·lina no serveix contra un refredat víric ni contra un llevat?

Perquè actua sobre la síntesi del peptidoglicà. El virus no té paret bacteriana ni metabolisme propi de paret. El llevat és un fong, eucariota, amb paret de quitina. L'antibiòtic no té diana. Prendre'n per un virus només selecciona bacteris resistents de la microbiota.

Mini-PAU resolt

Un fàrmac inhibeix la síntesi de peptidoglicà. Sobre qui actua, sobre qui no, i per què un arqueu i una cèl·lula humana queden fora?

Actua sobre bacteris, que tenen peptidoglicà a la paret. Un arqueu no en té: la paret és una altra. Una cèl·lula humana no té paret. El fàrmac no té diana en cap dels dos. No n'hi ha prou amb dir «procariota»: els arqueus ho són i no caurien.

Exemple resolt

Per què el ribosoma 70S d'un bacteri és una diana possible i el 80S del citosol humà no, amb el mateix fàrmac?

Perquè l'estructura no és la mateixa i el fàrmac encaixa en una. El 70S del mitocondri és el risc: s'assembla al bacterià. El 80S no. Un antibiòtic ben triat aprofita aquesta diferència. No tots els antibiòtics van al ribosoma; els de la paret van a un altre lloc.

7.2 Mida, Gram, cultiu i esterilització

Un bacteri típic fa 1–5 µm. Un virus, desenes o pocs centenars de nm. Una cèl·lula eucariota, 10–100 µm. Unitats: 1 mm = 10^3 µm = 10^6 nm. 1 Å = 0,1 nm. Els augments són la mida de la imatge dividida per la mida real, en les mateixes unitats. Mida real = mida de la imatge / augments.

Exemple resolt

En una micrografia de ×5 000, un bacteri mesura 10 mm. Quina mida real té, en µm?

10 mm / 5000 = 0,002 mm = 2 µm. Si l'enunciat dona una barra d'escala, és més segur fer servir l'escala que els mil·límetres de la pantalla.

La tinció de Gram separa bacteris per la paret. El cristall violeta i el lugol tenyeixen de lila. L'alcohol deshidrata. En els Gram positius la capa gruixuda de peptidoglicà reté el violeta i queden liles. En els Gram negatius la capa és prima i hi ha una membrana externa amb lipopolisacàrid: perden el violeta i la safranina els deixa roses. No és una classificació filogenètica completa, però és la que demana la prova.

El cultiu es fa en medi sòlid o líquid, estèril, sembrant en condicions asèptiques. En placa, una cèl·lula viable dona una colònia. L'aïllament per estries separa colònies. Esterilitzar vol dir eliminar tota forma viable, incloses les espores. L'autoclau (vapor a uns 121 °C) ho fa. La calor seca, la filtració (per a líquids que no es poden escalfar), la radiació i alguns desinfectants també, segons el cas. La pasteurització redueix la càrrega i no esterilitza.

La tinció de Gram separa bacteris per la paret. Els Gram positius tenen una capa gruixuda de peptidoglicà i queden violetes. Els Gram negatius en tenen una de prima i, per fora, una membrana externa amb lipopolisacàrid; es

decoloren i agafen el contrast, rosa. No és una classificació evolutiva neta, però prediu sensibilitat a antibiòtics i el tipus d'estructura. Els arqueus no es tenyeixen com un Gram fiable, perquè la tinció mira el peptidoglicà.

Cultivar és fer créixer en un medi. Esterilitzar és matar tota forma de vida, espores incloses: autoclau (vapor a pressió), flama, filtració per a líquids que no es poden escalfar. Desinfectar és reduir els microorganismes d'una superfície, no garantir l'absència d'espores. Pasteuritzar és un escalfament suau que mata patògens vegetatius i allarga la vida de la llet; no esterilitza. Una espora bacteriana no és un gàmeta: és una forma de resistència, amb el DNA protegit, que germina quan les condicions tornen.

Mini-PAU resolt

Un material quirúrgic surt de l'autoclau. Es pot dir que està desinfectat, i prou? I una llet pasteuritzada està estèril?

L'autoclau esterilitza: és més que desinfectar. La llet pasteuritzada no està estèril: s'han mort formes vegetatives i queden, o hi poden quedar, espores i microorganismes termoresistents no patògens. Per això es guarda a la nevera i caduca. Confondre els tres mots és un error de protocol, no de vocabulari menor.

Exemple resolt

Un bacteri Gram negatiu i un de positiu es tracten amb un antibiòtic que ha de travessar la membrana externa. Quin dels dos és més probable que resisteixi per una qüestió de barrera?

El Gram negatiu, perquè té la membrana externa amb lipopolisacàrid, que moltes molècules no travessen. El positiu té el peptidoglicà exposat. No és una llei per a tots els antibiòtics: depèn de la diana. Però la barrera extra és del Gram negatiu.

Mini-PAU resolt

Ordeneu de menys a més eficaç, per a un instrumental que ha de quedar sense cap microorganisme ni espora: rentar amb aigua, desinfectar, pasteuritzar, esterilitzar a l'autoclau. Quina sobra perquè no s'aplica a instrumental?

Rentar, desinfectar, esterilitzar. Pasteuritzar sobra: és un tractament de la llet i de líquids alimentaris, no d'un bisturí, i no mata espores. L'autoclau és el que es fa servir al quiròfan. Desinfectar rebaixa la càrrega; no garanteix l'esterilitat.

Exemple resolt

Una espora bacteriana germina quan tornen l'aigua i els nutrients. És un ou o un gàmeta?

No. És la mateixa cèl·lula, en forma resistent, amb el DNA protegit i el metabolisme aturat. No hi ha reducció cromosòmica ni fecundació. Germinar és reprendre el creixement vegetatiu. Tractar-la com a reproducció sexual és l'error.

7.3 Metabolisme, simbiosi i cicles

Pel que mengen i d'on treuen l'energia, els bacteris es reparteixen en fotoautòtrofs (cianobacteris: llum i CO_2, amb O_2), fotoheteròtrofs, quimioautòtrofs (oxiden un inorgànic i fixen CO_2: nitrificants, bacteris del sofre) i quimioheteròtrofs (la majoria de patògens i descomponedors). N'hi ha d'aerobis, d'anaerobis estrictes i de facultatius.

La simbiosi és una relació estreta i duradora. El mutualisme beneficia els dos (*Rhizobium* i les lleguminoses: la planta dona compostos de carboni i el bacteri fixa N_2). El comensalisme beneficia l'un sense perjudicar l'altre. El parasitisme beneficia l'un i perjudica l'hoste.




Figura 7.4. Cicle del nitrogen. Els passos bacterians que cal saber dir: fixació, nitrificació, desnitrificació i amonificació.

Al cicle del nitrogen, la nitrogenasa d'*Azotobacter* o de *Rhizobium* passa N_2 a amoni. *Nitrosomonas* oxida amoni a nitrit i *Nitrobacter* el nitrit a nitrat: és la nitrificació, quimiosíntesi. La desnitrificació torna N_2 a l'atmosfera. L'amonificació allibera amoni de la matèria orgànica. Al carboni, fotosíntesi i respiració mouen el CO_2; alguns arqueus fan metà. Al sofre, hi ha bacteris que oxiden o redueixen compostos de sofre. Al fòsfor no hi ha un pas gasós important: els microorganismes mineralitzen fosfat orgànic. Això és el que el currículum de 2n demana dels ecosistemes. La petjada ecològica i les xarxes tròfiques completes són de 1r i no són un bloc de la PAU de Biologia de 2n.

Idea clau

El criteri de processar matèria i energia «també a escala d'ecosistema» es respon amb aquests cicles, no amb un tema sencer d'ecologia de 1r.

Els bacteris ocupen tots els papers tròfics. N'hi ha de fotoautòtrofs (cianobacteris), de quimioautòtrofs (nitrificants) i de heteròtrofs (la majoria dels que cultivem). Al cicle del nitrogen els passos que cal saber atribuir són: fixació de N_2 a amoníac (Rhizobium i cianobacteris, entre d'altres), nitrificació (amoníac a nitrit i nitrit a nitrat, bacteris quimiosintètics), assimilació del nitrat per les plantes, amonificació (descomponedors que tornen amoníac des de la matèria orgànica) i desnitrificació (nitrat a N_2, que torna a l'atmosfera i tanca el cicle). Sense fixadors, el nitrogen de l'aire no entraria a la xarxa tròfica.

Mini-PAU resolt

Un camp sense lleguminoses s'empobreix en nitrogen disponible, tot i que l'aire és nitrogen en un 78 %. Quin pas microbià hi falta i per què l'aire no n'hi fa prou?

Falta la fixació. El N_2 és molt estable i gairebé cap ésser viu el pot reduir. Els Rhizobium de les arrels de les lleguminoses, i alguns cianobacteris, sí. El nitrogen de l'aire no és nitrat. Sense el pas biològic, o sense adob, les plantes no tenen font.

Exemple resolt

La desnitrificació i la fixació semblen contradictòries. Per què les dues són necessàries al cicle?

La fixació treu N_2 de l'atmosfera i el posa en forma biològica. La desnitrificació el torna a l'atmosfera. Sense la segona, el nitrogen es quedaria acumulat als sòls i a l'aigua i l'atmosfera se n'empobriria a escala geològica. Són passos oposats en la forma química i complementaris en el cicle. La nitrificació, al mig, passa d'amoníac a nitrat, que és el que moltes plantes absorbeixen.

Mini-PAU resolt

Poseu en ordre, des del N_2 atmosfèric fins al N_2 que hi torna: fixació, nitrificació, assimilació, amonificació, desnitrificació. Qui fa la fixació i qui la desnitrificació?

Fixació (N_2 → amoníac, Rhizobium o cianobacteris), assimilació (la planta incorpora el nitrogen), amonificació (els descomponedors tornen amoníac), nitrificació (amoníac → nitrat) i desnitrificació (nitrat → N_2, bacteris). L'ordre entre amonificació i nitrificació es pot creuar segons si es parteix de matèria orgànica o d'amoníac ja fixat. El que no es pot fer és posar la desnitrificació abans de tenir nitrat, ni la fixació com si fos nitrificació.

Exemple resolt

Per què un adob de nitrat no és el mateix procés que la fixació, si tots dos aporten nitrogen a la planta?

Perquè el nitrat ja està en forma assimilable: la planta el pot absorbir sense cap microbi. La fixació és reduir el N_2, que la planta no sap fer. L'adob salta el pas biològic. La fixació continua essent l'única entrada natural des de l'atmosfera.

Mini-PAU resolt

Un sòl perd nitrat cap a l'atmosfera en condicions d'anòxia. Quin procés bacterià és, i per què no és la fixació, que també toca el N_2?

És la desnitrificació: nitrat a N_2. La fixació va en sentit contrari, de N_2 a amoníac, i la fan organismes amb nitrogenasa, sovint en simbiosi i amb un cost gran d'ATP. La desnitrificació la fan altres bacteris quan no hi ha oxigen i fan servir el nitrat com a acceptor. El mateix gas, dos sentits, dos grups de microorganismes.

7.4 Microbiota, malaltia i indústria

La microbiota és el conjunt de microorganismes que viuen en un cos sa o en un ambient. No es diu flora. A l'intestí ajuda a digerir, fabrica algunes vitamines i ocupa el lloc que si no ocuparia un patògen. Un desinfectant mal aplicat o un antibiòtic innecessari la desmunten.

Un patogen causa malaltia. Una zoonosi passa d'un animal vertebrat a les persones (la ràbia). Una epidèmia és un augment de casos per damunt del que és habitual en un lloc i un temps; una pandèmia s'estén per països. L'endèmia es manté de manera estable en una zona.

Les aplicacions que cal saber citar: agricultura (*Rhizobium*, control biològic), farmàcia (antibiòtics, insulina recombinant), alimentació (iogurt, formatge, pa, vi) i bioremediació (degradar un contaminant). No tot microorganisme industrial és transgènic.

La microbiota normal colonitza pell i mucoses i competeix amb els patògens pel lloc i pels nutrients. No és un brutícia a eliminar. Un antibiòtic d'ampli espectre la redueix i obre la porta a oportunistes. Patògen és el que provoca malaltia; oportunista, el que només ho fa si les defenses o la microbiota fallen. La virulència és el grau, no un sinònim de «microbi».

A la indústria, els bacteris i els fongs fan iogurt i formatge (fermentació làctica), pa i cervesa (fermentació alcohòlica del llevat), antibiòtics (fongs i actinobacteris) i proteïnes recombinants. El microorganisme industrial no és un patògen: és un productor. Cal dir quin metabolisme fa servir, no només «s'hi posen microbis».

Exemple resolt

Després d'un antibiòtic, una persona fa una infecció per un fong que abans no es notava. El fong s'ha tornat més virulent?

No necessàriament. Ha desaparegut la competència bacteriana que el mantenia a ratlla. És un oportunista aprofitant un nínxol buit, no una mutació de virulència. Tornar a tenir microbiota és el que el controla, no un antifúngic per sistema.

Mini-PAU resolt

El iogurt es fa amb llet i bacteris que produeixen làctic. Quin tipus de metabolisme és, quin gas no s'ha d'esperar, i per què la llet s'acidifica?

Fermentació làctica. No hi ha CO_2, a diferència de l'alcohòlica: el piruvat es redueix a lactat sense descarboxilar-se. El làctic baixa el pH, la caseïna coagula i la llet s'espessa. L'ATP dels bacteris és el de la glucòlisi, 2 per glucosa.

Mini-PAU resolt

Un antibiòtic d'ampli espectre cura una infecció i, al cap d'uns dies, apareix una altra infecció per un microorganisme que ja era a l'intestí. Què s'ha eliminat a més del patogen?

Part de la microbiota que competia amb ell. L'oportunista no ha hagut de tornar-se més virulent: ha trobat el lloc lliure. El patogen inicial i l'oportunista no són el mateix episodi. Refer la microbiota, no allargar l'antibiòtic sense motiu, és el que tanca la història.

Exemple resolt

El pa, la cervesa i el iogurt són fermentacions. Per què només un desprèn CO_2 en quantitat, i quin organisme el fa?

El pa i la cervesa són llevat, fermentació alcohòlica, amb CO_2. El iogurt és bacteris, fermentació làctica, sense CO_2. El llevat és un fong unicel·lular, no un bacteri. El CO_2 del pa és el mateix tipus de reacció que el de la cervesa; canvia el que se'n fa, no la via.

7.5 Transferència horitzontal i antibiòtics

Els bacteris no només hereten el DNA de la cèl·lula mare. En passen entre cèl·lules del mateix moment. La transformació és la captació de DNA lliure del medi. La transducció la fa un bacteriòfag, que s'enduu DNA de l'hoste anterior. La conjugació passa per un pilus: sovint un plasmidi (el plasmidi F, o un plasmidi R de resistències). Cap d'aquests tres processos es diu parasexualitat: les orientacions rebutgen el terme.

Els antibiòtics actuen, segons la família, sobre la paret (els β-lactàmics), sobre el ribosoma 70S, sobre la síntesi d'àcids nucleics o sobre la membrana. El 70S permet una certa selectivitat: el nostre ribosoma citosòlic és 80S. La resistència apareix per mutació o, molt sovint, arriba en un plasmidi R per conjugació. Fer servir antibiòtics quan no calen selecciona les soques resistents. No és que el fàrmac ensenyi el bacteri.

Mini-PAU resolt

Un plasmidi amb un gen de resistència passa d'un bacteri viu a un altre per un pilus, sense que hi hagi fag ni DNA lliure al medi. Com es diu el mecanisme?

Conjugació. Si fos DNA nu, transformació. Si el vehicle fos un virus, transducció.

Els bacteris no fan meiosi, però barregen DNA. La transformació agafa DNA lliure del medi. La transducció el rep d'un bacteriòfag que s'ha endut un tros del bacteri anterior. La conjugació el passa per un pont, des d'un bacteri que té el plasmidi adequat. Les tres són transferència horitzontal: el receptor no és fill del donant. Un plasmidi de resistència es pot escampar així més de pressa que per mutació.

La resistència no és «el cos que s'acostuma». És una població bacteriana on una variant heretable (una bomba d'eflux, un enzim que trenca l'antibiòtic, una diana modificada) sobreviu i substitueix les altres. Acabar el tractament importa perquè les cèl·lules que queden, les més tolerants, són les que fundarien la població resistent. No crear l'antibiòtic amb l'ús incorrecte: seleccionar-lo.

Mini-PAU resolt

Un plasmidi amb un gen de resistència passa d'un bacteri a un altre per un pont, sense que cap dels dos es divideixi. Com es diu el mecanisme, i per què no és una mutació?

Conjugació. No és una mutació perquè la seqüència no ha canviat dins del donant: s'ha copiat un DNA que ja existia i s'ha transferit. El receptor guanya el gen d'un sol cop. La mutació seria un canvi nou de bases. La conjugació explica que la resistència salti entre soques, i fins i tot entre espècies properes.

Exemple resolt

Per què un antibiòtic bacteriostàtic i un de bactericida no es descriuen igual, si tots dos «curen»?

El bacteriostàtic atura el creixement i deixa que el sistema immunitari acabi la feina. El bactericida mata. En un pacient immunodeprimit, aturar el creixement pot no bastar. A la prova, el que es valora és no dir que tot antibiòtic lisia la cèl·lula: només ho fan els que destrueixen la paret en una cèl·lula que creix.

Mini-PAU resolt

Un bacteri sensible es torna resistent després de conviure amb un de resistent, sense dividir-se i sense que hi hagi DNA lliure al medi ni virus. Quin mecanisme queda, i quin gen és més probable que hagi passat?

La conjugació: el DNA passa per un pont, no pel medi ni per un fag. El que sol passar és un plasmidi, sovint amb gens de resistència. No és transformació (això seria DNA lliure) ni transducció (això seria un virus). Tampoc no és una mutació nova: el gen ja era al donant.

Exemple resolt

Per què no acabar un tractament antibiòtic selecciona resistents, si el fàrmac els mata?

Perquè els mata desigualment. Els més sensibles moren primer. Els que toleren una mica més queden, si es talla el tractament abans d'eliminar-los, i són la població que creix després. El fàrmac no els ha fet resistents; els ha deixat sols. Completar el tractament és reduir aquesta finestra.

7.6 Virus: estructura i cicles

Un virus no és una cèl·lula. És un àcid nucleic (DNA o RNA, d'una o dues cadenes) dins una càpsida de proteïna. Alguns porten un embolcall membranós, pres de l'hoste, amb espines. No tenen metabolisme propi: només es repliquen dins una cèl·lula. Es classifiquen pel genoma i per l'hoste, no per un regne clàssic.




Figura 7.2. Bacteriòfag de cua llarga (Adenosine, CC BY-SA 2.5). Cap amb DNA, collar, cua, placa basal i fibres. No tots els virus tenen cua: molts només tenen càpsida i, alguns, embolcall.

El cicle lític d’un bacteriòfag: adsorció, entrada del genoma, replicació i síntesi de peces, acoblament i lisi de l’hoste. El lisogènic: el DNA víric s’integra (pròfag) i es copia amb el bacteri fins que un senyal l’indueix i entra en el cicle lític. No tots els virus fan els dos cicles.




Figura 7.3. Lític: el virus es multiplica i trenca la cèl·lula. Lisogènic: el genoma s’integra i espera.

Els retrovirus, com el VIH, porten RNA i retrotranscriptasa. L’RNA es copia a DNA, el DNA s’integra com a provirus i a partir d’aquí la cèl·lula el transcriu i el tradueix com si fos seu. La retrotranscripció és l’excepció al camí DNA → RNA, no el camí habitual de les nostres cèl·lules.

Cicle lític i cicle lisogènic

	Lític	Lisogènic
El genoma víric	es replica a part	s’integra (pròfag) i es copia amb el bacteri
La cèl·lula	es trenca i allibera virus	continua viva fins a la inducció
Quan es veu	infecció productiva	latència; després pot passar al lític

Un retrovirus com el VIH fa un pas de més: l’RNA es copia a DNA (retrotranscriptasa) i aquest DNA s’integra. No és un bacteriòfag, però el principi d’integració s’assembla al lisogènic.

Un virus no és una cèl·lula. No té metabolisme propi ni ribosomes. Té un genoma (DNA o RNA) dins una càpsida de proteïna i, alguns, un embolcall membranós robat a la cèl·lula hoste. Es replica només dins una cèl·lula, fent servir la seva maquinària. Fora, és un virió inert. El bacteriòfag de la làmina té cap, collar, cua, placa basal i fibres: és un model de virus complex. Molts virus animals no tenen cua; tenen càpsida i, sovint, embolcall amb glicoproteïnes d’unió.

Al cicle lític el virus entra, copia el genoma, fabrica peces, es munta i trenca la cèl·lula. Al lisogènic el genoma s’integra (pròfag) i es replica amb el bacteri, sense matar-lo, fins que un senyal l’indueix i passa al lític. No tot virus latent és un pròfag: el terme pròfag és el del bacteriòfag. El VIH integra DNA, però és un retrovirus d’una cèl·lula eucariota.

Mini-PAU resolt

Un cultiu bacterià es lisi al cap d'una hora d'afegir un filtrat que passa un filtre de 0,2 µm. Al microscopi òptic no es veu cap bacteri nou. Què hi ha al filtrat, i quin cicle encaixa amb la lisi ràpida?

Un bacteriòfag: passa el filtre que atura bacteris i no es veu a l'òptic. La lisi ràpida és el cicle lític. Si el cultiu no es lisés i, en canvi, els bacteris fills heretessin la capacitat de produir virus després d'un xoc, seria lisogènic. El filtrat no és un verí químic si la capacitat de lisar es transmet diluint-lo en cultius nous: això és replicació.

Exemple resolt

El VIH porta RNA i, un cop dins el limfòcit, apareix DNA víric al cromosoma. Quin enzim víric falta en un bacteriòfag de DNA, i per què?

La retrotranscriptasa. El bacteriòfag de DNA ja porta el mateix tipus d'àcid nucleic que el cromosoma hoste i el pot replicar sense passar per RNA. El VIH ha de fer DNA a partir del seu RNA abans d'integrar-se. Sense aquest enzim, el seu cicle s'atura. Els fàrmacs que el bloquegen no servirien contra un virus de DNA.

Mini-PAU resolt

Un virus integra el genoma i la cèl·lula continua dividint-se, fins que un agent nociu indueix la producció de partícules i la lisi. Com es diuen les dues fases, i en quin moment és un pròfag si l'hoste és un bacteri?

La fase d'integració i espera és la lisogènica; la de producció i lisi, la lítica. Mentre està integrat en un bacteri, el genoma víric es diu pròfag. No és un pròfag si l'hoste és una cèl·lula humana: el terme és aquest. La inducció és el pas de l'una a l'altra, no un tercer cicle.

Exemple resolt

Per què un virus no creix en un medi de cultiu ric, sense cèl·lules, i un bacteri sí?

Perquè el virus no té ribosomes ni metabolisme. El medi li dona molècules, no la maquinària per fer-les servir. El bacteri sí que té la maquinària i pot fer servir el medi. Cultivar un virus vol dir cultivar cèl·lules i infectar-les. Una placa de Petri sola no és un hoste.

Mini-PAU resolt

Compareu, en quatre files, el cicle lític i el lisogènic: on és el genoma, què fa la cèl·lula, si es produeixen virions de seguida, i com es passa de l'un a l'altre.

Lític: el genoma es replica a part, la cèl·lula acaba lisant-se, els virions surten de seguida, i no cal cap inducció perquè ja és el cicle productiu. Lisogènic: el genoma integrat (pròfag, si és un bacteri), la cèl·lula viu i es divideix, no hi ha virions mentre dura la latència, i un senyal d'estrès indueix el pas al lític. No són dos virus diferents. Són dos programes del mateix virus, quan el virus els té tots dos.

7.7 Viroides, prions i fongs




Figura 7.5. Tres formes acel·lulars. El virus és l'única que porta àcid nucleic i càpsida.

Un viroide és un RNA circular petit, sense càpsida, que infecta plantes. Un prió és una proteïna mal plegada (PrPSc) que indueix el plegament anormal de la proteïna normal. No porta àcid nucleic. Causa encefalopaties espongiformes, com la de Creutzfeldt-Jakob. No es combat amb un antibiòtic ni amb un antiviral clàssic.

Els fongs són eucariotes, amb paret de quitina. Els llevats són unicel·lulars; les floridures fan hifes. Són heteròtrofs. En un examen surten sobretot com a oportunistes: *Candida* aprofita una immunodepressió o una microbiota desfeta. No cal la classificació dels fílums.

Exemple resolt

Una pàgina diu que un prió és un virus molt petit. Què hi ha de malament?

El prió no té àcid nucleic ni càpsida. No és un virus. És una proteïna infecciosa.

Un viroide és un RNA circular nu, sense càpsida, que infecta plantes. No codifica proteïnes: interfereix amb l'RNA de l'hoste. Un prió és una proteïna mal plegada que indueix el plegament incorrecte de la proteïna sana del mateix tipus. No porta àcid nucleic. Les encefalopaties espongiformes en són l'exemple. Un fong és eucariota, amb paret de quitina, i pot ser unicel·lular (llevat) o filamentós (floridura). No és un bacteri. Els antibiòtics de la paret bacteriana no el toquen; per això hi ha antifúngics, amb una altra diana.

	Àcid nucleic	Càpsida	Cèl·lula?
Virus	sí	sí	no
Viroide	RNA nu	no	no
Prió	no	no	no; és una proteïna
Bacteri	DNA propi	no	sí, procariota
Fong	genoma eucariota	no	sí

Mini-PAU resolt

Un agent infecciós no es destrueix amb una digestió que trenca àcids nucleics, i sí amb una que desnaturalitza proteïnes. No es veu cap partícula amb càpsida. Què és, i què no pot ser?

Un prió. No pot ser un virus ni un viroide, perquè aquests es perden si es destrueix l'àcid nucleic. No pot ser un bacteri. La proteïna és l'agent, i transmet el plegament, no una seqüència de nucleòtids.

Exemple resolt

Per què un llevat es pot fer servir per produir una proteïna humana glicosilada i un bacteri, sovint, no de la mateixa manera?

Perquè el llevat és eucariota i té reticle i Golgi, que fan la glicosilació. El bacteri no té aquests orgànuls. La proteïna es pot sintetitzar igualment al ribosoma bacterià, però sense els sucres que l'hoste humà hi posaria. Per a algunes proteïnes terapèutiques això obliga a triar un hoste eucariota.

Mini-PAU resolt

Tres agents: un RNA sense càpsida que infecta plantes, una proteïna que canvia el plegament d'una altra, un eucariota amb paret de quitina. Poseu el nom i digueu quin no es destrueix trencant àcids nucleics.

Viroide, prió i fong. El prió no es destrueix trencant àcids nucleics, perquè no en porta. El viroide sí que cau, perquè és RNA. El fong també, perquè té genoma, a més de ser una cèl·lula que es mata per moltes altres vies. El que l'enunciat vol aïllar és el prió.

Exemple resolt

Un llevat i un bacteri fan tots dos fermentació alcohòlica en algunes soques, però només un serveix per glicosil·lar una proteïna humana. Quin, i per quin orgànul?

El llevat, perquè té reticle i Golgi. El bacteri no té orgànuls membranosos i la glicosilació eucariota no s'hi fa. La fermentació no decideix això: decideix l'energia. La maduració de la proteïna decideix l'hoste industrial.

7.8 Mapa del tema

Cèl·lula procariota (bacteri o arqueu) o forma acel·lular (virus, viroide, prió). Dins els bacteris: paret i Gram, metabolisme i cicles, transferència horitzontal. El fong és l'eucariota del tema, i només al nivell d'un oportunista.

Resum

	Àcid nucleic	Càpsida	Cèl·lula
Bacteri / arqueu	DNA circular	no	sí, procariota
Virus	DNA o RNA	sí	no
Viroide	RNA	no	no
Prió	no	no	no

Errors típics a la PAU

- Dir flora en comptes de microbiota.
- Anomenar parasexualitat la conjugació, la transformació o la transducció.
- Confondre esterilització i pasteurització.
- Dir que els arqueus tenen peptidoglicà.
- Tractar el prió com un virus.
- Oblidar que la mida real és la de la imatge partida pels augments.

Glossari

Soca

Llinatge concret dins d’una espècie microbiana.

Gram positiu
: Bacteri amb paret gruixuda de peptidoglicà; queda lila.

Transformació
: Captació de DNA lliure.

Transducció
: Transferència de DNA mitjançant un virus.

Conjugació
: Transferència de DNA per contacte, sovint d’un plasmidi, a través d’un pilus.

Pròfag
: Genoma víric integrat en el DNA bacterià durant el cicle lisogènic.

Retrotranscripció
: Síntesi de DNA a partir d’RNA, pròpia dels retrovirus.

Prió
: Proteïna infecciosa, sense àcid nucleic.

Autoavaluació

1. En una micrografia de 2 000 augments, un coc mesura 4 mm. Calculeu la mida real en micròmetres i indiqueu la conversió. Digueu si aquesta mida és pròpia d’un bacteri o d’una cèl·lula eucariota típica.

   La mida real és 4 mm / 2 000 = 0,002 mm. Com que 1 mm = 1 000 µm, 0,002 mm = 2 µm. Es divideix pels augments, no es multiplica, perquè la fotografia és més gran que l’objecte. Dos micròmetres són la mida d’un bacteri. Una cèl·lula eucariota animal típica és de l’ordre de 10 a 30 µm, i un virus queda per sota del límit del microscopi òptic, al voltant de 0,2 µm.

2. Després de la tinció de Gram, un bacteri queda rosa. Expliqueu quina estructura de la paret ho provoca i per què no es pot concloure, només amb aquest color, que es tracta d’un arqueu.

   El color rosa és el dels Gram negatius. Tenen una capa fina de peptidoglicà i, per fora, una membrana externa amb lipopolisacàrid. L’alcohol decolorant arrossega el cristall violeta, que aquesta paret no reté, i la safranina de contrast els tenyeix de rosa. Un Gram positiu, amb peptidoglicà gruixut, retindria el violeta. Un arqueu no es classifica amb aquesta tinció: no té peptidoglicà, i el mètode està pensat per a la paret bacteriana. El color, tot sol, no assigna el domini.

3. En el cicle del nitrogen, quins bacteris fixen el N_2 atmosfèric i quin pas fa el que oxida el nitrit fins a nitrat? Distingiu la fixació de la nitrificació.

   La fixació redueix el N_2 a amoníac. La fan, entre d'altres, *Rhizobium*, en simbiosi amb les lleguminoses, i *Azotobacter*, de vida lliure. La planta no sap trencar el triple enllaç del N_2, de manera que sense aquests bacteris, o sense adob, el nitrogen de l'aire no entra a la xarxa tròfica. L'oxidació del nitrit a nitrat és un pas posterior, la segona etapa de la nitrificació, i la fa *Nitrobacter*. *Nitrosomonas* fa el pas anterior, d'amoni a nitrit. La nitrificació no treu nitrogen de l'atmosfera: transforma nitrogen que ja és en forma reduïda.

4. Un bacteri incorpora DNA lliure que hi ha al medi, sense que intervingui cap virus ni cap contacte amb una altra cèl·lula. Com s'anomena aquest mecanisme i per què no és ni conjugació ni transducció?

   És transformació. El DNA entra des del medi, on ha quedat lliure, per exemple després de la lisi d'una altra cèl·lula. No és conjugació, perquè la conjugació exigeix un contacte i un pont entre dues cèl·lules, sovint per transferir un plasmidi. No és transducció, perquè la transducció la fa un bacteriòfag que s'ha endut DNA del bacteri anterior. Els tres mecanismes són transferència horitzontal —el receptor no és fill del donant—, però el vehicle és diferent: medi, pont o virus.

5. Compareu un virus, un viroide i un prió pel que fa a l'àcid nucleic i a la càpsida. La resposta ha de permetre identificar-ne qualsevol dels tres a partir d'aquestes dues dades.

   El virus té àcid nucleic, DNA o RNA, tancat dins una càpsida de proteïna; alguns tenen, a més, un embolcall. El viroide és un RNA circular nu: té àcid nucleic però no té càpsida, i infecta plantes. El prió no té àcid nucleic: és una proteïna mal plegada que indueix el plegament incorrecte de la proteïna del mateix tipus. Si un agent es destrueix en trencar els àcids nucleics, no pot ser un prió. Si no té càpsida i és només RNA, és un viroide i no un virus. Cap dels tres no és una cèl·lula.

8. Immunologia

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU

Cal el concepte d'immunitat i els elements que citen les orientacions: tim i melsa; medul·la òssia i teixit limfoide; neutròfils, eosinòfils, basòfils, monòcits, macròfags, cèl·lules dendrítiques, limfòcits T, B i NK. Les barreres externes es separen en físiques, químiques i biològiques. La immunitat innata es distingeix de l'específica, i la humoral de la cel·lular.

De l'específica entren les cèl·lules presentadores, els T col·laboradors i citotòxics, els B, les cèl·lules plasmàtiques, la memòria, els anticossos i les molècules d'histocompatibilitat de classe I i II, i la comparació entre resposta primària i secundària. El complement té tres vies. Immunitat activa i passiva, natural i artificial, vacunes i immunitat de grup, seroteràpia i immunoteràpia, fases de la malaltia infecciosa, i les patologies: rebuig, transfusions, al·lèrgia, autoimmunitat, leucèmies, immunodeficiències i sida.

8.1 Immunitat i barreres

La immunitat és la capacitat de distingir el que és propi del que és estrany i de respondre-hi. Els òrgans que cal situar són el tim (on maduren els limfòcits T) i la melsa. Els teixits són la medul·la òssia, on es formen les cèl·lules de la sang, i el teixit limfoide (ganglis, amígdales, plaques de Peyer). Les cèl·lules de la llista oficial són neutròfils, eosinòfils, basòfils, monòcits, macròfags, dendrítiques, limfòcits T, limfòcits B i limfòcits NK.

Abans de tot això hi ha les barreres. Físiques o anatòmiques: pell i mucoses. Químiques o fisiològiques: el pH de l'estómac, el lisozim de la llàgrima i la saliva, el mucus. Biològiques: la microbiota, que ocupa lloc i consumeix nutrients. Una ferida o un antibiòtic innecessari obren un forat en aquesta primera línia.

La immunitat és la capacitat de distingir el propi del que no ho és i de respondre. La primera línia no és encara cel·lular especialitzada: la pell, les mucoses, el pH de l'estómac, el lisozim de les llàgrimes i la microbiota. Es diuen barreres. No tenen memòria. Si es foraden, entra en joc la resposta innata i, si cal, l'específica. Una ferida no «activa els anticossos» al primer minut: activa la inflamació.

Exemple resolt

El pH àcid de l'estómac mata molts bacteris ingerits. És immunitat específica?

No. És una barrera inespecífica: no distingeix soques, no deixa memòria i no hi intervenen limfòcits. Un patogen que la travessa encara ha d'enfrontar-se a la innata i a l'específica. Vacunar no reforça el pH de l'estómac.

Mini-PAU resolt

Una cremada extensa es complica amb infeccions de bacteris que a la pell sana no prosperen. Quina barrera ha caigut, i per què l'antibiòtic no la substitueix del tot?

La pell, barrera física i química. L'antibiòtic mata o frena bacteris sensibles, però no refà l'epiteli, no cobreix tots els microorganismes i selecciona resistents. La barrera evita l'entrada; el fàrmac n'apaga una part un cop ja han entrat.

Mini-PAU resolt

Ordeneu el que troba un bacteri que entra per una ferida: pell, fagòcits i complement, limfòcits específics. Quina d'aquestes línies té memòria?

Primer la pell, que ja ha fallat si ha entrat. Després la innata: fagòcits, inflamació, complement. Després l'específica, que tarda dies la primera vegada. Només l'específica deixa memòria. La inflamació del segon dia no és més ràpida perquè el bacteri sigui el mateix; els anticossos i els limfòcits de memòria, sí.

Exemple resolt

El lisozim de la saliva trenca peptidoglicà. És un anticòs?

No. És una enzima de barrera, inespecífica: no es fabrica contra un antigen concret i no canvia de forma segons el bacteri. Un anticòs és una immunoglobulina feta per un clon de B. Que tots dos danyin bacteris no els fa el mateix.

8.2 Immunitat innata i complement

La immunitat innata no és específica d'un antigen concret i no deixa memòria. Els neutròfils i els macròfags (que venen dels monòcits) fagociten. Les cèl·lules dendrítiques també fagociten i, a més, presenten l'antigen a la resposta específica. Els basòfils i els mastòcits alliberen histamina i participen en la inflamació. La histamina no és un anticòs. Els eosinòfils actuen sobretot contra paràsits i en algunes al·lèrgies. Els limfòcits NK maten cèl·lules infectades o tumorals que no presenten bé les molècules de classe I.

El complement és un conjunt de proteïnes del plasma. La via clàssica s'engega amb anticossos units a l'antigen. L'alternativa s'engega a la superfície de molts patògens, sense anticossos. La de les lectines s'engega quan una lectina del plasma reconeix manoses de la paret microbiana. Les tres convergeixen. Els efectes que cal saber són l'opsonització (marcar per fagocitar), la inflamació i el complex d'atac a la membrana, que forada alguns bacteris. No cal la llista numerada de les proteïnes.

Mini-PAU resolt

Un text diu: «La histamina és l'anticòs de la inflamació i la secreten els mastòcits i els eosinòfils». Trobeu les dues errades.

La histamina no és un anticòs: és una molècula petita. La secreten sobretot mastòcits i basòfils, no els eosinòfils. Els eosinòfils intervenen en paràsits i en algunes al·lèrgies, però no són la font principal d'histamina.

Innata i específica

	Innata	Específica
Especificitat	patrons generals	un antigen concret
Memòria	no	sí
Temps	minuts o hores	dies la primera vegada
Cèl·lules clau	neutròfils, macròfags, dendrítiques, NK, mastòcits	limfòcits T i B
Molècules	complement, histamina	anticossos, receptors T i B

La resposta innata és ràpida i no específica d'un antigen concret. La inflamació (enrogiment, calor, tumor i dolor) és vasodilatació i arribada de neutròfils i de proteïnes del plasma. Els macròfags fagociten i presenten antigen. Les cèl·lules NK maten cèl·lules que no mostren bé el MHC I, un senyal de virus o de tumor, sense l'especificitat d'un limfòcit T. El complement és un conjunt de proteïnes del plasma que s'activen en cascada, fan porus a bacteris i atrauen fagòcits. No és un orgànul.

Cap d'aquests mecanismes no millora la segona vegada que entra el mateix microorganisme. La memòria és de l'específica. La innata sí que és necessària per engegar-la: sense presentació d'antigen, els T no s'activen bé.

Mini-PAU resolt

Un pacient sense neutròfils funcionals fa infeccions bacterianes repetides des de la infància, i els seus limfòcits en cultiu responen bé a un antigen. Quina branca falla?

La innata, la fagocitosi. L'específica es conserva, perquè els limfòcits responen. Les infeccions repetides des del principi, sense el patró d'una sola malaltia que reapareix, encaixen amb una falla de la primera línia cel·lular, no amb una falta de memòria.

Exemple resolt

La histamina dels mastòcits dilata vasos i fa la reacció al·lèrgica. Forma part de l'específica?

El mastòcit i la histamina són mecanismes de la innata. A l'al·lèrgia, un anticòs IgE (que sí que és de l'específica, fet per un limfòcit B) els ha deixat sensibilitzats. L'encreuament és el que confon. La histamina no és un anticòs, i no té memòria per si sola.

Mini-PAU resolt

Els símptomes locals d'una inflamació són enrogiment, calor, inflor i dolor. Quin canvi vascular els explica, i per què no són encara una resposta específica?

La vasodilatació i la sortida de plasma i de neutròfils al teixit. Arriben més sang (enrogiment i calor) i més líquid (inflor), i els mediadors irriten les terminacions (dolor). No és específica perquè els mateixos signes apareixen davant de bacteris diferents, d'un cop o d'una cremada. No hi ha clon ni memòria en aquest pas.

Exemple resolt

El complement fa un porus en un bacteri. Per què no en fa un, en condicions normals, en una cèl·lula del propi cos?

Perquè les cèl·lules pròpies tenen proteïnes de membrana que aturen la cascada. El bacteri no les té. Si aquest control falla, hi ha dany propi. El complement no «decideix»: s'activa on hi ha superfície sense aquestes proteïnes, o on un anticòs l'ha marcat.

8.3 Immunitat específica

L'específica (adaptativa, adquirida) reconeix antígens concrets i deixa memòria. Un antigen és allò que el sistema reconeix com a estrany; l'epítop és la part exacta que encaixa amb el receptor. El que és propi no hauria d'activar la resposta: quan ho fa, hi ha autoimmunitat.

Les cèl·lules presentadores (macròfags, dendrítiques i també els limfòcits B) mostren trossos d'antigen units a molècules d'histocompatibilitat. Les de classe I són a totes les cèl·lules nucleades i presenten el que hi ha dins la cèl·lula: les llegeixen els limfòcits T citotòxics (CD8), que maten la cèl·lula infectada. Les de classe II són a les presentadores i les llegeixen els T col·laboradors (CD4), que activen B i macròfags. En humans aquestes molècules són les HLA; a la prova n'hi ha prou amb classe I i classe II.




Figura 8.3. Humoral: B i anticossos. Cel·lular: T col·laboradors i T citotòxics. Els col·laboradors no substitueixen els citotòxics.

Els limfòcits B, quan el T col·laborador i l'antigen els activen, es diferencien en cèl·lules plasmàtiques, que secreten anticossos, i en cèl·lules de memòria. Això és la selecció clonal: només es multiplica el clon que reconeix aquell antigen. La branca humoral són els anticossos. La cel·lular són els T.

Limfòcits B i T

	B	T col·laborador (CD4)	T citotòxic (CD8)
Reconeix	antigen sencer	pèptid + MHC II	pèptid + MHC I
Efecte	esdevé plasmàtica i fa anticossos	activa B i macròfags	mata la cèl·lula infectada
Branca	humoral	cel·lular (ajuda)	cel·lular

Els T col·laboradors no secreten anticossos. Si un text ho diu, és una errada. Qui secreta anticossos és la cèl·lula plasmàtica.

L'específica és clonal. Cada limfòcit porta un receptor diferent, fet per recombinació de segments gènics, abans de veure l'antigen. L'antigen no dissenya el receptor: selecciona el clon que ja encaixava i el fa proliferar. Això és la selecció clonal. Els que encaixen amb el propi s'eliminen o s'inactiven durant la maduració; si aquest control falla, hi ha autoimmunitat.

Els B reconeixen l'antigen sencer i, amb ajuda dels T col·laboradors, es diferencien a cèl·lules plasmàtiques, que secreten anticossos, i a cèl·lules de memòria. Els T no secreten anticossos. Els T col·laboradors (CD4) reconeixen un pèptid presentat en MHC II, propi de cèl·lules presentadores, i activen B i macròfags. Els T citotòxics (CD8) reconeixen un pèptid en MHC I, que tenen gairebé totes les cèl·lules, i maten la cèl·lula infectada. MHC II no és «el dels citotòxics».

Mini-PAU resolt

Un virus es replica dins el citoplasma d'una cèl·lula epitelial, que no és una presentadora professional. Quin limfòcit la pot matar, i quin MHC fa servir la cèl·lula per ensenyar els pèptids vírics?

Un T citotòxic CD8, que reconeix el pèptid en MHC I. Gairebé totes les cèl·lules amb nucli tenen MHC I precisament per poder avisar d'una infecció interna. El MHC II seria el d'una cèl·lula presentadora que ensenya antigen a un CD4. L'anticòs, fora de la cèl·lula, no arriba al virus que ja és a dins.

Exemple resolt

Per què la resposta específica tarda dies la primera vegada i no la segona?

Perquè la primera vegada el clon útil és rar i s'ha d'expandir: selecció clonal i diferenciació. Queden cèl·lules de memòria, molt més nombroses i més fàcils d'activar. La segona resposta puja abans, més alt i amb més IgG. No és que l'antigen «ja es conegui» en abstracte: hi ha més cèl·lules concretes que el reconeixen.

Mini-PAU resolt

Un pèptid víric es presenta en MHC I. Quin limfòcit l'ha de reconèixer, i què li passa a la cèl·lula que el presenta? I si el pèptid fos en MHC II, a la superfície d'un macròfag?

En MHC I el reconeix un T citotòxic CD8, que mata la cèl·lula infectada. En MHC II el reconeix un T col·laborador CD4, que no mata el macròfag: l'activa i ajuda els B. El mateix pèptid, en un MHC o en l'altre, no convoca la mateixa cèl·lula. L'error és assignar el CD8 al MHC II.

Exemple resolt

L'antigen selecciona el clon. Per què no es diu que l'antigen crea el receptor?

Perquè el receptor ja existia, fruit de la recombinació dels gens del limfòcit, abans de trobar l'antigen. L'antigen fa proliferar el clon que encaixa i deixa morir o inactius els que no. És selecció, en el mateix sentit que la selecció natural: no instrueix, filtra. Un receptor fet a mida després de veure l'antigen no és el model.

Mini-PAU resolt

Una cèl·lula infectada per un virus deixa de mostrar MHC I. Quina cèl·lula de la innata la pot matar precisament per això, i quina de l'específica la mataria si el MHC I sí que mostrés el pèptid?

Sense MHC I, la cèl·lula NK, que interpreta l'absència com un senyal de perill. Si el MHC I mostra el pèptid, el T citotòxic CD8 la reconeix i la mata. Són dues vies cap a un resultat semblant, amb receptors diferents. La NK no és específica d'antigen. El CD8 sí.

8.4 Anticossos i respostes

Un anticòs és una proteïna (immunoglobulina) amb dues cadenes pesants i dues de lleugeres, unides per ponts disulfur. La regió variable encaixa amb l'antigen. La regió constant defineix la classe i és la que veuen el complement i els fagòcits.




Figura 8.2. IgG: forma d'Y, dues pesants i dues lleugeres. El lloc d'unió a l'antigen és la regió variable.

IgM és un pentàmer, el primer de la resposta primària, i activa bé el complement. IgG és un monòmer, el més abundant a la sang en la resposta secundària, i travessa la placenta. IgA és a les secrecions (saliva, llet, mucus), sovint com a dímer. IgE es lliga als mastòcits i intervé en l'al·lèrgia i en els paràsits. IgD és sobretot un receptor a la superfície del limfòcit B.




Figura 8.1. La secundària puja abans, més amunt i sobretot amb IgG, perquè ja hi ha cèl·lules de memòria.

Idea clau

Primària: latent, més baixa, amb IgM al davant. Secundària: ràpida, alta, sobretot IgG. La vacuna busca aquesta memòria sense passar la malaltia.

Un anticòs és una proteïna amb forma d'Y, quatre cadenes: dues pesants i dues lleugeres, unides per disulfurs. La regió variable, als extrems dels braços, uneix l'antigen. La regió constant decideix la classe (IgM, IgG, IgA, IgE, IgD) i què se'n fa: activar complement, travessar la placenta, anar a les mucoses o enganxar-se a un mastòcit. Una IgG té dos llocs d'unió. No és una cèl·lula. La cèl·lula que el fabrica en quantitat és la plasmàtica, no el T.

La resposta primària tarda, comença amb IgM i després IgG, i és moderada. La secundària és més ràpida, més alta i dominada per IgG, gràcies a la memòria. Una gràfica amb dos pics: el segon més alt i més aviat és la secundària. L'antigen s'ha tornat a administrar; el sistema no ha «inventat» el pic.

Mini-PAU resolt

En una gràfica, el primer contacte amb l'antigen dona un pic baix als deu dies, sobretot IgM. Un segon contacte als trenta dies dona un pic alt als pocs dies, sobretot IgG. Què demostra el segon pic?

Memòria immunitària. Hi havia clons ja seleccionats, que responen amb canvi de classe cap a IgG. No és una resposta innata, que no faria IgG ni milloraria. Tampoc no és que la dosi fos necessàriament més alta: el sistema és el que ha canviat.

Exemple resolt

L'IgA és a les mucoses i a la llet, i l'IgG travessa la placenta. Quina de les dues protegeix el nadó abans de tenir respostes pròpies, i per què aquesta protecció no és memòria del nadó?

L'IgG materna, que ha passat la placenta, i després l'IgA de la llet al tub digestiu. El nadó no ha seleccionat aquells clons: ha rebut anticossos fets. És immunitat passiva natural. Quan aquests anticossos es degraden, la protecció s'acaba, llevat que el nadó hagi respost ell mateix.

Mini-PAU resolt

Una IgG i una IgM poden reconèixer el mateix antigen. Què tenen en comú i què no, i quina apareix primer en una resposta primària?

En comú, si reconeixen el mateix, la regió variable que encaixa amb l'antigen. No tenen en comú la regió constant: la classe és diferent, i per això una activa unes vies i l'altra unes altres, i la IgM és un pentàmer. A la resposta primària apareix primer la IgM. La IgG domina després i a la secundària.

Exemple resolt

Per què un test d'IgM positiva i IgG negativa es llegeix com a infecció recent, i el revés com a infecció passada o vacunació antiga?

Perquè la IgM és la primera classe. Si encara no hi ha IgG, el canvi de classe no s'ha fet: el contacte és recent. Si hi ha IgG i no IgM, la resposta ja ha madurat o queda la memòria, i la IgM, de vida curta, ha desaparegut. El test no mesura el virus directament; mesura quina classe ha fet el pacient.

8.5 Immunitat artificial: vacunes i sèrums

Activa vol dir que el propi sistema fabrica la resposta. Passiva vol dir que es reben anticossos fets per un altre. Natural o artificial diu si ha passat sense intervenció mèdica.

	Natural	Artificial
Activa	passar la infecció	vacuna
Passiva	IgG de la placenta, IgA de la llet	seroteràpia (sèrum amb anticossos)

La vacuna és un antigen inofensiu o atenuat: microorganisme mort o afeblit, un tros (subunitat, toxoide) o, en vacunes recents, l'RNA que fa fabricar la proteïna. No causa la malaltia i sí la memòria. Si prou gent està immunitzada, el patogen circula menys: immunitat de grup. No vol dir que qui no es vacuna quedi protegit del tot.

La seroteràpia injecta anticossos ja fets. Actua de seguida i no deixa memòria. La immunoteràpia és més àmplia: inclou anticossos monoclonals (tots iguals, contra un sol epítop) i altres moduladors. Un monoclonal contra una proteïna del complement, per exemple, bloqueja aquella peça; el preu pot ser una defensa més feble davant d'infeccions.

Mini-PAU resolt

Injecten un sèrum amb anticossos contra un bacteri. Activeu o passiva? Natural o artificial? Hi haurà memòria?

Passiva i artificial. No hi ha memòria: els anticossos s'esgoten i el propi sistema no ha estat instruït.

La taula de les quatre combinacions es pregunta gairebé cada any, amb un cas. La vacuna és activa i artificial. El sèrum és passiu i artificial. La infecció és activa i natural. Els anticossos de la mare són passius i naturals. Només l'activa deixa memòria, perquè només llavors el propi sistema ha seleccionat clons.

	Natural	Artificial
Activa (hi ha memòria)	passar la infecció	vacuna
Passiva (no hi ha memòria pròpia)	IgG de la mare, IgA de la llet	sèrum o anticossos injectats

La vacuna ensenya un antigen (mort, atenuat, una proteïna o un àcid nucleic que la fa fabricar) sense la malaltia plena. El sistema respon i queda memòria: és activa. El sèrum dona anticossos ja fets, d'un altre individu o d'un animal. Protegeix de seguida i no educa el sistema: és passiva. Serveix quan no hi ha temps d'esperar la resposta, com en una toxina o un verí. No substitueix la vacuna a llarg termini.

Mini-PAU resolt

Una persona no vacunada rep sèrum antitetànic després d'una ferida, i més endavant se li posa la vacuna. Quina de les dues accions deixa memòria, i quina actua el primer dia?

El sèrum actua el primer dia: porta Ig ja feta, és passiva i artificial, i no deixa memòria. La vacuna tarda dies a fer efecte i deixa memòria: és activa i artificial. Les dues es poden posar en moments diferents precisament perquè no fan la mateixa feina. Dir que el sèrum vacuna és l'error clàssic.

Exemple resolt

Per què una vacuna atenuada i una d'inactivada no tenen el mateix risc, si totes dues són actives?

L'atenuada es replica una mica i dona una resposta forta, semblant a la infecció, però pot revertir o fer mal en un immunodeprimit. La inactivada no es replica: el risc d'infecció és nul i la resposta sol demanar dosis de record. Totes dues deixen memòria si funcionen. El risc no és el mateix.

Mini-PAU resolt

Classifiqueu: xarampió passat de petit, vacuna de la grip, sèrum antiofídic, IgG que un fetus rep de la mare. Qui deixa memòria en el receptor?

El xarampió és activa natural. La vacuna, activa artificial. El sèrum, passiva artificial. L'IgG fetal, passiva natural. Deixen memòria en el receptor només les dues actives, perquè només llavors el seu propi sistema ha seleccionat clons. El sèrum i l'IgG materna protegeixen i s'esgoten.

Exemple resolt

Per què una vacuna no és útil la tarda d'una exposició a una toxina ja inoculada, i un sèrum sí?

Perquè la vacuna tarda dies a fer anticossos propis. La toxina actua en hores. El sèrum porta els anticossos fets i neutralitza de seguida. Després, si es vol memòria, es vacuna. Són complementaris en el temps, no substituts.

Mini-PAU resolt

Un nadó té IgG de la mare, que anirà baixant, i als dos mesos se'l vacuna. Dibuixeu amb paraules les dues corbes: la de l'IgG materna i la de la resposta del nadó. Quina és passiva i quina deixa memòria?

L'IgG materna baixa en setmanes, sense un segon pic: és passiva natural, i el nadó no ha fet clons. La vacuna, al cap d'uns dies, fa un pic propi, més lent la primera vegada, i deixa memòria: és activa artificial. Si més endavant hi ha un record, el pic del nen serà més ràpid. Les dues corbes no s'han de sumar com si fossin la mateixa resposta.

8.6 Alteracions i VIH

El rebuig d'un trasplantament és una resposta dels T contra molècules d'histocompatibilitat de classe I (i II) del donant, que el receptor llegeix com a estranyes. Per això es busca un donant compatible i es fa servir immunosupressió. Una transfusió incompatible és un altre rebuig: els anticossos contra A, B o el factor Rh hemolitzen els eritròcits. Els eritròcits no tenen nucli ni classe I clàssica; el problema aquí són els antígens de grup.

La hipersensibilitat és una resposta exagerada. L'al·lèrgia immediata va per IgE, mastòcits i histamina. Pot arribar a l'anafilaxi. L'autoimmunitat és una resposta contra el propi: diabetis de tipus 1, algunes artritis, lupus. N'hi ha prou amb el mecanisme i un exemple, no amb la llista clínica.

Les immunodeficiències poden ser congènites o adquirides. El VIH és un retrovirus que infecta sobretot limfòcits T CD4, i també macròfags i dendrítiques. La sida és la síndrome que apareix quan aquests T cauen i les infeccions oportunistes i alguns tumors ocupen el lloc. Tenir el VIH no és, el mateix dia, tenir sida. Les leucèmies són càncers dels leucòcits. La vigilància del càncer la fan NK, T citotòxics i, en part, anticossos: per això una immunodepressió augmenta alguns tumors.

L'autoimmunitat és una resposta específica contra el propi. No és una al·lèrgia: l'al·lèrgia és una resposta exagerada contra un antigen extern, sovint via IgE i histamina. La immunodeficiència és una falta de resposta, primària si és congènita i secundària si és adquirida. El VIH causa una immunodeficiència secundària perquè infecta limfòcits T CD4, que són els que organitzen la resposta. Sense CD4 cauen l'ajuda als B i als citotòxics, i apareixen infeccions oportunistes i alguns tumors. Això és la sida. VIH és el virus; sida, la síndrome. Una persona pot portar el virus abans de tenir la síndrome.

El rebuig d'un empelt és una resposta específica contra MHC aliè. Per això es busca un donant compatible i es frena la resposta amb immunosupressors. Un immunosupressor no és un antibiòtic: abaixa les defenses i, de passada, puja el risc d'infecció.

Mini-PAU resolt

El VIH entra als CD4. Per què cauen també les respostes d'anticossos, si qui fabrica els anticossos són els B?

Perquè la majoria de respostes de B depenen de l'ajuda dels T CD4. Sense col·laboradors, els B no es diferencien bé a plasmàtiques ni fan el canvi a IgG ni deixen memòria com cal. Els citotòxics també queden sense ajuda. La diana és el CD4; el dany és tot el sistema que ell coordina.

Exemple resolt

Una reacció al pol·len, amb histamina i IgE, i una diabetis en què es destrueixen les cèl·lules beta, són el mateix tipus d'error immunitari?

No. El pol·len és al·lèrgia: antigen extern, IgE, mastòcits. La destrucció de les beta és autoimmunitat: antigen propi, limfòcits contra una cèl·lula del cos. Totes dues són respostes específiques fora de lloc, i aquí s'acaba la semblança. El tractament i el mecanisme no es copien de l'una a l'altra.

Mini-PAU resolt

El VIH infecta CD4. Un pacient té pocs CD4, infeccions per fongs que en una persona sana no prosperen, i poca resposta d'anticossos. Com es diu la síndrome, i per què fallen els B si el virus no els és la diana principal?

Sida, la immunodeficiència causada pel VIH. Els B fallen perquè els falta l'ajuda dels CD4 per activar-se, canviar de classe i fer memòria. Els fongs són oportunistes: la innata i l'específica que els controlaven ja no hi són. El virus i la síndrome no es diuen igual.

Exemple resolt

Un immunosupressor evita el rebuig d'un ronyó. Quin preu immunitari té, i per què no és un antibiòtic?

Abaixa la resposta específica, que és la que atacaria l'empelt, i de passada abaixa la resposta contra infeccions. El pacient s'ha de vigilar. No és un antibiòtic: no mata bacteris, frena limfòcits. Fer-los servir com si fossin el mateix deixa la infecció sense tractar i l'empelt sense protecció.

8.7 Fases de la malaltia infecciosa

Les orientacions demanen tres fases. La incubació: el patogen ja hi és i encara no hi ha símptomes; sovint ja es pot transmetre. La manifestació clínica: símptomes i, en moltes infeccions, el pic de la resposta. La convalescència: els símptomes cedeixen i, si la resposta ha deixat memòria, queda immunitat. No totes les infeccions immunitzen de per vida.




Figura 8.4. De la barrera a la memòria. La vacuna és activa i artificial; el sèrum, passiu i artificial.

Una malaltia infecciosa es descriu en fases que no s'han de saltar a l'examen. Incubació: el patogen es multiplica i encara no hi ha símptomes. Prodrom: símptomes generals, inespecífics. Estat: el quadre propi de la malaltia, amb el pic de replicació o de toxina. Convalescència: el sistema, o el tractament, ha tombat el patogen i els teixits es recuperen. La contagiositat no coincideix sempre amb els símptomes: es pot transmetre a la incubació. La immunitat que queda, si queda, és de la fase final, no del primer dia.

Exemple resolt

Una persona transmet un virus tres dies abans de tenir febre. En quina fase és contagiosa, i per què aïllar només els simptomàtics no talla del tot la cadena?

A la incubació. El virus ja es replica i surt, i la persona no sap que està malalta. Les mesures que depenen del símptoma arriben tard per a aquests dies. No vol dir que a la fase d'estat no sigui contagiosa; vol dir que no és l'única finestra.

Mini-PAU resolt

Després d'una infecció, la persona no torna a fer la malaltia en exposar-s'hi. Quina fase del curs clínic no explica aquesta protecció, i quin tipus d'immunitat sí?

La convalescència explica la recuperació dels teixits, no la protecció anys després. La protecció és memòria, immunitat activa natural, feta durant la resposta específica. Si hagués rebut només sèrum, la protecció s'acabaria en setmanes i una segona exposició seria com la primera.

Mini-PAU resolt

Una malaltia té incubació de cinc dies, prodrom d'un dia i estat d'una setmana. La persona encomana des del dia 3. En quina fase comença a encomanar, i la convalescència és contagiosa per definició?

Comença a la incubació, abans dels símptomes. La convalescència no és contagiosa per definició: depèn del patogen. En uns ja no es transmet; en d'altres, sí, una temporada. El que és de definició és que els símptomes remeten. Contagi i símptoma no comparteixen calendari.

Exemple resolt

Després de la convalescència la persona queda immune. Això és propi de la fase, o de la branca específica que s'ha activat durant l'estat?

De la branca específica. La convalescència és la recuperació del teixit. La immunitat és la memòria dels clons, que s'han seleccionat abans, durant la resposta. Es pot convalèixer d'una infecció sense quedar immune, si la resposta no ha deixat memòria útil, i es pot quedar immune amb seqüeles. Són eixos diferents.

8.8 Mapa del tema

Barrera, innata (fagòcits, inflamació, complement, NK) i específica (T i B, anticossos, memòria). Artificial: vacuna o sèrum. Quan el sistema s'equivoca: al·lèrgia, autoimmunitat, rebuig. Quan falta: immunodeficiència i sida.

Resum

Peça	Funció que la PAU espera
Neutròfil, macròfag	fagocitosi
Mastòcit, basòfil	histamina, inflamació
NK	maten cèl·lules sense classe I correcta
T CD4	ajuden; llegeixen classe II
T CD8	maten la cèl·lula infectada; llegeixen classe I
Plasmàtica	secreta anticossos
IgG / IgM	secundària i placenta / primària, pentàmer

Errors típics a la PAU

- Dir que la histamina és un anticòs.
- Confondre classe I i classe II, o CD4 i CD8.
- Dir que la seroteràpia deixa memòria.
- Igualar VIH i sida.
- Dibuixar la resposta secundària més lenta que la primària.

- Oblidar que la via alternativa del complement no necessita anticossos.

Glossari

Antigen
: Molècula que el sistema específic reconeix com a estranya.

Epítop
: Fragment concret de l’antigen que encaixa amb el receptor o l’anticòs.

Opsonització
: Marcar un patogen amb anticossos o complement perquè sigui fagocitat.

Selecció clonal
: Proliferació només del limfòcit que reconeix l’antigen.

Seroteràpia
: Injecció d’anticossos ja fets. Immunitat passiva artificial.

Immunitat de grup
: Protecció indirecta quan una fracció alta de la població està immunitzada.

Histamina
: Molècula de la inflamació i l’al·lèrgia. No és un anticòs.

Sida
: Síndrome d’immunodeficiència causada pel VIH quan cauen els T CD4.

Autoavaluació

1. Quins limfòcits reconeixen un pèptid presentat amb MHC de classe I, i quins el reconeixen amb MHC de classe II? Digueu què fa cadascun amb la cèl·lula que li presenta l’antigen.

   El MHC de classe I, present a gairebé totes les cèl·lules amb nucli, el llegeixen els limfòcits T citotòxics, CD8. Si el pèptid és víric, el citotòxic mata la cèl·lula infectada. El MHC de classe II el tenen les cèl·lules presentadores d’antigen, i el llegeixen els limfòcits T col·laboradors, CD4. El col·laborador no mata la presentadora: l’activa i ajuda els limfòcits B i els macròfags. Assignar el CD8 al MHC II, o fer que el col·laborador secreti anticossos, inverteix les dues branques. Qui secreta anticossos és la cèl·lula plasmàtica, derivada del limfòcit B.

2. En una gràfica de la concentració d’anticossos, el segon contacte amb el mateix antigen dona un pic més alt, més aviat i dominat per IgG. Per què aquesta resposta secundària és més ràpida i més intensa que la primària?

   Perquè el primer contacte ha seleccionat el clon de limfòcits que reconeixia l’antigen i n’ha deixat cèl·lules de memòria, molt més nombroses i més fàcils d’activar que els limfòcits naïfs inicials. En el segon contacte, aquest clon s’expandeix de seguida. A més, els limfòcits B de memòria ja han fet el canvi de classe, de manera que la resposta és sobretot IgG, mentre que la primària comença amb IgM i tarda dies. No és que la immunitat innata «recordi» l’antigen: la memòria és de la resposta específica. Una corba que no millorés la segona vegada no seria una resposta amb memòria.

3. Els anticossos IgG que un fetus rep a través de la placenta, són una immunitat activa o passiva? Natural o artificial? Justifiqueu per què el fetus no queda amb memòria pròpia d’aquell antigen.

   És immunitat passiva i natural. Passiva, perquè els anticossos els ha fabricat la mare, no el sistema del fetus: no hi ha hagut selecció clonal en el receptor. Natural, perquè la via és la placentària, no una injecció. Quan aquestes IgG es degraden, al cap d’unes setmanes o mesos, la protecció s’acaba. El fetus no ha generat cèl·lules de memòria contra aquell antigen, de manera que un contacte posterior serà, per a ell, un primer contacte, llevat que mentrestant l’hagi trobat i hi hagi respost ell mateix. L’IgA de la llet és un altre cas de passiva natural, limitat al tub digestiu.

4. Un fàrmac és un anticòs monoclonal contra la proteïna C5 del complement. Quina conseqüència pot tenir sobre la defensa enfront de certs bacteris? Relacioneu-ho amb la funció del complement, no amb la dels limfòcits.

   El complement és un conjunt de proteïnes del plasma que, un cop activades, opsonitzen bacteris i formen el complex d’atac a la membrana, un porus que els lisa. C5 és un component d’aquesta cascada. Si un anticòs la bloqueja, la cascada queda interrompuda a partir d’aquest punt: empitjoren l’opsonització i la lisi, i la defensa innata contra alguns bacteris encapsulats es debilita. No és un efecte directe sobre els limfòcits B o T. El complement no té memòria; bloquejar-lo no esborra la memòria específica, però sí que treu una eina que els anticossos fan servir quan activen la via clàssica.

5. El VIH infecta limfòcits T CD4. Expliqueu per què, amb el temps, això facilita infeccions oportunistes, tot i que els bacteris i els fongs no són la diana del virus. Distingiu el virus de la síndrome.

   El VIH és el virus; la sida és la síndrome d'immunodeficiència que apareix quan la xifra de T CD4 cau. Aquests col·laboradors són necessaris per activar els limfòcits B, perquè facin el canvi de classe i deixin memòria, i per activar els macròfags. Sense ells, la resposta específica s'enfonsa encara que els B i els citotòxics no siguin la diana principal. Microorganismes que una persona sana controla —fongs, alguns bacteris— esdevenen infecció, perquè els falta la coordinació de la resposta. Són oportunistes: no cal que el virus els hagi fet més virulents.

9. Disseny experimental

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU

El disseny experimental és un bloc propi de la prova, no un apèndix. En qualsevol exercici contextualitzat us poden demanar la hipòtesi, quina és la variable independent i quina la dependent, quines variables s'han de controlar, què és el control, per què calen rèpliques i quina conclusió es pot treure de les dades. També cal llegir gràfics i taules, i detectar errades en un text o un esquema del nivell del curs.

No es demana un disseny de laboratori universitari. Es demana un disseny lògic i factible, amb el material que tindria un laboratori de batxillerat o, simplement, amb el raonament. No cal haver fet l'experiment de l'enunciat.

9.1 El mètode en una pregunta de PAU

Una hipòtesi és una resposta provisional, formulada de manera que les dades la puguin contradir. «La temperatura afecta l'enzim» és massa vaga. «Per damunt de 60 °C la velocitat d'aquest enzim cau perquè es desnaturalitza» es pot posar a prova.

La conclusió ha de sortir de les dades de l'enunciat, no del que recordaríeu en abstracte. Si el gràfic no ensenya diferència entre dos grups, no es pot concloure que n'hi ha. Si la mostra és de tres pous, no es pot parlar d'una llei general: es pot dir que, en aquestes condicions, s'observa allò. Una millora estadística típica és augmentar el nombre de rèpliques o de subjectes, no «fer-ho més precís» sense dir com.

Mini-PAU resolt

Uns investigadors comparen l'RNA de tres espècies i un sol individu de cadascuna. Proposeu una millora perquè el resultat sigui més sòlid.

Analitzar diversos individus de cada espècie (rèpliques biològiques). Amb un sol exemplar no es pot separar la diferència entre espècies de la particularitat d'aquell individu.

Una pregunta de disseny a la PAU no demana un treball de laboratori real. Demana que el text tingui una hipòtesi que es pugui falsar, una variable independent (la que es canvia), una de dependent (la que es mesura), les altres controlades, un control i prou rèpliques. La hipòtesi no és el tema: «vull estudiar els enzims» no és una hipòtesi. «A pH 2 aquest enzim anirà més ràpid que a pH 7» sí que ho és, perquè pot ser falsa.

Mini-PAU resolt

Un alumne diu: «les plantes creixen millor amb música». Reformuleu-ho com una hipòtesi operativa i digueu quina és la variable dependent.

Hipòtesi: les plantes d'aquesta espècie, a igualtat de llum, aigua i sòl, fan més biomassa en trenta dies si sona música que si no. La variable dependent és la biomassa (o l'alçada, si és el que es mesura), no «créixer millor», que no és una mesura. La independent és la presència de música. Sense igualar la resta, no es pot atribuir la diferència a la música.

Exemple resolt

Per què «demostrar que la hipòtesi és certa» no és un objectiu ben escrit?

Perquè un experiment la pot rebutjar o no rebutjar. Si es dissenya per confirmar-la, es tendeix a ignorar el control que la faria caure. L'objectiu és posar-la a prova. Una hipòtesi que sobreviu a un bon control guanya suport; no queda demostrada per sempre.

Mini-PAU resolt

Reformuleu «els adobs són bons» en una hipòtesi que es pugui rebutjar, amb una variable independent i una de dependent.

Les plantes de blat d'aquesta varietat, amb la mateixa aigua i la mateixa llum, tenen més massa seca als trenta dies si el sòl rep 2 g d'aquest adob que si no en rep. Independent: la dosi d'adob. Dependent: la massa seca. «Bons» no és mesurable. Si la massa no puja, la hipòtesi cau. Això és el que la fa vàlida.

Exemple resolt

Un experiment es dissenya per «demostrar» la hipòtesi. Quin biaix hi entra, i com s'escriu millor l'objectiu?

El biaix de quedar-se amb les dades que encaixen i de no posar el control que la faria caure. L'objectiu s'escriu com a posar a prova, no com a confirmar. Una hipòtesi que sobreviu és més forta; no queda demostrada per un sol disseny.

9.2 Variables, control i rèpliques

La variable independent és la que l'experimentador canvia. La dependent és la que es mesura. Les controlades es mantenen iguals perquè, si no, no se sabria quina ha causat el canvi. El control és el grup o el tub que rep el mateix tractament excepte la variable que es vol provar.




Figura 9.1. Cinc peces. Si en falta el control o les rèpliques, el disseny no aguanta una pregunta de la PAU.

Exemple resolt

Es vol saber si un inhibidor redueix l'activitat d'un enzim. Es preparen tubs amb enzim, substrat i inhibidor, a 37 °C, i es mesura el producte als 5 minuts. Quina és la variable independent, quina la dependent i què hi falta?

Independent: la presència (o la concentració) d'inhibidor. Dependent: la quantitat de producte. Hi falta un control sense inhibidor, amb la resta igual, i convé repetir cada condició (rèpliques). Si només es canvia també la temperatura, ja no se sap què ha actuat.

Una rèplica és repetir la mesura en les mateixes condicions. Una sola observació pot ser un error de pipeta. Tres pous iguals no són tres experiments diferents si surten del mateix tub: són rèpliques tècniques. Millor, si es pot, repetir el muntatge sencer.

Mini-PAU resolt

Un grup mesura la velocitat d'un enzim a pH 7 i a pH 4, però al pH 4 també ha canviat la temperatura. Es pot concloure que el pH és la causa?

No. S'han canviat dues variables. Cal repetir-ho amb la temperatura fixa i un control a pH 7, amb rèpliques.

El control rep el mateix tractament menys la variable que es vol provar. En un experiment d'un fàrmac, el control és el dissolvent sense fàrmac, no «no fer res» si el dissolvent també podria tenir efecte. Les rèpliques són individus o cultius independents, no tres mesures del mateix tub. Mesurar tres vegades el mateix tub estima l'error de la pipeta; no estima la variació biològica. La mida de la mostra és el nombre d'unitats independents.

Peça	Exemple bo, enzim i pH	Exemple que invalida
Independent	el pH del tub	canviar alhora pH i temperatura
Dependent	µmol de producte per minut	«si va bé»
Control	el pH òptim conegut, o sense enzim	no tenir cap tub de referència
Rèpliques	cinc tubs per pH, preparats a part	llegir cinc vegades el mateix tub

Mini-PAU resolt

Es vol saber si un adob augmenta la massa de blat. Es planten 30 testos amb adob al sol i 30 sense adob a l'ombra. On és l'error, encara que hi hagi moltes rèpliques?

S'han canviat dues variables: l'adob i la llum. Una diferència no es pot atribuir. Cal el mateix lloc, la mateixa aigua i la mateixa varietat, i només ha de canviar l'adob. Les 30 rèpliques estan ben pensades com a nombre; estan mal aparellades. El control ha de ser idèntic menys en la variable independent.

Exemple resolt

Un control negatiu no dona senyal i el positiu sí. Per què tots dos fan falta en una PCR de diagnòstic?

El negatiu (sense DNA motlle) diu si els reactius estan contaminats: si amplifica, els positius de les mostres no es poden creure. El positiu (un DNA que se sap que funciona) diu si la reacció és capaç d'amplificar: si no ho fa, un negatiu de la mostra pot ser un error tècnic i no una absència real. Amb un de sol no es distingeix contaminació de fallada.

Mini-PAU resolt

Es proven tres concentracions d'un enzim i un tub sense enzim, cinc tubs de cada, preparats per separat. Identifiqueu el control, la variable independent, la dependent que falta decidir i per què cinc lectures del mateix tub no substitueixen els cinc tubs.

El control és el tub sense enzim: si hi apareix producte, el mètode està contaminat. La independent és la concentració. La dependent ha de ser una mesura, per exemple µmol de producte per minut; sense dir-la, el disseny no està tancat. Cinc lectures del mateix tub repeteixen l'error de mesura. Cinc tubs estimen la variació real de la preparació.

Exemple resolt

El control d'un fàrmac dissolt en etanol és aigua, no etanol. Per què el control està mal triat?

Perquè l'etanol sol pot tenir efecte. Si el grup del fàrmac difereix del grup aigua, no se sap si la causa és el fàrmac o el dissolvent. El control correcte és el dissolvent sol, a la mateixa concentració. Tot el que no és la variable independent s'ha d'igualar, inclòs el vehicle.

9.3 Gràfics, taules i errades

En un gràfic, l'eix horitzontal sol ser la variable independent i el vertical la dependent. Les unitats hi han de ser. Una taula es llegeix per columnes: no es compara un número d'una fila amb el d'una altra columna sense mirar el títol. Si us demanen dues conclusions, han de ser dues idees diferents, totes dues visibles a les dades.

Detectar errades és un tipus de pregunta habitual. El mètode és marcar la paraula que no encaixa amb el tema i dir la correcció, no reescriure tot el paràgraf. Exemples que ja han sortit al dossier i que tornen: confondre histamina i anticòs, posar la glucòlisi al mitocondri, dir que la fermentació dona 38 ATP, tractar un prió com un virus, o dibuixar l'anafase de la mitosi com si se separessin cromosomes homòlegs.

Idea clau

Cada errada es respon amb la peça correcta del curs, en una frase. Si l'enunciat en demana dues, no n'hi poseu tres ni una de sola.

Exemple resolt

«Els anticossos els fabriquen els limfòcits T citotòxics i són lípids.» Dues errades.

Els fabriquen les cèl·lules plasmàtiques, que venen dels limfòcits B. Són proteïnes, no lípids.

Quan el gràfic té dos eixos, escriviu la conclusió amb les unitats que s'hi veuen. Si la corba puja i després cau, no digueu que «sempre puja». Si compareu dues espècies amb un sol individu, la conclusió màxima és que aquells dos exemplars difereixen, no que les espècies senceres ho facin. La millora és afegir rèpliques biològiques.

Exemple resolt

Un text diu que la glucòlisi ocorre a la matriu mitocondrial i rendeix 38 ATP. Quines errades hi ha?

La glucòlisi és al citosol i el balanç net són 2 ATP i 2 NADH. Els 30–32 ATP (o 36–38 en el conveni escolar) són el total de la respiració aeròbica completa, no el de la glucòlisi.

En un gràfic es llegeix què hi ha a cada eix, unitats incloses, abans de dir si «puja». Una recta que puja és una relació positiva en el tram representat, no una llei per a sempre. Una campana (velocitat d'un enzim contra temperatura, o contra pH) té un òptim: a l'esquerra limita la cinètica i a la dreta la desnaturalització o la càrrega del centre actiu. No es descriu com «a més temperatura, més velocitat».

La mitjana sense dispersió no diu si dues condicions es separen. Si les barres d'error es solapen del tot, la diferència que es veu a les mitjanes pot ser soroll. A batxillerat no es demana un test estadístic; es demana no concloure amb un sol individu ni ignorar els eixos.

Mini-PAU resolt

Un gràfic de velocitat enzimàtica contra concentració de substrat arriba a un altiplà. Un segon gràfic, amb un fàrmac, arriba al mateix altiplà més a la dreta. Quina conclusió és correcta, i quina seria exagerada?

Correcta: el fàrmac és compatible amb una inhibició competitiva, perquè la V_{max} es manté i cal més substrat per acostar-s'hi. Exagerada: «el fàrmac desnaturalitza l'enzim» o «l'enzim ja no funciona». Si desnaturalitzés, l'altiplà baixaria. També seria exagerat donar el valor numèric de la K_m si l'eix no té escala llegible.

Exemple resolt

Una taula dona el nombre de bacteris a 20 °C i a 40 °C, una sola placa a cada temperatura. Es pot concloure que l'òptim és 40 °C?

No. Dos punts no fan un òptim: a 50 °C podria anar pitjor, i una sola placa no separa l'efecte de la temperatura d'un error de sembra. Cal un rang de temperatures i rèpliques. Com a màxim es pot dir que, en aquest parell de plaques, a 40 °C se n'han comptat més.

Mini-PAU resolt

Un gràfic de producte contra temps és lineal els primers deu minuts i després s'aplana. Un company diu que l'enzim s'ha desnaturalitzat. Quina lectura alternativa és la primera que cal considerar?

Que el substrat s'ha acabat o que el producte inhibeix. La desnaturalització no és la hipòtesi per defecte d'un altiplà en el temps: ho seria si la temperatura hagués pujat o el pH hagués canviat. Cal mirar si, en afegir més substrat, la recta es recupera. Si es recupera, l'enzim era actiu i li faltava substrat.

Exemple resolt

Dues mitjanes difereixen i les barres d'error es solapen gairebé del tot. Quina conclusió és excessiva?

Dir que les condicions són diferents. Amb aquest solapament, la diferència de mitjanes pot ser soroll. A batxillerat no es demana el test, es demana no concloure. La millora és més rèpliques, no una frase més forta. Si les barres no es toquen, la diferència es pot defensar amb més tranquil·litat, i encara així com a resultat d'aquella mostra.

Mini-PAU resolt

Un gràfic mostra la velocitat d'un enzim a cinc pH: 2, 4, 6, 8 i 10. Els valors són 10, 40, 90, 30 i 5. On és l'òptim, i per què no es diu que «com més alt és el pH, més lenta és la reacció»?

L'òptim, d'aquests punts, és pH 6. La frase és falsa perquè de 2 a 6 la velocitat puja. Només baixa a partir de l'òptim. Una frase vàlida és: hi ha un òptim a pH 6 i la velocitat cau a banda i banda. Extrapol·lar a pH 12 no es pot fer amb aquestes dades.

Resum

Peça	Pregunta que us faran
Hipòtesi	què esperen trobar, i es pot contradir?
Independent	què han canviat ells?
Dependent	què han mesurat?
Control	què és igual, tret d'aquesta variable?
Rèpliques	per què un sol resultat no basta?

Peça	Pregunta que us faran
Conclusió	què es veu a les dades, i què no es pot dir?

Errors típics a la PAU

- Intercanviar la variable independent i la dependent.
- Proposar un control que canvia dues coses alhora.
- Concloure més del que el gràfic ensenya.
- Respondre «cal més precisió» sense dir quina rèplica o quin control falta.
- En una pregunta d’errades, corregir-ne una de diferent de la que hi ha al text.

Glossari

Hipòtesi
: Resposta provisional que les dades poden contradir.

Variable independent
: La que es canvia a propòsit.

Variable dependent
: La que es mesura.

Control
: Grup o tub igual en tot, excepte en la variable que es vol provar.

Rèplica
: Repetició de la mateixa condició, per no fiar-se d’una sola mesura.

Conclusió
: El que les dades permeten afirmar, i no més.

Autoavaluació

1. Es vol estudiar l’efecte del pH sobre l’activitat d’un enzim. Quina és la variable dependent i quina la independent? Definiu-les amb el que es canvia i el que es mesura, no amb el nom del tema.

   La variable independent és el pH, perquè és el que l’experimentador fixa a valors diferents. La variable dependent és l’activitat de l’enzim, mesurada per exemple com a velocitat inicial o com a quantitat de producte format per unitat de temps. «Si funciona bé» no és una variable dependent, perquè no és una mesura. La resta de condicions —temperatura, concentració d’enzim, concentració de substrat, temps— s’han de mantenir constants. Si es canviés alhora el pH i la temperatura, una diferència d’activitat no es podria atribuir al pH.

2. Un alumne prepara un sol tub amb enzim, substrat i un possible inhibidor, i observa que es forma poc producte. Per què aquest resultat no demostra que l’inhibidor redueixi l’activitat?

   Perquè no hi ha amb què comparar. Falta un control amb el mateix enzim, el mateix substrat i el mateix dissolvent, però sense l’inhibidor. Sense aquest control, el poc producte podria ser el ritme normal de l’enzim en aquelles condicions. A més, un sol tub no és una rèplica: la mesura pot ser un error de pipeteig. Calen diversos tubs preparats per separat en cada condició. Llegir cinc vegades el mateix tub només repeteix l’error de lectura; no estima la variació de la preparació.

3. Un gràfic compara tres espècies amb un sol individu de cadascuna. Quina millora del disseny proposeu, i quina conclusió és excessiva amb les dades actuals?

   Cal mesurar diversos individus de cada espècie, en les mateixes condicions, per separar la diferència entre espècies de la particularitat d’un exemplar. Amb un sol individu, el màxim que es pot dir és que aquells tres exemplars difereixen en la variable mesurada. Concloure que les espècies senceres difereixen és excessiu: l’individu mesurat podria ser extrem dins la seva espècie. Les rèpliques han de ser biològiques, individus o cultius independents, no tres lectures del mateix organisme.

4. Un text afirma que «el prió és un virus de RNA». Identifiqueu l’errada i escriviu la correcció, comparant el prió amb un virus pel que fa al material que els constitueix.

   L’errada és doble: un prió no és un virus i no conté RNA. És una proteïna amb un plegament anormal, que indueix el mateix plegament en la proteïna sana del mateix tipus, i no porta àcid nucleic. Un virus, en canvi, té sempre àcid nucleic —DNA o RNA— dins una càpsida. Un agent que es destrueix en desnaturalitzar proteïnes i que resisteix un tractament que trenca àcids nucleics encaixa amb un prió, no amb un virus ni amb un viroide. El viroide sí que és RNA, però nu i sense càpsida, i tampoc no és un prió.