Pergunta

Flashcard

Qual é o posicionamento usual do cirurgião, do assistente e da mesa de instrumentação cirúrgica durante uma colecistectomia?


Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Temas Gerais em Cirurgia

Cirurgião à direita do paciente, assistente de frente para o cirurgião e o instrumentador ao lado do assistente.



Pergunta

Flashcard

Quais são as 3 etapas fundamentais de qualquer tipo de cirurgia?

Cirurgia

Resposta

Temas Gerais em Cirurgia

Diérese, hemostasia e síntese.

Pergunta

Flashcard

O que são instrumentos de diérese? Cite os dois tipos mais comuns.


Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Temas Gerais em Cirurgia

São instrumentos para cortar e divulsionar os tecidos, como os bisturis e as tesouras.



Pergunta

Flashcard

Quais são os dois tipos mais comuns de instrumentos de preensão?

Cirurgia

Resposta

Temas Gerais em Cirurgia

Pinça anatômica e pinça dente de rato.



Pergunta

Flashcard


Qual é a diferença entre as pinças Kocher, Kelly e Crile?

Cirurgia

Resposta

Temas Gerais em Cirurgia

- Kocher: possui um dente de rato em sua ponta;
- Kelly: as ranhuras cobrem até 2/3 da ponta;
- Crile: as ranhuras cobrem toda a ponta.



Pergunta

Flashcard


Como costumam ser dispostos os tipos de instrumentos na mesa de instrumentação cirúrgica de acordo com os quadrantes?

Cirurgia

Resposta

Temas Gerais em Cirurgia

MESA DE INSTRUMENTAL



Instrumentador



Pergunta

Flashcard

Qual é o exemplo mais comum de instrumento de síntese?

Cirurgia

Resposta

Temas Gerais em Cirurgia

Porta-agulha.



Pergunta

Flashcard


Que fio possui menor risco de infecção: monofilamentar ou multifilamentar?

Cirurgia

Resposta

Temas Gerais em Cirurgia

Monofilamentar.



Pergunta

Flashcard

Classifique os seguintes fios de sutura em absorvíveis ou não absorvíveis: nylon, fibra natural (Catgut) e poliglactina (Vicryl).

Cirurgia

Resposta

Temas Gerais em Cirurgia

- Nylon: não absorvível;
- Catgut: absorvível;
- Vicryl: absorvível.

Pergunta

Flashcard

Classifique os seguintes fios de sutura em absorvíveis ou não absorvíveis: polipropileno (Prolene), monocryl e algodão.

Cirurgia

Resposta

Temas Gerais em Cirurgia

- Polipropileno: não absorvível;
- Monocryl: absorvível;
- Vicryl: absorvível.

Pergunta

Flashcard


Qual é a incisão comumente realizada na colecistectomia aberta?

Cirurgia

Resposta

Temas Gerais em Cirurgia

Kocher.



Pergunta

Flashcard


Qual é a incisão comumente realizada na apendicectomia aberta?

Cirurgia

Resposta

Temas Gerais em Cirurgia

Mcburney.



Pergunta

Flashcard


Qual é a incisão comumente realizada na cesariana?

Cirurgia

Resposta

Temas Gerais em Cirurgia

Pfannenstiel.



Pergunta

Flashcard


Qual é o gás de escolha para criação do pneumoperitôneo durante uma laparoscopia?

Cirurgia

Resposta

Temas Gerais em Cirurgia

CO^2.



Pergunta

Flashcard

Cite, pelo menos, 2 vantagens da cirurgia laparoscópica sobre a laparotomia.

Cirurgia

Resposta

Temas Gerais em Cirurgia

- Cicatrizes menores;
- Melhor recuperação pós-operatória;
- Menor formação de aderências intestinais;
- Menor risco de hérnias incisionais;
- Menor risco de infecção de ferida operatória;
- Menos sangramento e menos complicações.

Pergunta

Flashcard

Quais são as duas principais contraindicações absolutas da cirurgia laparoscópica?

Cirurgia

Resposta

Temas Gerais em Cirurgia

Instabilidade hemodinâmica e insuficiência cardiopulmonar grave.

Pergunta

Flashcard

Cite, pelo menos, 2 benefícios da cirurgia robótica sobre a laparoscopia.

Cirurgia

Resposta

Temas Gerais em Cirurgia

- Visão tridimensional;
- Articulação do robô semelhante à mão;
- Melhor ergonomia para o cirurgião;
- Movimentos mais precisos (reduz o tremor do cirurgião);
- Possibilita cirurgia remota.



Pergunta

Flashcard

Cite, pelo menos, 2 indicações de obtenção de acesso venoso central.

Cirurgia

Resposta

Temas Gerais em Cirurgia

- Incapacidade de obter acesso venoso periférico (p. ex.: anasarca ou desidratação);
- Soluções incompatíveis com infusão periférica (p. ex.: vasopressores);
- Monitorização hemodinâmica (p. ex.: pressão venosa central);
- Hemodiálise ou plasmaférese;
- Intervenções endovenosas (p. ex.: filtro de veia cava ou marcapasso).