Pergunta

Flashcard

Qual é a definição de choque?

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

É um distúrbio circulatório que leva à má perfusão generalizada, comprometendo a oxigenação e nutrição dos tecidos.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Quais são os 4 tipos de choque?

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

Hipovolêmico, cardiogênico, distributivo e obstrutivo.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Quais são as definições de taquicardia em adultos, adolescentes, pré-escolares e crianças < 1 ano (ATLS 10ª edição)?

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

- Adultos: FC > 100 bpm;
- Adolescentes: FC > 120 bpm;
- Pré-escolares: FC > 140 bpm;
- Crianças < 1 ano: FC > 160 bpm.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o tipo de choque usual nos pacientes com pneumotórax hipertensivo ou tamponamento cardíaco?

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

Choque obstrutivo.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o tipo de choque nos pacientes com choque séptico ou choque neurogênico?

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

Choque distributivo.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o tipo de choque nos pacientes com infarto do miocárdio?

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

Choque cardiogênico.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o tipo de choque nos pacientes com hemorragia?

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

Choque hipovolêmico.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a tríade letal do trauma/choque?

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

Hipotermia, acidose metabólica e coagulopatia.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o tipo mais comum de choque nos pacientes politraumatizados?

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

Choque hemorrágico.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a classificação de gravidade do paciente com perda de sangue < 15% e com parâmetros hemodinâmicos inalterados?

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

Hemorragia classe I.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a classificação de gravidade do paciente com hemorragia que apresenta frequência cardíaca = 110 bpm, ↓pressão de pulso, mas frequência respiratória, débito urinário, nível de consciência e pressão arterial normais?

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

Hemorragia classe II.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a classificação de gravidade do paciente com hemorragia que apresenta frequência cardíaca = 130 bpm, PA = 90 x 60 mmHg, ↑frequência respiratória, débito urinário diminuído, mas presente e redução do nível de consciência?

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

Hemorragia classe III.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a classificação de gravidade do paciente com hemorragia que apresenta frequência cardíaca = 140 bpm, PA = 70 x 50 mmHg, ↑frequência respiratória, débito urinário mínimo ou ausente e redução significativa do nível de consciência?

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

Hemorragia classe IV.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Quais são os 2 sinais precoces de choque hipovolêmico.

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

Taquicardia e palidez cutânea.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a perda de sangue estimada para as hemorragias classe I até IV?

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

- Classe I: < 15%;
- Classe II: 15-30%;
- Classe III: 31-40%;
- Classe IV: > 40%.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Quais são os dois principais sinais de lesão uretral?


Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Trauma (Choque)

Equimose de períneo/escroto ou presença de sangue no meato uretral.



Pergunta

Flashcard

Quais são as duas formas preferenciais de obter um acesso venoso em crianças pequenas?

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

- Acesso periférico por punção (até duas tentativas);
- Acesso intraósseo.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a conduta prioritária no manejo do paciente com choque hemorrágico no ambiente hospitalar?

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

Garantir a perviedade da via aérea, com ventilação e oxigenação adequadas.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a reposição volêmica indicada inicialmente para pacientes em choque?

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

1 litro para adultos e 20 mL/kg para crianças < 40 kg de solução isotônica aquecida (p. ex.: *ringer* lactato).

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a definição de transfusão maciça no contexto do trauma (ATLS 10ª edição)?

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

Administração de mais de 10 concentrados de hemácias nas primeiras 24h após o trauma ou de 4 concentrados de hemácias em 1 hora.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Quais são os componentes do escore ABC para indicação de transfusão maciça em pacientes vítimas de trauma?

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

≥ 2 pontos indica necessidade de transfusão maciça.

- Mecanismo penetrante;
- Pressão sistólica ≤ 90 mmHg;
- Frequência cardíaca ≥ 120 bpm;
- FAST positivo.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Quando é indicada a administração de ácido tranexâmico para os pacientes vítima de traumas graves?


Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Trauma (Choque)

Para os pacientes com FC > 110 bpm ou pressão sistólica < 90 mmHg em até 3 horas após o trauma.



Administrar ácido tranexâmico 1g IV em bolus (em 10 minutos) e 1g IV ao longo das próximas 8 horas

Pergunta

Flashcard

Qual é o parâmetro mais fidedigno para avaliação da perfusão tecidual e reposição volêmica de pacientes em choque?

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

Débito urinário.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Inicialmente, qual é a melhor forma de controlar a hemorragia em um paciente com um membro traumatizado?

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

Compressão local.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a manobra indicada para um paciente vítima de queda de moto, hipotenso, taquicárdico, com dor e separação da sínfise pública e dor à compressão lateral da pelve?


Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Trauma (Choque)

Estabilização da pelve (p. ex.: com lençol).



Pergunta

Flashcard

O que é a hipotensão permissiva no contexto do trauma e qual é sua principal contraindicação?

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

Administração de cristaloides ou hemoderivados apenas o suficiente para manter a pressão sistólica ≥ 70 mmHg. Não é indicada para vítimas de trauma cranioencefálico, pois pode reduzir a perfusão cerebral.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o tipo de choque em que há hipotensão, sem taquicardia, sem vasoconstrição cutânea e sem redução da pressão de pulso?

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

Choque neurogênico.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável:
paciente vítima de múltiplos ferimentos com faca na região do tórax apresenta dispneia e dor torácica. FC = 90 bpm, PA =80 x 50 mmHg, turgência jugular e hipofonese de bulhas cardíacas.


Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Trauma (Choque)

Tamponamento cardíaco (choque).



Pergunta

Flashcard

Quais são os dois objetivos principais do E-FAST no trauma?

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

- Identificar líquido livre (pericárdico, intratorácico ou intraperitoneal);
- Identificar pneumotórax.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Quais são as 5 janelas avaliadas pelo E-FAST no trauma?

Cirurgia

Resposta

Trauma (Choque)

1. Pericárdica;
2. Hepatorrenal;
3. Esplenorrenal;
4. Suprapúbica (pelve);
5. Torácica (hemitórax direito e esquerdo).

