Pergunta

Flashcard

Qual é o órgão mais comumente acometido no trauma abdominal fechado?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Baço.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o exame de imagem de escolha para os pacientes estáveis vítimas de trauma abdominal fechado?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Tomografia de abdome com contraste endovenoso.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Quais são os 2 exames preferenciais para avaliação de trauma abdominal fechado nos pacientes instáveis vítimas de trauma abdominal contuso?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

FAST (Focused Assessment Sonography for Trauma) ou lavado peritoneal diagnóstico.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard


Quais são as 6 avaliações realizadas pelo E-fast?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

1. Saco pericárdico;
2. Espaço hepatorrenal;
3. Espaço esplenorrenal;
4. Pelve ou fundo de saco de Douglas;
5. Pneumotórax;
6. Hemotórax.



Pergunta

Flashcard

Quais são os critérios para o diagnóstico positivo do lavado peritoneal (ATLS)?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

- Aspiração de pelo menos 10 mL de sangue ou conteúdo gastrointestinal;
- Hemácias > 100.000/mm³;
- Leucócitos > 500/mm³;
- Conteúdo gastrointestinal, bile, fibras alimentares ou bactérias.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a contraindicação absoluta para realização de lavado peritoneal na sala de emergência?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Contraindicado nos pacientes com indicação absoluta de laparotomia exploradora.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a conduta indicada para um paciente vítima de trauma instável e com FAST positivo?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Laparotomia exploradora.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o órgão mais comumente atingido nos ferimentos por arma de fogo?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Intestino delgado.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o órgão mais comumente atingido nos ferimentos por arma branca?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Fígado.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Quais são as 5 indicações de laparotomia nos casos de trauma abdominal penetrante?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

- Ferimento por arma de fogo na região abdominal anterior (trajeto transperitoneal);
- Instabilidade hemodinâmica;
- Evisceração;
- Irritação peritoneal;
- Sangramento gastrointestinal ou geniturinário.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a conduta para pacientes com trauma penetrante por arma branca na parede anterior do abdome sem indicação de laparotomia?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Exploração digital da ferida.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a conduta para paciente com trauma penetrante em flanco/dorso sem indicação de laparotomia?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

TC com duplo (oral e EV) ou triplo (oral, EV e retal) contraste.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

O que é a tríade letal do trauma?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Acidose metabólica, hipotermia e coagulopatia.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Quais são os 3 passos essenciais da cirurgia de controle de danos?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

1. Controle da hemorragia;
2. Controle da contaminação;
3. Fechamento abdominal temporário (peritoneostomia).



Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável:

homem de 30 anos, vítima de acidente de carro, em uso de cinto de segurança, apresenta dor em hipocôndrio esquerdo, fratura de arcos costais inferiores e dor no ombro esquerdo.

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Lesão esplênica.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a recomendação de imunização específica para pacientes submetidos à esplenectomia total?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Imunização contra germes encapsulados (p. ex.: *S. pneumoniae, Neisseria meningitidis* e *Haemophilus influenzae tipo B*) pelo menos 14 dias após a cirurgia.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento de escolha para os pacientes com lesão esplênica com indicação cirúrgica?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Esplenectomia total.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Quais são as 3 principais indicações de esplenectomia total nos pacientes com trauma esplênico?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Paciente instável, irritação peritoneal e presença de outras lesões abdominais que necessitam de exploração cirúrgica.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a conduta indicada para pacientes vítimas de trauma hepático contuso com evidência de extravasamento de contraste para o parênquima hepático?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Angiografia e embolização da lesão.

Pergunta

Flashcard


Qual é a manobra cirúrgica indicada para pacientes com sangramento hepático ativo apesar do empacotamento com compressas?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Manobra de Pringle (clampeamento da artéria hepática, veia porta e colédoco).



Pergunta

Flashcard


Qual é o tratamento usual para pacientes vítimas de trauma abdominal penetrante com lesão gástrica simples e sem comprometimento vascular?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Rafia primária das lesões gástricas.



Flashcard

Pergunta

Diagnóstico provável:

homem queixa-se de dor abdominal após colisão de carro em uso de cinto de segurança. TC de abdome evidencia líquido livre na cavidade abdominal e ausência de lesões no fígado e no baço.



Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Lesão de intestino delgado.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o órgão abdominal com menor mortalidade pós-trauma de abdome?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Intestino grosso (em particular cólon e reto).

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento indicado para os pacientes estáveis com trauma colorretal < 50% da circunferência do órgão?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Desbridamento e rafia primária da lesão.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento indicado para os pacientes estáveis, sem comorbidades ou contaminação e com trauma colorretal > 50% da circunferência do órgão?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Ressecção do segmento afetado e anastomose primária, sem colostomia de proteção.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard


Qual é a conduta indicada para os pacientes com trauma colorretal com comorbidades significativas, instabilidade hemodinâmica ou contaminação fecal pesada?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Realizar ressecção do segmento e colostomia (p. ex.: Hartmann ou fístula mucosa). Não realizar anastomose primária.



Cirurgia de Hartmann.

Pergunta

Flashcard

Qual é o exame de escolha para avaliação de pacientes vítimas de trauma retroperitoneal?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Tomografia de abdome com contraste.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a principal suspeita diagnóstica quando há trauma abdominal contuso associado a crepitações em fundo de saco posterior no toque retal?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Perfuração de víscera oca retroperitoneal (p. ex.: parte do duodeno e paredes posteriores dos cólons ascendente e descendente).

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard


Qual é a conduta nos traumas retroperitoneais contusos com hematomas nas zonas I, II ou III?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

- Zona 1: não explorar;
- Zona 2: explorar se houver choque, hematoma pulsátil, em expansão ou sangramento renal persistente;
- Zona 3: somente explorar se houver hemorragia exsanguinante óbvia.



Pergunta

Flashcard

Qual é a conduta nos traumas retroperitoneais penetrantes com hematomas nas zonas I, II ou III?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Sempre explorar, independentemente da zona.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard


Qual é a conduta indicada para pacientes estáveis vítimas de lesão renal de grau IV (vascular)?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Arteriografia renal com angioembolização seletiva.



Pergunta

Flashcard

Em geral, qual é a conduta indicada para traumas renais com lesões de grau I, II e III?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Tratamento conservador.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Em geral, qual é a conduta indicada para traumas renais com lesões de grau V?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Tratamento cirúrgico.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard


Qual é o melhor exame para detecção de lesão de uretra pós-trauma?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Tomografia com contraste endovenoso (a lesão fica evidente após 20 minutos da injeção do contraste).



Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável:

homem de 40 anos sofre queda de andaime a 4 metros de altura. Evolui com fratura de pelve, hematúria e dor hipogástrica. Tomografia evidenciou líquido livre em pelve.

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Lesão de bexiga intraperitoneal.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável:
paciente vítima de trauma com uretrorragia + incapacidade de urinar e bexigoma.

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Lesão de uretra.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard


Qual é a conduta inicial para pacientes com fratura pélvica com instabilidade hemodinâmica?

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Amarração com lençol.



Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável:

pedestre de 50 anos sofreu um atropelamento por carro. Está hipotenso, taquicárdico e confuso apesar de ter recebido 1,5 litros de solução cristaloide na ambulância. Apresenta dor à palpação da sínfise púbica e dor à compressão das espinhas ilíacas anterossuperiores.

Cirurgia

Resposta

Trauma Abdominal e Pélvico

Fratura pélvica.

Estratégia MED