Pergunta

Flashcard


Quais são as duas paredes mais frágeis da órbita ocular?

Cirurgia

Resposta

Trauma de Face e Cervical

Paredes medial (a mais frágil) e inferior (assoalho da órbita).



Pergunta

Flashcard


Qual é o osso mais frequentemente fraturado nos traumas faciais?

Cirurgia

Resposta

Trauma de Face e Cervical

Osso nasal.



Pergunta

Flashcard

Qual é o osso mais resistente (e menos propenso a fraturas) da face?

Cirurgia

Resposta

Trauma de Face e Cervical

Osso frontal.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o exame de escolha para avaliação de fraturas de face?

Cirurgia

Resposta

Trauma de Face e Cervical

Tomografia computadorizada.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard


O que é a fratura de Le Fort I?

Cirurgia

Resposta

Trauma de Face e Cervical

É uma fratura transversal que separa os processos alveolares, dentes e palato do resto do crânio.



Pergunta

Flashcard


O que é a fratura de Le Fort II?

Cirurgia

Resposta

Trauma de Face e Cervical

É um tipo de fratura que separa os ossos nasal e maxilar do osso frontal e da órbita.



Pergunta

Flashcard


O que é a fratura de Le Fort III?

Cirurgia

Resposta

Trauma de Face e Cervical


É um tipo de fratura que causa uma descontinuidade entre o crânio e a face.



Pergunta

Flashcard


Classifique as fraturas faciais a seguir.



Cirurgia

Resposta

Trauma de Face e Cervical



Pergunta

Flashcard

Qual é a prioridade absoluta no atendimento inicial de um paciente com trauma cervical ou facial?

Cirurgia

Resposta

Trauma de Face e Cervical

Garantir via aérea adequada (assim como nos traumas em geral).

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Como regra geral, qual é a via aérea cirúrgica de escolha no trauma?


Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Trauma de Face e Cervical

Cricotireoidostomia.



Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento usual da fratura nasal?

Cirurgia

Resposta

Trauma de Face e Cervical

Tratamento cirúrgico da fratura nasal o mais rápido possível. Alguns cirurgiões esperam até 1 semana para reduzir o edema local para depois realizar a cirurgia.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard


Qual é o mecanismo de trauma mais comum das lesões cervicais?

Cirurgia

Resposta

Trauma de Face e Cervical

Lesões penetrantes (ferimento que ultrapassa o platisma).



Pergunta

Flashcard


Qual é a zona cervical mais frequentemente acometida nos traumas cervicais?

Cirurgia

Resposta

Trauma de Face e Cervical

Zona II.



Pergunta

Flashcard

Qual é a estrutura anatômica provavelmente lesada em um paciente com trauma cervical fechado e rouquidão significativa?

Cirurgia

Resposta

Trauma de Face e Cervical

Laringe.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o exame inicial de escolha para investigação de lesões cervicais?

Cirurgia

Resposta

Trauma de Face e Cervical

Angiotomografia cervical.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard


Qual é a via aérea de escolha na suspeita de lesão de laringe?

Cirurgia

Resposta

Trauma de Face e Cervical

Traqueostomia.



Pergunta

Flashcard

Cite, pelo menos, 2 indicações de cervicotomia exploradora imediata em pacientes com trauma cervical.

Cirurgia

Resposta

Trauma de Face e Cervical

1. Instabilidade hemodinâmica;
2. Sangramento ativo;
3. Hematoma volumoso e/ou pulsátil e/ou em expansão;
4. Lesões óbvias da via aerodigestiva (p. ex.: ar borbulhando na ferida, insuficiência respiratória, estridor, disfagia, etc).

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard


Qual é a zona cervical de maior dificuldade técnica para exploração cirúrgica em caso de trauma cervical?

Cirurgia

Resposta

Trauma de Face e Cervical

Zona III.



Pergunta

Flashcard

Qual é a conduta indicada para um paciente vítima de ferimento por arma branca na região cervical que evolui com disfonia e saída de saliva pelo orifício da lesão?

Cirurgia

Resposta

Trauma de Face e Cervical

Cervicotomia exploradora.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a conduta indicada para um paciente com trauma cervical penetrante, estável hemodinamicamente e com sintomas leves?

Cirurgia

Resposta

Trauma de Face e Cervical

Realizar exames complementares para descartar lesão vascular ou aerodigestiva (p. ex.: angiotomografia ou USG Doppler).

Estratégia MED