Pergunta

Flashcard


Que região anatômica é mais frequentemente responsável pelo desenvolvimento de sintomas de hiperplasia prostática benigna?

Cirurgia

Resposta

Urologia

Zona de transição, cuja hiperplasia resulta na compressão mecânica da uretra.



Próstata normal

Próstata com hiperplasia

Pergunta

Flashcard


Qual é a região da próstata mais acometida pelo adenocarcinoma de próstata?

Cirurgia

Resposta

Urologia

Zona periférica.



A. Zona central
B. Zona fibromuscular
C. Zona de transição
D. Zona periférica
E. Zona periuretral

Pergunta

Flashcard

Qual é a causa mais comum de sintomas do trato urinário baixo em homens idosos?

Cirurgia

Resposta

Urologia

Hiperplasia prostática benigna.

Pergunta

Flashcard


Quais são as características do toque retal no paciente com hiperplasia prostática benigna?

Cirurgia

Resposta

Urologia

Próstata fibroelástica, lisa, sem nodulações e com aumento simétrico da próstata.



Pergunta

Flashcard

Quais são as 2 principais classes de sintomas no paciente com hiperplasia prostática benigna?

Cirurgia

Resposta

Urologia

- **Irritativos:** p. ex., urgência, incontinência, noctúria, polaciúria e disúria;
- **Obstrutivos:** jato urinário fraco, hesitação miccional, esvaziamento vesical incompleto, incontinência por transbordamento e gotejamento pós-miccional.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável:
homem de 64 anos queixa-se de polaciúria, noctúria, jato urinário fraco e gotejamento pós-miccional. Próstata deconsistência fibroelástica, móvel, sem nódulos, lisa e regular. PSA: 2,8 mg/dL.

Cirurgia

Resposta

Urologia

Hiperplasia prostática benigna.

Pergunta

Flashcard

Qual é o exame de escolha inicial para estimar o volume da próstata?

Cirurgia

Resposta

Urologia

Ultrassom transretal.

Pergunta

Flashcard

Quais são os dois exames laboratoriais básicos que devem ser realizados para todos os pacientes com suspeita de hiperplasia prostática benigna?

Cirurgia

Resposta

Urologia

Dosagem de PSA e urina 1.

Pergunta

Flashcard

Quais são as drogas de primeira escolha para o tratamento de hiperplasia prostática benigna?

Cirurgia

Resposta

Urologia

Antagonistas alfa-1-adrenérgicos (p. ex.: doxazosina e tansulosina).

Pergunta

Flashcard

Qual é o principal efeito colateral dos antagonistas alfa-1-adrenérgicos (p. ex.: tansulosina)?

Cirurgia

Resposta

Urologia

Hipotensão (hipotensão postural, tontura, síncope, etc).

Pergunta

Flashcard

Qual é o mecanismo de ação da finasterida no tratamento da hiperplasia prostática benigna?

Cirurgia

Resposta

Urologia

Reduz o tamanho da glândula através do bloqueio da conversão de testosterona em di-hidrotestosterona (DHT).

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o mecanismo de ação da doxazosina/tansulozina no tratamento da hiperplasia prostática benigna?

Cirurgia

Resposta

Urologia

Reduz o tônus da musculatura lisa prostática e do colo vesical (são antagonistas alfa-1-adrenérgicos).

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard


Qual é o tratamento cirúrgico padrão-ouro da hiperplasia prostática benigna com a próstata < 80 gramas?

Cirurgia

Resposta

Urologia

Ressecção transuretral da próstata.



Pergunta

Flashcard

Qual é a cirurgia de escolha para o tratamento de hiperplasia prostática benigna com a próstata > 80 gramas?

Cirurgia

Resposta

Urologia

Prostatectomia subtotal.

Pergunta

Flashcard

Cite, pelo menos, duas indicações cirúrgicas de hiperplasia prostática benigna?

Cirurgia

Resposta

Urologia

- Falha do tratamento medicamentoso;
- Retenção urinária aguda ou de repetição;
- ITU de repetição;
- Cálculos vesicais ou divertículos;
- Hematúria macroscópica persistente ou recorrente;
- Hidronefrose;
- Incontinência por transbordamento.

Flashcard

Pergunta

Defina se os fatores abaixo são ou não de risco para câncer de próstata.

- Tabagismo
- Idosos
- Dieta (↑carne vermelha e ↓vegetais)
- Etilismo
- Hiperplasia prostática benigna
- História familiar

Cirurgia

Resposta

Urologia

- **Fatores de risco:** idosos, dieta e historia familiar;
- **Não são fatores de risco:** tabagismo, etilismo e hiperplasia prostática benigna.

Pergunta

Flashcard

Qual é a neoplasia maligna visceral mais comum em homens?

Cirurgia

Resposta

Urologia

Câncer de próstata.

Pergunta

Flashcard

Qual é o tipo histológico mais comum das neoplasias malignas de próstata?

Cirurgia

Resposta

Urologia

Adenocarcinoma acinar.

Pergunta

Flashcard

Qual é o local mais comum de metástase do câncer de próstata?

Cirurgia

Resposta

Urologia

Metástase óssea.

Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável:

homem de 61 anos, assintomático, realizou toque retal “de rotina” na unidade de saúde, que foi descrito como próstata assimétrica, com nódulos endurecidos no lobo esquerdo e superfície irregular. PSA = 11 ng/dL.

Cirurgia

Resposta

Urologia

Câncer de próstata.

Pergunta

Flashcard


Quais são as características do tumor de próstata palpável no toque retal?

Cirurgia

Resposta

Urologia

Presença de nódulo endurecido, próstata assimétrica e/ou irregularidades da superfície prostática.



Pergunta

Flashcard

Qual é o exame padrão-ouro para o diagnóstico de câncer de próstata?

Cirurgia

Resposta

Urologia

Biópsia de próstata.

Pergunta

Flashcard

Qual é a interpretação dos níveis de PSA e qual é a conduta específica para cada caso?

Cirurgia

Resposta

Urologia

- **PSA < 4 ng/mL:** normal;
- **PSA 4-10 ng/mL:** pode ser resultado de afecções benignas ou malignas. Deve-se biopsiar;
- **PSA > 10 ng/mL:** altamente sugestivo de neoplasia. Deve-se biopsiar.

Pergunta

Flashcard

Qual é a recomendação de rastreamento de câncer de próstata pelo Ministério da Saúde?

Cirurgia

Resposta

Urologia

Não é recomendado o rastreio populacional de câncer de próstata (não devem ser realizados nem o PSA nem o toque retal em indivíduos assintomáticos).

Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento do câncer de próstata com metástase à distância?

Cirurgia

Resposta

Urologia

Hormonioterapia associada ou não à quimioterapia.

Pergunta

Flashcard

Como regra geral, qual é o tratamento do paciente com câncer de próstata de muito baixo risco ou de baixo risco?

Cirurgia

Resposta

Urologia

Pode ser considerada a vigilância ativa.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o tipo histológico mais comum de câncer testicular?

Cirurgia

Resposta

Urologia

Tumor de células germinativas (especialmente seminomas).

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o exame de imagem inicial indicado para investigação de suspeita de neoplasia testicular?

Cirurgia

Resposta

Urologia

Ultrassonografia.

Pergunta

Flashcard

Quais são os 3 principais marcadores bioquímicos usados para diagnóstico e controle de remissão das neoplasias testiculares?

Cirurgia

Resposta

Urologia

β-HCG, desidrogenase lática (DHL) e alfa-feto proteína (AFP).

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável: homem de 35 anos queixa-se de massa indolor e endurecida no testículo esquerdo, mas sem sinais inflamatórios.

Cirurgia

Resposta

Urologia

Investigar neoplasia testicular.

Pergunta

Flashcard

Qual é a conduta indicada para pacientes com cistos renais simples identificados na ecografia?

Cirurgia

Resposta

Urologia

Não há necessidade de investigação nem de seguimento.

Flashcard

Pergunta

Diagnóstico provável: homem de 48 anos apresenta hematúria, dor lombar e massa abdominal palpável em flanco direito.



Lesão com componente sólido em rim direito, captante de contraste endovenoso.

Cirurgia

Resposta

Urologia

Carcinoma renal.

Pergunta

Flashcard

Qual é o tipo histológico mais comum do câncer de bexiga urinária?


Cirurgia

Resposta

Urologia

Carcinoma urotelial.

A camada representada por A são as células de transição do urotélio. A camada representada por B é a membrana basal e, em C,encontra-se a camada muscular. Fonte: Shutterstock.



Pergunta

Flashcard

Qual é o sintoma mais comum de câncer de bexiga?

Cirurgia

Resposta

Urologia

Hematúria indolor (geralmente macroscópica).

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável:
homem de 70 anos, tabagista 40 maços-ano, queixa-se de hematúria macroscópica intermitente e indolor. Além disso, reclama de fadiga, anorexia e perda de peso.

Cirurgia

Resposta

Urologia

Câncer de bexiga urinária.