Estratégia MED

ESTRATÉGIA MED

ATLS: ATENDIMENTO INICIAL E VIAS AÉREAS




med.estrategia.com

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Estratégia MED

ESTRATÉGIA MED

1. DISTRIBUIÇÃO DAS MORTES NO TRAUMA
2. AVALIAÇÃO PRIMÁRIA E MEDIDAS AUXILIARES
3. AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA E MEDIDAS AUXILIARES
4. ETAPA A: VIAS AÉREAS E COLUNA CERVICAL
5. VIA AÉREA DEFINITIVA
6. INDICAÇÕES DE VIA AÉREA CIRÚRGICA NA VÍTIMA DO TRAUMA
7. VIAS AÉREAS ALTERNATIVAS



med.estrategia.com

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Estratégia MED

ESTRATÉGIA MED

DISTRIBUIÇÃO DAS MORTES NO TRAUMA



med.estrategia.com

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina


INTRODUÇÃO

- TRAUMA: GRANDE PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA - TERCEIRA PRINCIPAL CAUSA DE ÓBITOS NO BRASIL
- IMPORTÂNCIA DE RECONHECER E ATUAR EM SITUAÇÕES POTENCIALMENTE AMEAÇADORAS À VIDA
- IDEALIZAÇÃO DO ATLS - 1976



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

DISTRIBUIÇÃO TRIMODAL DAS MORTES



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

PICOS DE MORTALIDADE

1º PICO	2º PICO	3º PICO
• TCE GRAVE • ROTURA CARDÍACA • LACERAÇÃO DE GRANDES VASOS	• PNEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO • LESÃO DE VÍSCERA MACIÇA • SOMATÓRIO DA LESÃO DE MÚLTIPLOS SISTEMAS	• EMBOLIA PULMONAR • SEPSE • PNEUMONIA • DISFUNÇÃO DE MÚLTIPLOS ÓRGÃOS

- Primeiro pico: Mortes imediatas → Prevenção primária
- Segundo pico: Mortes precoces → Atendimento inicial adequado
- Terceiro pico: Mortes tardias → Atendimento inicial + cuidados hospitalares


Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Cai na Prova

A respeito de pacientes acometidos por traumas graves, julgue o item a seguir. Uma das causas mais comuns para morte tardia desses pacientes é a embolia pulmonar.

A) CERTO

B) ERRADO




Medicina livre, venda proibida, twitter @t.livremedicina

Cai na Prova

A respeito de pacientes acometidos por traumas graves, julgue o item a seguir. Uma das causas mais comuns para morte tardia desses pacientes é a embolia pulmonar.

A) CERTO

B) ERRADO



Medicina livre, venda proibida. twitter @tiolivremedicina

Estratégia MED

ESTRATÉGIA MED


AVALIAÇÃO PRIMÁRIA E MEDIDAS AUXILIARES



med.estrategia.com

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

QUAL A LÓGICA?



COMO É ORGANIZADO O ATENDIMENTO INICIAL DA VÍTIMA DE TRAUMA?


Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

AVALIAÇÃO PRIMÁRIA

MNEMÔNICO DE AVALIAÇÃO INICIAL - ATLS	
"A" (AIRWAY)	IMOBILIZAÇÃO CERVICAL + DESOBSTRUIR VIA AÉREA + OFERTA DE O2 SOB MÁSCARA OU VIA AÉREA DEFINITIVA
"B"(BREATHING)	IDENTIFICAR E TRATAR AFECÇÕES VENTILATÓRIAS (PNEUMOTÓRAX, HEMOTÓRAX, LATQB ETC..)
"C" (CIRCULATION)	IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS FOCOS DE HEMORRAGIA 2 ACESSOS VENOSOS (MÍNIMO 18G), INFUSÃO DE 1000ML DE CRISTALÓIDE AQUECIDO, AVALIAR NECESSIDADE DE SANGUE
"D" (DISABILITY)	GLASGOW E PUPILAS
"E" (EXPOSURE AND ENVIROMENTAL CONTROL)	EXPOSIÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL (EVITANDO HIPOTERMIA)

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TRÍADE LETAL



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Cai na Prova


No paciente politraumatizado, a primeira medida é garantir:

A) O acesso à via aérea.

B) acesso venoso periférico.

C) acesso venoso central.

D) perfusão periférica.



Medicina livre, venda proibida. twitter @tiolivremedicina

Cai na Prova


No paciente politraumatizado, a primeira medida é garantir:

A) O acesso à via aérea.

B) acesso venoso periférico.

C) acesso venoso central.

D) perfusão periférica.



Medicina livre, venda proibida. twitter @tuvremedicina

ATENÇÃO:

NÃO CONFUNDA ATLS COM PHTLS

X - Medidas para contenção de hemorragias externas graves (risco de exsanguinação)

A - Proteção da coluna cervical e vias aéreas

B - Respiração e ventilação

C - Circulação com controle de hemorragia (outros focos, não exsanguinantes)

D - Avaliação neurológica

E - Exposição.



Prof. Antonio Rivas

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

MEDIDAS AUXILIARES DA AVALIAÇÃO PRIMÁRIA

1. O QUE É ISSO?
2. QUAIS SÃO AS MEDIAS AUXILIARES?

ECG	OXIMETRIA	CAPNOGRAFIA	GASOMETRIA
RX DE TÓRAX E PELVE	FAST OU E-FAST	LPD	SNG E SVD

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CUIDADO!

ATENÇÃO:

1. As radiografias preconizadas pelo ATLS, durante a avaliação primária, são, APENAS: Tórax AP e Pelve AP, realizadas com aparelho portátil, dentro da sala de trauma.

2. As radiografias de coluna cervical não fazem parte da avaliação primária.

3. Gestantes não têm contraindicação à realização de exames radiológicos em um cenário de trauma!

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Estratégia MED

ESTRATÉGIA MED

AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA E MEDIDAS AUXILIARES



med.estrategia.com

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA

- AUTORIZADA APENAS APÓS O TÉRMINO DA AVALIAÇÃO PRIMÁRIA
- EXAME MINUCIOSO DA CABEÇA AOS PÉS
- ANAMNESE DIRIGIDA MNEMÔNICO AMPLA

MNEMÔNICO DE AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA - AMPLA	
"A"	ALERGIAS
"M"	MEDICAÇÕES EM USO
"P"	PASSADO MÉDICO/PRENHEZ
"L"	LÍQUIDOS E ALIMENTOS INGERIDOS
"A"	AMBIENTE, EVENTOS E MECANISMO DE TRAUMA

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

MEDIDAS AUXILIARES DA AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA

RADIOGRAFIA DE MEMBROS

RADIOGRAFIA DE COLUNA

EXAMES CONTRASTADOS

TOMOGRAFIA

EXAMES ENDOSCÓPICOS

SNG E SVD

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ATENÇÃO:

A avaliação secundária só deve ser iniciada após o término da avaliação primária e o paciente deve estar estável e apresentando sinais consistentes de melhora.

Você NUNCA fará avaliação secundária de pacientes instáveis!



Prof. Antonio Rivas

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ESTRATÉGIA MED

PRINCIPAIS LESÕES NA AVALIAÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA



med.estrategia.com

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

LESÕES COM RISCO IMEDIATO E COM RISCO POTENCIAL (DE MORTE)



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

RISCO IMEDIATO
AVALIAÇÃO PRIMÁRIA

- OBSTRUÇÃO DA VIA AÉREA
- PNEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO
- PNEUMOTÓRAX ABERTO
- HEMOTÓRAX MACIÇO
- TAMPONAMENTO CARDÍACO
- LESÃO DA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNQUICA

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

RISCO POTENCIAL □ AVALIAÇÃO SCUNDÁRIA (TODO O RESTO)

PNEUMOTÓRAX SIMPLES	HEMOTÓRAX	TÓRAX INSTÁVEL	CONSTUSÃO PULMONAR
TRAUMA CARDÍACO CONTUSO	ROTURA AORTICA	LESÃO DIAFRAGMÁTICA	LESÃO ESOFÁGICA

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ESTRATÉGIA MED

ETAPA A: VIAS AÉREAS E COLUNA CERVICAL



med.estrategia.com


Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

OS PASSOS DA ETAPA A



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

PASSO 1



- DEVE SER FEITA COM COLAR CERVICAL E HEADBLOCK
- MOVIMENTAÇÃO DO PACIENTE EM BLOCO E TRANSPORTE COM PRANCHA RÍGIDA
- PRIORIDADE EM RELAÇÃO ÀS VIAS AÉREAS (PROVA PRÁTICA)

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

PASSO 2


PATEÊNCIA
DE VIA AÉREA

CAUSAS COMUNS DE IMPEDIMENTO AO FLUXO AÉREO:

1. QUEDA DA BASE DA LÍNGUA COM FECHAMENTO DA HIPOFARINGE
2. CORPOS ESTRANHOS
3. SANGUE
4. SECREÇÃO

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina


MANOBRAS QUEDA DE BASE DE LÍNGUA





Prof. Antonio Rivas

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

MANOBRAS QUEDA DE BASE DE LÍNGUA







CÂNULA OROFARÍNGEA
(DE GUEDEL)

Prof. Antonio Rivas

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

PASSO 3

OFERTA DE O2 SOB MÁSCARA

- MÁSCARA COM VÁLVULA NÃO REINALANTE E RESERVATÓRIO
- FLUXO DE 10-15 LITROS/MINUTO
- FRAÇÃO INSPIRADA DE O_2 PRÓXIMA A 100%
- CONTROLE DE SATURAÇÃO ATRAVÉS DE OXIMETRIA
- CATETER DE O2 NÃO ESTÁ INDICADO NO CONTEXTO DE TRAUMA

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

PASSO 4

AVALIAR NECESSIDADE DE VIA AÉREA DEFINITIVA

DEFINIÇÃO:

SONDA EM POSIÇÃO TRAQUEAL, COM BALONETE INSUFLADO ABAIXO DAS PREGAS VOCAIS, LIGADA À UMA FONTE ENRIQUECIDA DE OXIGÊNIO.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

INDICAÇÕES DE VIA AÉREA DEFINITIVA

Estratégia MED

APNÉIA	OXIGENAÇÃO INADEQUADA	GLASGOW ≤ 8	CONVULSÕES REENTRANTES
HEMATOMA CERVICAL EXPANSIVO	SANGRAMENTO PROFUSO DE VIA AÉREA	TRAUMA MAXILOFACIAL EXTENSO	LESÃO TÉRMICA DE LARINGE

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Cai na Prova

Qual das seguintes situações exigiria via aérea definitiva em um paciente com voz normal, saturação de oxigênio normal e sem desconforto respiratório?


A) Sangramento das vias aéreas.

B) Ferimento por faca no pescoço com um leve inchaço na região cervical lateral esquerda.

C) Enfisema a subcutâneo lateral direito localizado.

D) Fratura mandibular bilateral.

E) Glasgow > 8.



Medicina livre, venda proibida, twitter @t.livremedicina

Cai na Prova

Qual das seguintes situações exigiria via aérea definitiva em um paciente com voz normal, saturação de oxigênio normal e sem desconforto respiratório?


A) Sangramento das vias aéreas.

B) Ferimento por faca no pescoço com um leve inchaço na região cervical lateral esquerda.


C) Enfisema a subcutâneo lateral direito localizado.

D) Fratura mandibular bilateral.

E) Glasgow > 8.




Medicina livre, venda proibida. twitter @tlivremedicina




Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CONTRAINDICAÇÕES À INTUBAÇÃO NASOTRAQUEAL


1. APNÉIA
2. FRATURA DE BASE DE CRÂNIO





Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

INTUBAÇÃO ASSISTIDA POR DROGA



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Estratégia MED

ESTRATÉGIA MED

INDICAÇÕES DE VIA AÉREA CIRÚRGICA



med.estrategia.com

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

INDICAÇÕES DE VIA AÉREA CIRURGICA

QUANDO HOUVER QUALQUER FATOR QUE IMPOSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO OU A TRANSPOSIÇÃO DA LARINGE

- HEMORRAGIA FACIAL PROFUSA
- TRAUMA MAXILOFACIAL EXTENSO
- EDEMA DE GLOTE
- DISTORÇÃO DA ANATOMIA CERVICAL


Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina


CRICOTIREOIDOSTOMIA OU TRAQUEOSTOMIA?


TRAQUEOSTOMIA	CRICOTIREOIDOSTOMIA
VIA AÉREA CIRURGICA DE EXCEÇÃO	VIA AÉREA CIRÚRGICA DE ESCOLHA
INDICADA APENAS QUANDO HÁ CONTRAINDICAÇÃO À CRICOTIREOIDOSTOMIA CIRÚRGICA	CONTRAINDICADA SE: 1. **FRATURA DE LARINGE** 2. **IDADE INFERIOR A 12 ANOS**


Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina


CRICOTIREOIDOSTOMIA











Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Cai na Prova


Jovem, 28 anos, após acidente automobilístico com colisão frontal, apresenta sangramento nasal e oral profuso, fratura de mandíbula bilateral e encontra-se em insuficiência respiratória. O acesso à via aérea deve ser feito através de:

A) Cricotireoidostomia.

B) Intubação orotraqueal.

C) Traqueostomia.

A) Intubação nasotraqueal.



Medicina livre, venda proibida. twitter @tuvremedicina

Cai na Prova


Jovem, 28 anos, após acidente automobilístico com colisão frontal, apresenta sangramento nasal e oral profuso, fratura de mandíbula bilateral e encontra-se em insuficiência respiratória. O acesso à via aérea deve ser feito através de:

A) Cricotireoidostomia.

B) Intubação orotraqueal.

C) Traqueostomia.

A) Intubação nasotraqueal.



Medicina livre, venda proibida. twitter @t.livremedicina

Cai na Prova


A cricotireoidostomia:

A) não deve ser realizada em crianças com menos de 12 anos.

B) deve ser realizada apenas em pacientes que não são bons candidatos à traqueostomia.

C) requer o uso de um tubo endotraquial com menos de 4 mm de diâmetro.

D) pode ser substituída pela traqueostomia percutânea.



Medicina livre, venda proibida. twitter @tiolivremedicina

Cai na Prova


A cricotireoidostomia:

A) não deve ser realizada em crianças com menos de 12 anos.

B) deve ser realizada apenas em pacientes que não são bons candidatos à traqueostomia.

C) requer o uso de um tubo endotraquial com menos de 4 mm de diâmetro.

D) pode ser substituída pela traqueostomia percutânea.



Medicina livre, venda proibida. twitter @t.livremedicina

Estratégia MED

ESTRATÉGIA MED


VIAS AÉREAS ALTERNATIVAS



med.estrategia.com

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina


VIAS AÉREAS ALTERNATIVAS



- MÁSCARA LARÍNGEA
- TUBO LARÍNGEO
- TUBO ESOFÁGICO MULTILÚMEN
- CRICOTIREOIDOSTOMIA POR PUNÇÃO

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CRICOTIREOIDOSTOMIA POR PUNÇÃO



- Estratégia de oxigenação de emergência
- Não é contraindicada me menores de 12 anos
- Medida provisória até via aérea definitiva
- Há retenção de CO_2
- Tempo máximo 30-40’

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Cai na Prova


Assinale a alternativa INCORRETA com relação à Máscara Laríngea (ML).

A) A ML não fornece uma via aérea definitiva e o posicionamento adequado deste dispositivo é difícil sem treinamento apropriado.

B) Quando um doente chegar ao departamento de emergência com a ML, o médico atendente deve planejar sua substituição por uma via aérea definitiva.

C) A ML é considerada como uma via aérea definitiva e não há necessidade de substituição quando um doente chegar ao departamento de emergência em uso deste dispositivo.

D) É indicada para pacientes no qual a tentativa de intubação foi malsucedida, ou naqueles em que se sabe que dificilmente a intubação será conseguida.



Medicina livre, venda proibida. twitter @tuvremedicina

Cai na Prova


Assinale a alternativa INCORRETA com relação à Máscara Laríngea (ML).

A) A ML não fornece uma via aérea definitiva e o posicionamento adequado deste dispositivo é difícil sem treinamento apropriado.

B) Quando um doente chegar ao departamento de emergência com a ML, o médico atendente deve planejar sua substituição por uma via aérea definitiva.

C) A ML é considerada como uma via aérea definitiva e não há necessidade de substituição quando um doente chegar ao departamento de emergência em uso deste dispositivo.

D) É indicada para pacientes no qual a tentativa de intubação foi malsucedida, ou naqueles em que se sabe que dificilmente a intubação será conseguida.



Medicina livre, venda proibida. twitter @tlivremedicina

Estratégia MED

ESTRATÉGIA MED

OBRIGADO



med.estrategia.com

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Estratégia MED

ESTRATÉGIA MED


ATLS: ATENDIMENTO INICIAL E VIAS AÉREAS



med.estrategia.com

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Estratégia MED



Curta o vídeo

Inscreva-se no EstratégiaMED

Ative o sininho

med.estrategia.com

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina