

Sífilis

Bacteria Treponema Pallidum



El chancro generalmente se presenta alrededor de tres semanas después de la exposición. Muchas personas que tienen sífilis no notan el chancro porque generalmente es indoloro y puede estar escondido dentro de la vagina o el recto. El chancro sanará por sí solo en un plazo de tres a seis semanas. Pocas semanas después de la recuperación del chancro original, puedes experimentar una erupción que comienza en el tronco, pero que acaba cubriendo todo el cuerpo, incluso las palmas de las manos y las plantas de los pies.





La sífilis es una infección bacteriana común que se contagia a través del sexo. La sífilis se cura fácilmente con antibióticos, pero si no se trata, puede provocar daños permanentes.

LA SÍFILIS CAUSA LLAGAS EN TUS GENITALES LLAMADAS **CHANCROS. USUALMENTE, ESTAS LLAGAS NO SON DOLOROSAS, PERO PUEDEN CONTAGIAR LA INFECCIÓN FÁCILMENTE A OTRAS PERSONAS. LA SÍFILIS SE TRANSMITE A TRAVÉS DEL CONTACTO CON LAS LLAGAS. MUCHAS PERSONAS CON SÍFILIS SE SIENTEN BIEN Y NO NOTAN LAS LLAGAS, ASÍ QUE PUEDE QUE NO SEPAN QUE TIENEN LA INFECCIÓN.**



RECUERDA

La sífilis se contagia a través del contacto sexual, de modo que la mejor manera de prevenir la sífilis es hacerse pruebas regularmente y usar condón o barreras de látex bucales cuando tengas sexo.

La única manera de saber si tienes sífilis es hacerte un examen.

**HACER CONTROL
MÉDICO**