

Con **pastillas**
anticonceptivas, no se
ovula ni se **menstrua**.




Ciclo Menstrual

De forma simplificada se puede decir que, después de la menstruación, aumentan los niveles de estrógenos, los cuales llevarán a la maduración del folículo hasta cierto punto que se produzca un pico de la hormona LH (Hormona luteinizante).

Este aumento de LH desencadena la liberación del ovulo del ovario llamada ovulación.

Luego de la ovulación, aumenta la Progesterona, que si hubo fecundación y anidación se mantendrá estable durante todo el embarazo, pero si no hubo fecundación disminuirá y llevará a que se produzca una nueva menstruación.




Todo medicamento tiene efectos secundarios. Las pastillas anticonceptivas también.

Si después de haber tomado las pastillas durante unos meses todavía no te gusta como te hacen sentir, habla con la persona que te los recetó. Puede que te recomienden otra marca de pastillas anticonceptivas o un método de planificación diferente. Algunas personas tienen que probar diferentes tipos de pastillas o métodos anticonceptivos antes de encontrar el indicado.



Ciclo Mentrual con pastillas Anticonceptivas

Al tomar pastillas anticonceptivas diariamente, los niveles hormonales se mantienen estables. Si no hay aumento de estrógenos, no habrá aumento de LH, por lo cual no se producirá una ovulación. **Si no hay ovulación, no puede haber embarazo.** Por eso, **el principal mecanismo de acción de las pastillas anticonceptivas es impedir la ovulación.**



Efectos secundarios frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 mujeres)

Dolor de cabeza, cambios en el estado de ánimo (incluida la depresión), náuseas, dolor abdominal, mamas dolorosas, sensibilidad en las mamas, aumento de peso, erupción cutánea.




Ciclo Mentrual con pastillas Anticonceptivas

Para que haya menstruación, primero tiene que haber ovulación. Si no hay ovulación, no hay menstruación.

Entonces, ¿por qué igual aparece un sangrado cuando se toman pastillas anticonceptivas?

Esto se debe a las pastillas placebo (sin hormonas que se toman al final del ciclo) o a los días descanso. Al disminuir los niveles hormonales se produce un sangrado, llamado sangrado por privación, que no es menstruación.



Efectos secundarios poco frecuentes *(pueden afectar hasta 1 de cada 100 mujeres)*

Vómitos, diarrea, retención de líquidos o edema, migraña, pérdida del deseo sexual, aumento del tamaño de las mamas, urticaria.

Efectos secundarios raros *(pueden afectar hasta 1 de cada 1000 mujeres)*

Irritación ocular con el uso de lentes de contacto, hipersensibilidad, pérdida de peso, secreción mamaria, flujo vaginal, aumento de la libido, eritema nodoso (nódulos en las piernas), eritema multiforme (lesiones cutáneas).

Tanto el modo de uso, mecanismo de acción y efectos secundarios lo podés encontrar en el prospecto que viene en la caja de los anticonceptivos.